

ドングリ

図鑑


ドングリとは



ドングリとは、クヌギやコナラのように下方がおわん状または皿状の殻斗で包まれた丸く固い果実の総称で、殻斗を含んで言うこともあります。


普通はブナ科コナラ属に属す果実を言いますが、ここでは、マテバシ属や殻斗が果実全体を包むシイ属の果実もドングリとします。

ドングリの部位名



スタジイ


ブナ科 シイ属 *Castanopsis sieboldii*



常緑樹。樹皮は縦に浅く裂け、葉の下面は金色です。シイ類の材は耐久性があり、家具、建材などに広く用いられています。分布は福島・新潟県以南の沿岸地域。

コジイ


ブナ科 シイ属 *Castanopsis cuspidata*



常緑樹。樹皮はなめらか。葉の上半分に浅い鋸歯があり、下面は金色です。シイ類のドングリはタンニンが少なく縄文時代には食用となっていました。分布は東海以西から種子島までの内陸丘陵地。

クヌギ


ブナ科 コナラ属 *Quercus acutissima*



落葉樹。樹皮は縦に深く裂け、葉の下面は淡緑色でほとんど無毛です。鋸歯の先は針のように尖っています。材はシイタケ栽培の原木や良質の炭となります。分布は岩手・山形県から屋久島・種子島まで。

カシワ


ブナ科 コナラ属 *Quercus dentata*



落葉樹。樹皮は縦に深く裂けます。葉の長さは10~30センチで鋸歯は波状。葉の下面は毛が密生し、灰白色です。かしわ餅をつつむことで知られています。分布は北海道から九州まで。

アベマキ


ブナ科 コナラ属 *Quercus variabilis*



落葉樹。樹皮は縦に深く裂けます。葉はクヌギに似ていますが、下面は毛が密生し、白色です。分布は岩手・山形県から九州中部まで。

ナラガシワ


ブナ科 コナラ属 *Quercus aliena*



落葉樹。樹皮はふぞろいに深く裂けます。葉は鋸歯があり、下面は灰白色です。葉柄は長さ1~3センチ。分布は岩手・秋田県以南から九州まで。

コナラ


ブナ科 コナラ属 *Quercus serrata*



落葉樹。樹皮は縦に深く裂けます。葉は鋸歯があり、下面は灰白色です。シイタケ栽培の原木に使われます。分布は北海道から九州まで。

ウバメガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus phillyraeoides*



常緑樹。樹皮は縦に浅く裂けます。葉は楕円形で、上半分に浅い鋸歯があります。材は備長炭となります。分布は関東南部以南。

ミズナラ


ブナ科 コナラ属 *Quercus crispula*



落葉樹。樹皮は大きな割れ目ができます。葉は鋸歯があり、下面は淡緑色です。葉柄はほとんどありません。分布は北海道から九州まで。


用語解説

広葉樹 / コナラ・ケヤキのように幅の広い葉を持った樹木。
 針葉樹 / マツ・スギのように針状、またはうろこ状の葉を持った樹木。
 常緑樹 / 1年中緑の葉をつけている樹木。クロマツのような針葉樹と、クスノキのような広葉樹がある。
 落葉樹 / 冬には葉を落とす樹木。コナラのような広葉樹が多く、針葉樹ではカラマツやメタセコイアなどがある。



アカガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus acuta*



常緑樹。樹皮はなめらかですが、大きくなると不規則にはがれます。葉は長さ8～15センチで全縁。葉の下面は緑色、葉柄は長さ2～4センチで、葉の先は長く尖ります。分布は宮城・富山県以南から屋久島まで。

ツクバネガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus sessilifolia*



常緑樹。葉は長さ5～12センチで、葉の先だけに浅い鋸歯があります。また、葉は枝先に集まってつく傾向があります。葉の下面は淡緑色で、葉柄は長さ0.5～1センチ。分布は宮城・富山県以南。

ウラジロガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus salicina*



常緑樹。小枝は灰白色。葉の下面は無毛で、名前の通り目立って白色です。中央の葉脈の上面はへこんでいます。分布は宮城・新潟県以南。

シラカシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus myrsinaefolia*



常緑樹。樹皮はなめらか。小枝は黒色。葉の下面はほとんど無毛で灰緑色です。生け垣や防風樹とされることがあります。分布は福島県以南から屋久島まで。

アラカシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus glauca*



常緑樹。樹皮はなめらか。葉は長さ5～10センチで上半分に大きな鋸歯があります。葉の上面はやや光沢があり、下面は灰白色で毛があります。公園や庭木などによく使われます。分布は宮城・山形県以南。

イチイガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus gilva*



常緑樹。樹皮はなめらかですが、大きくなると不規則にはがれます。葉は長さ4～12センチで、葉の上半分に鋸歯があります。葉の下面には黄土色の毛が密生します。分布は関東南部以南。

オキナワウラジロガシ


ブナ科 コナラ属 *Quercus miyagii*



常緑樹。葉は先の方に低い鋸歯がまばらにあり、下面は白色または淡緑色です。他の種とくらべて、果実が非常に大きいのが特長です。分布は奄美大島から西表島まで。

マテバシイ


ブナ科 マテバシイ属 *Lithocarpus edulis*



常緑樹。樹皮はなめらか。葉は全縁で葉の下面は薄茶色です。果実は大きくアクも少ないのですが、スダジイやコジイとくらべて美味しくありません。分布は関東南部以南。

シリブカガシ

ブナ科 マテバシイ属 *Lithocarpus glabra*



常緑樹。樹皮はなめらか。葉は先の方に浅い鋸歯があり、葉の下面は銀白色です。材は堅く、中国では農具に使われます。分布は近畿地方以南。

* ドングリや葉の大きさは、成熟や環境による影響によって変わります。各倍率は1つの目安としてください。