

ズグロミソゴイ


(分類) コウノトリ目サギ科 *Gorsachius melanolophus*

(環境省RDB種) 準絶滅危惧


(分布) 八重山諸島で留鳥。東南アジアからインドの熱帯、亜熱帯域に分布。

(生態) 4月末に抱卵し、ヒナは5月中旬にふ化し、6月下旬に巣立つ。薄暗い林内で、薄暮時や夜間によく鳴き、森林中の沢や地上で両生類、昆虫類などの小動物を捕食する。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 0 B = 0 C = 0



1997年－2002年 メッシュ数 A = 0 B = 2 C = 0





ゴイサギ

(分類) コウノトリ目サギ科 *Nycticorax nycticorax*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 本州以南で留鳥。南西諸島で冬鳥。世界の温帯から熱帯に広く分布。

(生態) 樹林でしばしば他のサギ類と共に4～9月に集団で営巣する。1～6卵を22日程度抱卵する。育雛前期は日中も給餌するが、後期には夜間だけになる。薄暮から夜間に、浅い水辺で魚、甲殻類、両生類などの小動物を捕食する。



ササゴイ


(分類) コウノトリ目サギ科 *Butorides striatus*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 本州以南で夏鳥。九州南部以南で越冬。世界の熱帯から亜熱帯に分布。

(生態) 4～5月頃渡来し、水辺の樹上に小集団で営巣する。3～4卵を22日前後抱卵し、ヒナは約1か月して独立する。浅瀬で待ち伏せ、飛びついて魚を捕食する。葉片などを流して「まき餌漁」をすることもある。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 31 B = 16 C = 45



1997年－2002年 メッシュ数 A = 25 B = 9 C = 51





アカガシラサギ

(分類) コウノトリ目サギ科 *Ardeola bacchus*

(環境省 RDB 種) -

(分布) おもに旅鳥。熊本と秋田などで繁殖の記録がある。中国東部から東南アジアに分布。

(生態) 他のサギ類と共に、樹上で集団で営巣する。3～6を産む。湿地や草地で魚、甲殻類、昆虫類を食べる。



アマサギ


(分類) コウノトリ目サギ科 *Bubulcus ibis*

(環境省 RDB 種) -

(分布) おもに本州以南で夏鳥。九州以南からフィリピンなどで越冬。世界的に分布を拡大。

(生態) 4～9月に他のサギ類と共に、樹上で集団営巣する。一巢の卵数は2～5卵で、湿地や草地でカエルや昆虫類を食べる。他のサギ類よりも乾燥した所を好み、牧場などでもよくみられる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 40 B = 6 C = 37



1997年－2002年 メッシュ数 A = 46 B = 6 C = 71

