

サメビタキ


(分類) スズメ目ヒタキ科 *Muscicapa sibirica*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 本州中部以北で夏鳥。東アジアやチベットなどで繁殖し、東南アジアやインド亜大陸北部で越冬する。

(生態) 亜高山帯の針広混交林に5月頃渡来し、針葉樹の樹上に営巣する。3～5卵を雌雄で抱卵、育雛する。9月から10月頃に渡去する際には小群がみられる。枝から飛びだし飛翔する昆虫を捕食しては枝に戻る。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 11 B = 24 C = 9



1997年－2002年 メッシュ数 A = 1 B = 13 C = 10



コサメビタキ


(分類) スズメ目ヒタキ科 *Muscicapa daurica*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 九州以北で夏鳥。アジア東部の中・緯度地域で繁殖し、東南～南アジアなどで越冬。

(生態) 4月頃に落葉広葉樹林に渡来し、樹木の枝上に営巣する。4～5卵を雌が13日前後抱卵し、13日前後で巣立つ。繁殖期以外は単独で見られることが多い。枝から飛びだし飛翔する昆虫を捕食しては枝に戻る。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 57 B = 104 C = 55



1997年－2002年 メッシュ数 A = 25 B = 100 C = 64



サンコウチョウ


(分類) スズメ目カササギヒタキ科 *Terpsiphone atrocaudata*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 本州以南で夏鳥。南西諸島で留鳥(南西諸島産亜種リュウキュウサンコウチョウ)。インドシナなどで越冬。

(生態) 5月頃渡来し、薄暗く林内が開けた沢沿いの広葉樹や針葉樹上に営巣する。3~5卵を雌雄交代で13日前後抱卵し、11日前後で巣立つ。9月頃に渡去する。昆虫を空中で捕える。

1974年—1978年 メッシュ数 A = 51 B = 230 C = 22



1997年—2002年 メッシュ数 A = 46 B = 241 C = 33



エナガ


(分類) スズメ目エナガ科 *Aegithalos caudatus*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 九州以北で留鳥。ユーラシアの中・高緯度地域に広く分布。

(生態) 雑木林などの落葉広葉樹林にすみ、2～5月に繁殖する。7～12卵を雌雄で14日前後抱卵し、16日前後で巣立つ。昆虫やその卵、樹液、漿果など多様なものを食べる。冬は群れでねぐらをとる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 150 B = 205 C = 283



1997年－2002年 メッシュ数 A = 80 B = 245 C = 386



ハシブトガラ


(分類) スズメ目シジュウカラ科 *Parus palustris*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 北海道で留鳥。東アジアとヨーロッパに分かれて分布。

(生態) 落葉広葉樹林にすみ、4月中旬頃から樹洞に営巣する。5～8卵を雌が13日前後抱卵する。なわばり定着性が強く、通年のなわばりをもつ。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 18 B = 91 C = 17



1997年－2002年 メッシュ数 A = 27 B = 119 C = 46

