

イカル


(分類) スズメ目アトリ科 *Eophona personata*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 九州以北で繁殖。東北以北のものは本州中部以南で越冬。極東地域と朝鮮、中国東南部沿岸域に分布。

(生態) 平地から低山の落葉広葉樹林にすみ、樹上に営巣する。3～5卵を産む。おもに昆虫の幼虫などを給餌する。非繁殖期には群れで平地の林にみられ、広葉樹の漿果や乾果を大きなくちばしで割って食べる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 17 B = 417 C = 77



1997年－2002年 メッシュ数 A = 7 B = 425 C = 120



シメ


(分類) スズメ目アトリ科 *Coccothraustes coccothraustes*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 本州中部以北で繁殖。本州以南で越冬。ユーラシアの中・高緯度地域に広く分布。

(生態) 落葉樹林の林縁や低木林の低木上に、4～6月につがい毎またはゆるいコロニーで繁殖する。3～6卵を雌が約10日抱卵し、約10日間で巣立つ。ヒナには昆虫の幼虫を給餌するが、成鳥はおもに漿果、種子などの植物質を食べる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 4 B = 23 C = 71



1997年－2002年 メッシュ数 A = 4 B = 19 C = 92





ニューナイスズメ

(分類) スズメ目ハタオリドリ科 *Passer rutilans*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 本州中部以北で繁殖。本州中部以南で越冬。アジア中・東部の温帯～亜熱帯に分布。

(生態) ブナ林など落葉広葉樹林で繁殖し、樹洞や巣箱に営巣する。4～6卵をおもに雌が14日前後抱卵し、17日前後で巣立つ。ヒナには昆虫の幼虫などを給餌するが、成鳥はおもにイネ科草本の種子などを食べる。



スズメ


(分類) スズメ目ハタオリドリ科 *Passer montanus*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 小笠原諸島を除く全国で留鳥。ユーラシアの亜寒帯～熱帯に広く分布。

(生態) 市街地を含む平地から低山の人家付近にすむ。4～8月に人工物のすき間などに営巣する。4～7卵を12日前後抱卵し、14日前後で巣立つ。1繁殖期に2回繁殖するものもいる。ヒナにはおもに昆虫の幼虫を給餌する。雑草の種子から昆虫まで食性が広い。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 545 B = 121 C = 226



1997年－2002年 メッシュ数 A = 398 B = 145 C = 330



コムクドリ


(分類) スズメ目ムクドリ科 *Sturnus philippensis*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 本州中部以北で夏鳥。サハリン南部と南千島で繁殖し、カリマンタン北部やフィリピンで越冬。分布範囲が狭い。

(生態) 4月頃疎林や林縁に渡来し、樹洞や巣箱に営巣する。3～8卵を雌雄で11日前後抱卵し、18日前後で巣立つ。非繁殖期には群れを成し10月には渡去する。昆虫や漿果を食べる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 99 B = 50 C = 55



1997年－2002年 メッシュ数 A = 40 B = 43 C = 58

