

ホシガラス


(分類) スズメ目カラス科 *Nucifraga caryocatactes*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 四国以北で留鳥。ユーラシア中・高緯度地域に広く分布。

(生態) 亜高山帯の針葉樹林帯にすみ、4月頃針葉樹の樹上に営巣する。3～4卵を産む。雑食性だが、ハイマツやオオシラビソなどの種子をよく食べ、貯食する。冬期には低地に移動するものもいる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 3 B = 7 C = 44



1997年－2002年 メッシュ数 A = 1 B = 1 C = 35





ハシボソガラス

(分類) スズメ目カラス科 *Corvus corone*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 九州以北で留鳥。沖縄島でまれな冬鳥。ユーラシアの中・高緯度地域に広く分布。

(生態) 開けた農耕地や河川敷などに通年なわばりを設け、樹上に営巣する。3～5卵を19日前後抱卵し、32日前後で巣立つ。非繁殖期には大きなねぐらを形成する。雑食性で、果実や種子、昆虫や魚などを食べる。



ハシブトガラス


(分類) スズメ目カラス科 *Corvus macrorhynchos*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 小笠原諸島を除く日本全国で留鳥。サハリンを含めたアジア東部から南部に分布。

(生態) 市街地から山地の森林にすむ。3～6月に樹上に営巣。3～5卵を雌が約20日間抱卵し、32日前後で巣立つ。非繁殖期には大きなねぐらをつくる。雑食性で、果実や種子、昆虫や肉、残滓などを食べる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 157 B = 139 C = 592



1997年－2002年 メッシュ数 A = 105 B = 139 C = 792





コブハクチョウ (外来種)

(分類) カモ目カモ科 *Cygnus olor*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 放し飼いの個体が局所的に繁殖。伊豆諸島八丈島では野生個体の繁殖記録がある。ユーラシア中北部に生息。世界各地に移入。

(生態) ヨーロッパでは4月中旬に5～7卵を産み、6月にふ化した雛は、翌年1月頃まで親のなわばりに留まる。日本では、1977年に北海道大沼から逃げた個体がウトナイ湖で繁殖し、茨城県北浦での越冬がみられている。



コリンウズラ (外来種)

(分類) キジ目キジ科 *Colinus virginianus*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 北アメリカや中米に分布。日本では猟犬訓練用に放鳥された。

(生態) 開けた森林地帯、雑木林、農地近くの藪などを好む。植物の種子や葉が主食だが、昆虫類などの無脊椎動物や果実も食べる。

