

注意

今回、調べる虫の仲間のうち、かみついたり、はさんだり、においがするものもいますので、気をつけてください。また、ハチの仲間に出会ったら、ゆっくりとした動作で、静かにその場から立ち去りましょう。

大きなカミキリムシの仲間

この仲間は、卵を産むときに幹や枝を傷つけます。そこから樹液がしみ出すので、彼らは樹液を吸う虫のくらしをささえているのです。また、幼虫は枯れかけた木などで育つので、木の世代交代が進んでいる林に多く見られます。

対象 成虫

体の大きさ 約3～6cm

探すコツ

林の縁の葉や、切った木を積んでいるところに飛んできます。



ルリボシカミキリ



シロスジカミキリ



ノギリカミキリ



ミヤマカミキリ

オサムシの仲間

地面を歩く虫ですが、樹上でくらす種も見られます。ミミズや陸貝などを食べるため、湿っぽく、落ち葉がつもっているような林にすんでいます。

この仲間は、沖縄地方では種が少なくなります。

対象 成虫

体の大きさ 約2～7cm

探すコツ

地面を注意して見ながら歩いていると見つかります。また、腐らせた肉で引き寄せることもできます(*2)。



アオオサムシ



ヒメマイマイカブリ



エサキオサムシ



オオルリオサムシ

センチコガネの仲間

地面を歩く虫ですが、飛んでいることもあります。けものフンなどを食べるため、けものがいる大きな林にすんでいます。体の色は、赤・緑・青・紫などの強い金属光沢があります。

対象 成虫

体の大きさ 約2cm前後

探すコツ

けものフンや死体があつたら、その下に隠れています。また、腐らせた肉で引き寄せることもできます(*2)。



センチコガネ



オオセンチコガネ

いちばん印象に残った虫

～ の仲間も含め、調べている林であなたが印象に残った虫を写真に撮ってください。

クワガタムシを引き寄せるには

(*1)

皮をむいて1～2日置き、かおりが強くなったバナナを使う

バナナを入れて口を結んだストッキング



園芸用のなわがよい

地面に近い木の幹にしぼりつける

一晩置く。ストッキングの中やその下に、クワガタムシが隠れているかもしれません。

オサムシなどを引き寄せるには


(*2)

肉の入った紙コップにもう1つコップを重ねる

紙皿の雨よけ

割りばし

ほんの少し地面より上に



1～2日置いて、腐らせた肉を入れる

虫がケンカしないように落ち葉を入れる

半日置く。オサムシなどがコップに落ちています。

調査がすんだら、後片づけをお願いします。掘った穴も埋めなおしておきましょう。