

平成25年度
重要生態系監視地域モニタリング推進事業
(森林・草原調査)
調査報告書

平成26(2014)年3月
環境省自然環境局 生物多様性センター

目 次

要約

Summary

I	調査の概要	1
1.	目的	3
2.	調査項目及び調査頻度	3
3.	調査サイトの配置状況	4
II	コアサイト・準コアサイト調査実施状況及び調査結果	5
1.	調査サイトの配置状況	7
2.	毎木調査	13
(1)	調査方法	13
(2)	平成 25 (2013) 年度調査結果	13
(3)	集計・解析	14
1)	集計・解析方法	14
2)	樹木の多様性	16
3)	森林の炭素蓄積量とその変化	20
4)	森林動態	21
3.	落葉落枝・落下種子調査	24
(1)	調査方法	24
(2)	平成 25 (2013) 年度調査結果	24
(3)	集計・解析	24
1)	集計・解析方法	24
2)	落葉落枝量	25
3)	落下種子量	29
4.	地表徘徊性甲虫調査	30
(1)	調査方法	30
(2)	平成 25 (2013) 年度調査結果	30
(3)	集計・解析	32
1)	集計・解析方法	32
2)	地表徘徊性甲虫	33
3)	林床環境	42
5.	鳥類調査	48

(1) 調査方法	48
1) 鳥類調査	48
2) 植生概況調査	48
(2) 平成 25 (2013) 年度調査結果	49
(3) 集計・解析	50
1) 集計・解析方法	50
2) 越冬期群集構成	51
3) 繁殖期群集構成	55
4) 植生概況調査	58
III 一般サイト調査実施状況及び調査結果	61
1. 調査サイトの配置状況	63
2. 植生概況調査	64
(1) 調査方法	64
(2) 平成 25 (2013) 年度調査結果	64
(3) 集計・解析	64
1) 集計・解析方法	64
2) 植生の構造解析	65
3. 鳥類調査	67
(1) 調査方法	67
(2) 平成 25 (2013) 年度調査結果	67
(3) 集計・解析	67
1) 集計・解析方法	67
2) 記録鳥類	74
3) 植生の階層構造と鳥類の種多様度の関係	77
4) 外来種	80
5) 分布域の高緯度への移動	83
IV 調査マニュアル (平成 25 (2013) 年度調査版)	85

要 約

1. 本コアサイト 20 か所において、原則として毎木調査（樹種、幹の胸高周囲長）、落葉落枝・落下種子調査（落葉等の落下量）、地表徘徊性甲虫調査（地表徘徊性甲虫の種と個体数）、鳥類調査（繁殖期・越冬期で種と個体数）を実施した。準コアサイト 7 か所において、主に毎木調査及び鳥類調査を実施した。
2. 一般サイトでは、鳥類調査（繁殖期・越冬期で種と個体数）を実施した。繁殖期は森林 71 サイト、草原 13 サイト、計 84 サイトで、越冬期は森林 55 サイト、草原 12 サイト、計 77 サイトで調査を実施した。
3. 本コアサイト及び準コアサイトにおける毎木調査の結果、調査開始時から 2013 年度までの間で、調査区内の出現種の増減は、最大で 4 種の増加、6 種の減少があった。地上部現存量については、2011 年度以来、ナラ枯れが進行している愛知赤津で減少していた。調査開始以降の森林の炭素蓄積量はほとんどの森林で増加する傾向が見られた。森林動態については、全体として死亡率・加入率に大きな変動はなかった。死亡率と新規加入率の平均値である回転率は、全体では約 0.3～2.5%であった。これについても例年とほぼ変わらぬ値であった。
4. 本コアサイト及び一部の準コアサイトにおける落葉落枝・落下種子調査では、2012 年度までのデータを集計した結果、ほとんどの調査区で 2012 年度の年間落葉量・年間落下リター量に大きな変動は見られなかった。全体として、落葉樹林では秋季に明瞭なピークがみられるのに対し、常緑樹林では年に複数回のピークがみられた。落下種子量では、2011 年度に豊作だったアカシデやサカキが 2012 年度では凶作に転じた。種子生産の豊凶の同調性がブナ科樹木、クマシデ属樹木などで 2004 年から 2012 年度にかけて確認された。
5. 本コアサイト及び一部の準コアサイトにおける地表徘徊性甲虫調査の結果、8,858 個体の甲虫成虫が捕獲された。主要な分類群（オサムシ科、シデムシ科、センチコガネ科、ハネカクシ亜科）の種数は 97 種、オサムシ科の種数は 81 種であった。オサムシ科、シデムシ科、ハネカクシ科、センチコガネ科は総捕獲個体数のそれぞれ 61%、17%、10%、8%を占めていた。二次林・人工林の多くでは、甲虫類の個体数が増加傾向にある一方、冷涼な地域の成熟林・高齢二次林の多くでは個体数が減少傾向にあった。昨年度とは反対に、オサムシ属の個体数が例年より多く、*Synuchus* 属の個体数が例年より少ないサイトが、比較的温暖な地域を中心に多かった。半数近くの調査区で、林

床植生被度の減少傾向が認められた。冬季のセルロース分解速度は、設置期間中の気温・降水量と正の相関を示した。同じ気温・降水量の条件下では、落葉広葉樹林で分解が速く、針葉樹林で遅い傾向が見られた。

6. 本コアサイト及び準コアサイトにおける越冬期の鳥類調査での優占種やギルド別の構成比は過年度の結果とほぼ一致していたが、2012 年度はヒガラが少なかった点が異なっていた。他の調査の結果ではヒガラが低地に多かったことが報告されており、ヒガラが山から低地に移動したことがモニタリングの結果に影響を及ぼしたことが示唆された。繁殖期の調査結果は、ヒヨドリ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラが優占しており、出現種、ギルド別の構成比も越冬期以上に過年度との違いが小さく、繁殖期の鳥類相が安定していることが示された。
7. 一般サイトにおける鳥類調査では2013 年度の繁殖期には合計 130 種、2011 年度越冬期には合計 107 種の鳥類が観察された。森林サイトでは群集高多様度と繁殖期における鳥類の種多様度の有意な関係性が見られた。外来種は5 種が記録された。そのうちガビチョウとソウシチョウの出現率は昨年度に比べ、同等か増加していた。またこれらの種の分布域は昨年度と同等であった。特にソウシチョウは分布拡大と個体数が増加していた。

Summary

1. A tree census (species and girth of trunk at breast height), litter and seed trap survey (amount of litterfall), ground-dwelling beetle census (species and abundance), and bird census (species and abundance in the breeding and wintering seasons) were conducted at 20 core sites. Tree and bird censuses were also conducted at 7 sub-core sites.
2. With respect to satellite sites, we surveyed birds in the breeding and wintering seasons of 2013; 81 sites were surveyed (69 forests and 12 grasslands) for the breeding season, and 58 (50 forests and 8 grasslands) for the wintering season.
3. In the tree census at the core and sub-core sites, the number of species in each plot was slightly different from the first census (from a 6 species decrease to a 4 species increase). Tree above-ground biomass had decreased in the Aichi-akazu site, where many oak trees were damaged by Japanese oak wilt disease in 2011. The above-ground biomass of trees had increased from the beginning of the survey, at almost all sites. Regarding forest dynamics, the rates of recruitment and death of trees were within the normal range. The turnover rate (i.e., the average of recruitment and mortality) ranged from 0.3-2.5%, similar to past records.
4. In the litter and seed trap survey conducted at the core and sub-core sites, the respective amounts of annual leaf fall and annual litterfall in 2012 were within the normal range at almost all sites. Seed fall of *Carpinus laxiflora* and *Cleyera japonica* was high in 2011, but low in 2012. From 2004-2012, the annual variation in seed production was synchronized across the forests in some tree species such as oaks and *Carpinus* species.
5. In the ground-dwelling beetle census at the core and sub-core sites, 8,858 adult beetles were captured, of which 97 species of major families/subfamilies (Carabidae, Silphidae, Geotrupidae, Staphylininae), including 81 species of Carabidae, were identified. Carabidae, Staphylinidae, Silphidae, and Geotrupidae accounted for 61%, 17%, 10%, and 8% of the total individuals, respectively. The abundance of beetles has been increasing in secondary and artificial forests, and decreasing in old-growth and

old secondary forests in cool regions. The abundance of *Carabus* spp. was greater and *Synuchus* spp. less than in previous years in many sites, mainly in relatively warm regions. Forest floor vegetation cover has been decreasing in nearly half the plots. The decomposition rate of cellulose in winter positively correlated with air temperature and precipitation. The cellulose decomposition rate was higher in deciduous broad-leaved forests and lower in coniferous forests.

6. Bird surveys over the 2009 to 2012 wintering seasons at the core and sub-core sites showed that the dominant species and proportions of species comprising each guild were largely the same, while the abundance of Coal Tits was less in 2012. Other survey results showed that Coal Tits were abundant in lowland groves, suggesting that they have descended from highland forests to lowland groves. Therefore, the local movement of birds was assumed to affect the results of population monitoring in the wintering period. The survey in the 2013 breeding season showed that the dominant species (Brown-eared Bulbul, Coal Tit, Varied Tit, and Great Tit), the detected species, and the proportions of species comprising each guild were roughly the same as in 2011, suggesting that the breeding population was stable.
7. A total of 132 species for the 2013 breeding season, and 107 species for the 2012-2013 wintering season, were recorded in the bird censuses performed at the satellite sites. The species diversity of breeding birds correlated with foliage height diversity. In total, five alien species were recorded. Among them, the observation rate, based on the number of Hwamei (*Garrulax canorus*) and Red-billed Leiothrix (*Leiothrix lutea*), remained roughly the same as last year. The distribution areas of the species were similar to those in the previous term. As in the past two years, the Red-billed Hillrobin was confirmed to be breeding at the grassland site.

I 調査の概要

1. 目的

モニタリングサイト1000は、全国の様々なタイプの生態系について、合計約1000の調査サイトにおいて継続して調査を行い、生態系の指標となる生物種の個体数の変化等のデータを収集していく調査である。

モニタリングサイト1000 森林・草原調査では、樹木、昆虫（地表徘徊性甲虫）、鳥類を対象生物として、2004年度から調査を行っている。

2. 調査項目及び調査頻度

モニタリングサイト1000 森林・草原調査では、A. 毎木調査又は植生概況調査、B. 落葉落枝・落下種子調査（リター・シードトラップ調査）、C. 地表徘徊性甲虫調査（ピットフォールトラップ調査）、D. 鳥類調査を実施している。調査頻度は調査サイトによって異なり、調査項目及び調査頻度の違いにより、コアサイト、準コアサイト、一般サイトの3種類の調査サイトに区分している（表I-2-1）。

表I-2-1. モニタリングサイト1000 森林・草原調査における調査項目及び調査頻度

	調査頻度	調査項目			
		毎木又は 植生概況	落葉落枝・ 落下種子	地表徘徊性 甲虫	鳥類
コアサイト	毎年	○	○	○	○
準コアサイト	おおむね 5年に1度	○			○
一般サイト	おおむね 5年に1度	○			○

なお、各調査項目の調査方法の概要は、「Ⅱ 2. ～ 5. の（1）調査方法」並びに「Ⅲ 2. 及び 3. の（1）調査方法」に、調査方法の詳細は、「Ⅳ 調査マニュアル（平成24（2012）年度調査版）」に示す。

3. 調査サイトの配置状況


コアサイト及び準コアサイトの配置状況は、「Ⅱ 1. 調査サイトの配置状況」に、一般サイトの配置状況は、「Ⅲ 1. 調査サイトの配置状況」に示す。

II コアサイト・準コアサイト調査実施状況 及び調査結果

1. 調査サイトの配置状況

コアサイト・準コアサイトは、日本の代表的な森林タイプ（常緑針葉樹林、針広混交林、落葉広葉樹林、常緑広葉樹林等）¹や気候帯（亜高山帯・亜寒帯、冷温帯、暖温帯、亜熱帯）を網羅し、かつ生物多様性保全のための国土10区分のすべての区域に配置されている（48サイト、63調査区。表Ⅱ-1-1、表Ⅱ-1-2、図Ⅱ-1-1、図Ⅱ-1-2、図Ⅱ-1-3）。2013年度は、新たなサイトの配置はなく、すでに配置されているサイトで継続調査を行った。

2013年度に調査を実施した調査区は、毎木調査：26サイト29調査区、落葉落枝・落下種子調査（リター・シードトラップ調査）：21サイト22調査区、地表徘徊性甲虫調査（ピットフォールトラップ調査）：21サイト28調査区、鳥類調査：27サイトである（表Ⅱ-1-1）。



図Ⅱ-1-1. 2004-2012 年度のコアサイト・準コアサイト数及び調査区数の推移

図中縦棒の黒塗り部分がコアサイト数、白抜き部分が準コアサイト数をそれぞれ示す。

¹ 本報告書では、針葉樹林とは、針葉樹の胸高断面積が全樹種の胸高断面積の60%以上の森林を指す。針広混交林とは、針葉樹の胸高断面積が全樹種の胸高断面積の40%以上、60%未満の森林を指す。落葉広葉樹林とは、針葉樹の胸高断面積が全樹種の胸高断面積の40%未満、かつ、落葉広葉樹の胸高断面積が広葉樹の胸高断面積60%以上の森林を指す。常緑広葉樹林とは、針葉樹の胸高断面積が全樹種の胸高断面積の40%未満、かつ、常緑広葉樹の胸高断面積が広葉樹の胸高断面積40%より大きい森林を指す。

表II-1-1. コアサイト・準コアサイト一覧

サイトプロットID	サイト名	サイトタイプ	プロット名	プロットコード	森林タイプ*	経度†	緯度†	標高(m)	毎木調査間隔	面積(ha)	モニ 1000 開始年	2013 年度調査実施状況			
												毎木	リタートラップ	ビットフォール	鳥類調査
200101	苦小牧	コア	苦小牧成熟林	TM-DB1	DB	42.71	141.57	80	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
200102		コア	苦小牧二次林 404 林班	TM-DB2	DB	42.69	141.59	64	5年毎	1.20	2004	-	-	○	
200103		コア	苦小牧二次林 308 林班	TM-DB3	DB	42.67	141.63	33	5年毎	0.81	2004	-	-	○	
200104		コア	苦小牧二次林 208 林班	TM-DB4	DB	42.70	141.57	85	5年毎	0.45	2004	-	-	○	
200105		コア	苦小牧アカエゾマツ人工林	TM-AT1	AT	42.68	141.61	43	5年毎	0.20	2004	-	-	○	
200106		コア	苦小牧カラマツ人工林	TM-AT2	AT	42.67	141.59	36	5年毎	0.20	2004	-	-	○	
200107		コア	苦小牧トドマツ人工林	TM-AT3	AT	42.71	141.58	50	5年毎	0.23	2004	-	-	○	
200201	カヌマ沢	コア	カヌマ沢溪畔林	KM-DB1	DB	39.11	140.86	435	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
200202		コア	カヌマ沢ブナ林	KM-DB2	DB	39.11	140.85	445	-	-	2004	-	-	-	
200301	大佐渡	コア	-	OS-EC1	EC	38.21	138.44	870	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
200401	小佐渡	コア	小佐渡豊岡	KS-DB1	DB	37.98	138.52	125	毎年	0.25	2004	○	○	○	○
200402		コア	小佐渡キセン城	KS-DB2	DB	38.01	138.48	350	5年毎	0.25	2004	-	-	○	
200501	小川	コア	-	OG-DB1	DB	36.94	140.59	635	毎年	1.20	2004	○	○	○	○
200601	秩父	コア	秩父ブナ・イヌブナ林	CC-DB1	DB	35.94	138.80	1200	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
200602		コア	秩父ウダイカンバ林	CC-DB2	DB	35.91	138.82	1090	5年毎	0.12	2004	-	-	-	
200603		コア	秩父 18 は 1 二次林	CC-DB3	DB	35.91	138.82	1090	5年毎	0.10	2004	-	-	-	
200604		コア	秩父矢竹沢	CC-AT1	AT	35.94	138.82	900	5年毎	計 0.88	2004	-	-	-	
200701	富士	準コア	-	FJ-AT1	AT	35.41	138.87	1015	5年毎	0.25 が 2 個	2004	-	-	-	-
200801	愛知赤津	コア	-	AI-BC1	BC	35.22	137.17	335	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
200901	綾	コア	-	AY-EB1	EB	32.05	131.19	490	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
201001	田野	コア	田野二次林	TN-EB1	EB	31.86	131.30	175	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
201002		コア	田野海岸林	TN-EB2	EB	31.38	131.26	26	-	-	2004	-	-	-	
201101	与那	コア	-	YN-EB1	EB	26.74	128.23	250	毎年	1.00	2004	○	○	○	○
201201	雨龍	コア	-	UR-BC1	BC	44.37	142.28	335	毎年	1.05	2005	○	○	○	○
201301	足寄	コア	足寄拓北	AS-DB1	DB	43.32	143.51	360	毎年	1	2005	○	○	○	○
201302		コア	足寄美盛	AS-DB2	DB	43.26	143.51	340	5年毎	1	2005	○	○	-	
201303		コア	足寄花輪	AS-DB3	DB	43.29	143.50	380	5年毎	0.6	2005	○	-	-	
201401	カヤの平	コア	-	KY-DB1	DB	36.84	138.50	1495	毎年	1.00	2005	○	○	○	○
201501	おたの申す平	コア	-	OT-EC1	EC	36.70	138.50	1730	毎年	1.00	2005	○	○	○	○
201601	和歌山	コア	-	WK-EC1	EC	34.07	135.53	825	毎年	1.00	2005	○	○	○	○
201701	市ノ又	コア	-	IC-BC1	BC	33.15	132.92	560	毎年	0.95	2005	○	○	○	-
201801	野幌	準コア	-	NP-DB1	DB	43.06	141.53	42	5年毎	1.04	2005	-	-	-	-
201901	早池峰	準コア	-	HY-EC1	EC	39.54	141.50	1215	5年毎	1.00	2005	-	-	-	-
202001	金目川	準コア	-	KK-DB1	DB	38.15	139.84	543	5年毎	1.00	2005	-	-	-	-
202101	御岳濁河	準コア	-	NG-EC1	EC	35.93	137.46	1880	5年毎	1.00	2005	-	-	-	-
202201	函南	準コア	-	KN-EB1	EB	35.16	139.01	600	5年毎	1.00	2005	-	-	-	-
202301	奄美	準コア	-	AM-EB1	EB	28.33	129.45	330	5年毎	1.00	2005	-	○	○	○
202401	小笠原石門	準コア	-	OW-EB1	EB	26.68	142.16	290	5年毎	1.00	2005	-	-	-	-
202501	仁鮎水沢	準コア	-	NB-EC1	EC	40.08	140.25	190	-	1.00	2006	-	-	-	-
202601	青葉山	準コア	-	AO-BC1	BC	38.25	140.85	120	5年毎	1.00	2006	-	○	○	-
202701	大山文珠越	準コア	-	DI-DB1	DB	35.36	133.55	1110	5年毎	1.00	2006	-	-	-	-
202801	春日山	準コア	-	KA-EB1	EB	34.68	135.86	310	5年毎	1.00	2006	-	-	-	-
202901	糟屋	準コア	-	KJ-EB1	EB	33.65	130.55	450	5年毎	1.00	2006	-	-	-	-
203001	屋久島照葉樹林	準コア	-	YK-EB1	EB	30.37	130.39	150	5年毎	1.00	2006	-	-	-	-
203101	芦生	コア	芦生桥上谷	AU-EC1	EC	35.35	135.74	750	毎年	1.00	2007	○	○	○	○
203102		コア	芦生モンドリ谷	AU-DB1	DB	35.35	135.74	720	5年毎	1.00	2007	○	-	-	
203201	上賀茂	コア	-	KG-EC1	EC	35.07	135.77	140	毎年	0.64	2007	○	○	○	○

表 II-1-1. (続き)

サイトプロット ID	サイト名	サイトタイプ	プロット名	プロットコード	森林タイプ*	経度†	緯度†	標高 (m)	毎木調査間隔	面積 (ha)	モニ 1000 開始年	2013 年度調査実施状況			
												毎木	リタートラップ	ビットフォール	鳥類調査
203301	半田山	準コア	-	HD-DB1	DB	34.70	133.92	110	5年毎	1.00	2007	-	-	-	-
203401	三之公	準コア	-	SN-EC1	EC	34.26	136.07	560	5年毎	1.00	2007	-	-	-	-
203501	対馬龍良山	準コア	-	TT-EB1	EB	34.15	129.22	160	5年毎	1.00	2007	-	-	-	-
203601	佐田山	準コア	-	SD-EB1	EB	32.74	133.00	320	5年毎	0.98	2007	-	-	○†	-
203701	屋久島スギ林	準コア	-	YS-EC1	EC	30.31	130.57	1200	5年毎	1.00	2007	-	-	-	-
203801	大山沢	コア	-	OY-DB1	DB	35.96	138.76	1425	毎年	1.00	2008	○	○	○	○
203901	大雪山	準コア	-	TA-EC1	EC	43.66	143.10	975	5年毎	1.00	2008	○	-	-	○
204001	大滝沢	準コア	-	OZ-DB1	DB	39.64	140.89	460	5年毎	1.00	2008	○	-	-	○
204101	高原山	準コア	-	TK-DB1	DB	36.88	139.80	925	5年毎	1.00	2008	○	-	-	○
204201	木曾赤沢	準コア	-	KI-EC1	EC	35.72	137.63	1175	5年毎	1.00	2008	○	-	-	○
204301	西丹沢	準コア	-	TZ-DB1	DB	35.47	138.99	1150	5年毎	1.00	2008	○	-	-	○
204401	臥龍山	準コア	-	GR-DB1	DB	34.69	132.19	1150	5年毎	1.00	2008	○	-	-	-
204501	那須高原	コア	-	NS-DB1	DB	37.12	140.01	900	5年毎	0.30	2009	-	-	-	○
204601	筑波山	準コア	-	TB-DB1	DB	36.23	140.10	780	5年毎	1.00	2009	○	-	-	○
204701	宮島	準コア	-	MY-EB1	EB	34.30	132.33	100	5年毎	1.00	2009	-	-	-	-
204801	西表	準コア	-	IR-EB1(仮)	EB(仮)	24.35	123.90	140	4年毎	1.00	2009	-	-	-	-
204901	椎葉	準コア	-	SI-DB1	DB	32.38	131.10	1190	5年毎	1.00	2009	-	-	-	-

* DB: 落葉広葉樹林、EB: 常緑広葉樹林、BC: 針広混交林、EC: 常緑針葉樹林、AT: 人工林。

† 世界測地系(WGS84)。

‡ 仁鮎水沢は2010年度より調査を中止した。

¶ サイトの自主的調査による。




図 2-1 第2期におけるモニタリングサイト 1000 森林・草原調査のコアサイト・準コアサイト。△: 針広混交林、■: 常緑針葉樹林、○: 落葉広葉樹林、●: 常緑広葉樹林。黒色下線はコアサイト、灰色は準コアサイト。複数調査区がある場合は毎年調査している調査区の森林タイプを表示している。
 * 仁鮎水沢は 2010 年度で調査を終了した。

表 II-1-2. コアサイト・準コアサイトの生物多様性保全のための国土区分と気候帯別配置

生物多様性保全 のための 国土 10 区分	亜高山帯・ 亜寒帯	冷温帯	暖温帯	亜熱帯	二次林等 *	人工林
(1) 北海道東部 区域	■大雪山	△雨龍 ○足寄	該当なし	該当なし	(○足寄)	
(2) 北海道西部 区域		○苫小牧 ○野幌	該当なし	該当なし	(○苫小牧)	(×苫小牧)
(3) 本州中北部 太平洋側区域	■御岳濁河	○小川 ○秩父 ○大山沢 ○高原山 ○那須高原 △青葉山 ■木曾赤沢		該当なし	(○秩父)	(×秩父) ×富士
(4) 本州中北部 日本海側区域	■おたの申す平 ■早池峰	○カヌマ沢 △大滝沢 ■仁鮎水沢** ○金目川 ○カヤの平	該当少ない	該当なし		
(5) 北陸・山陰 区域	該当少ない	■大佐渡 ○大山文殊越 ○臥龍山 ■芦生	■上賀茂	該当なし	○小佐渡	
(6) 本州中部 太平洋側区域		○西丹沢 ○筑波山	●函南 ●春日山	該当なし	△愛知赤津	
(7) 瀬戸内海 周辺区域	該当なし	該当少ない	●宮島	該当なし	○半田山	
(8) 紀伊半島・四 国・九州区域		○椎葉	■和歌山 △市ノ又 ■三之公 ●田野 ●綾 ●対馬龍良 ●佐田山 ●糟屋 ●屋久島照葉樹 林 ■屋久島スギ林	該当なし		
(9) 奄美・琉球 諸島区域	該当なし	該当なし	該当少ない	●与那 ●奄美 ●西表		
(10) 小笠原諸島 区域	該当なし	該当なし	該当少ない	●小笠原石門		

表中の凡例は図 II-1-2 と同じ。また、括弧書きはコアサイトの複数ある調査区のうち一部が該当する場合。

表中の「該当なし」又は「該当少ない」は、日本において、そこに該当する森林が「ない」又は「少ない」ことを表す。

* ここではコナラやカンバ類などの陽樹が優占するなど、種類組成が人為による影響を大きく受けた森林を指す。

** 仁鮎水沢は 2010 年度より調査を中止した。




図 II-1-3. コアサイト・準コアサイトの緯度、標高、森林タイプの関係

暖かさの指数 50℃・月は亜高山帯・亜寒帯常緑針葉樹林と冷温帯落葉広葉樹林の境界、85℃・月は冷温帯落葉広葉樹林と暖温帯・亜熱帯常緑広葉樹林の境界とされている。図中の凡例は図 II-1-2 と同じ。

* 仁鮎水沢は 2010 年度より調査を中止した。

2. 毎木調査

(1) 調査方法

各サイトにおいて1 ha (100m×100m)の調査区（プロット）を設けた。計測対象は調査区内に生育している樹木のうち、幹の胸高（高さ1.3m）周囲長が15cm 以上のものとした。幹の直径5 cm（つまり周囲長15.7cm）以上ではなく、周囲長15cm以上を対象としているのは、直径が新たに5 cm以上となる新規加入幹を確実にとらえるためである。サイズの指標として胸高周囲長を計測し、樹種名を記録した。

長期にわたる調査のために、測定した幹には個体識別ができるようアルミタグ（樹木番号）を付した。一個体が複数の幹に分かれているものについては、各幹で計測を行った。

調査間隔は、コアサイトの一部の調査区では毎年、その他のコアサイトの調査区と準コアサイトの調査区ではおおむね5年ごととしている。

(2) 平成 25（2013）年度調査結果

2013年度は、26 サイト 31 調査区で調査を行った（表Ⅱ-2-1）。雨龍と小川は春に、それ以外のサイトでは、秋から冬にかけて調査を行った。芦生モンドリ谷、大雪山、大滝沢、高原山、木曽赤沢、西丹沢、筑波山では初めての再調査となった。

表Ⅱ-2-1. 2013年度に毎木調査を実施したサイト及び調査区一覧

サイト名	サイトタイプ	調査区名	サイト名	サイトタイプ	調査区名
苦小牧	コア	苦小牧成熟林 苦小牧アカエゾマツ人工林	大雪山	準コア	-
カヌマ沢	コア	カヌマ沢溪畔林	大滝沢	準コア	-
大佐渡	コア	-	高原山	準コア	-
小佐渡	コア	小佐渡豊岡	木曽赤沢	準コア	-
小川	コア	-	西丹沢	準コア	-
秩父	コア	秩父ブナ・イヌブナ林 秩父 18 は 1 二次林	臥龍山	準コア	-
愛知赤津	コア	-	筑波山	準コア	-
綾	コア	-			
田野	コア	田野二次林			
与那	コア	-			
雨龍	コア	-			
足寄	コア	足寄拓北 足寄美盛 足寄花輪			
カヤの平	コア	-			
おたの申す平	コア	-			
和歌山	コア	-			
市ノ又	コア	-			
芦生	コア	芦生枡上谷 芦生モンドリ谷			
上賀茂	コア	-			
大山沢	コア	-			

(3) 集計・解析

1) 集計・解析方法

毎木調査は、樹木の種多様性の変化や炭素蓄積・吸収などの森林機能の変化を捉えるために行っている。樹木は寿命が長いこと、種多様性の変化は短期的には現れにくい。しかし樹木は移動できないため、その場所の環境や生物間相互作用の変化が、樹木の成長量、生死を変化させると予想される。このために変化する森林の動態は、炭素蓄積・吸収量を左右し、森林の更新、そして樹木の種多様性を変化させる。そこで、下記に着目し、胸高周囲長 15.7 cm 以上（胸高直径 5 cm 以上）の幹を対象に解析した。なお、集計・解析対象としたデータは 2014 年 2 月 28 日までにサイトから提出されたデータとした。

① 樹木の多様性

調査区ごとの出現種数を求めた。2 回以上調査している調査区については、調査開始時からの新たに加入した種及び調査区から消失した種の種数を求めた。

② 樹木の成長

樹木の成長による森林の炭素蓄積量を評価するため、樹木地上部の炭素現存量（以下、「地上部現存量」とする）を求めた。アロメトリー式（表 II-2-2）を用いて、幹の直径から推定した幹・枝・葉の乾燥重量の和に 0.5（乾燥重量中の炭素量の割合の概算値）を乗じたものを地上部現存量とした。また毎年調査を行っているコアサイトの調査区について、地上部現存量の 2004 年～2013 年度の年変化量を求めた。さらに、2 回以上調査を実施した調査区について、調査開始時からの地上部現存量の変化量を求めた。

③ 森林動態

各調査区の全幹における死亡率（前回の調査時から今回までに死亡した幹の割合）と、新規加入率（今回までに成長して調査対象木となった幹の割合）を以下の式で求めた。

$$\text{新規加入率 (\%・年}^{-1}\text{)} = \ln(N_f/N_s) \times 100 / t$$

$$\text{死亡率 (\%・年}^{-1}\text{)} = \ln(N_o/N_s) \times 100 / t$$

N_s : 今回調査時に生存していた幹数、 N_f : 今回調査時の幹数（生存した幹数と新しく胸高周囲長が 15.7 cm 以上になった幹数の和）、 N_o : 前回の調査時の幹数、 t : 前回から今回までの経過年数。死亡率と新規加入率の平均である回転率を求めた。動態を示すこれら指標の経年変化を求めた。

全幹と同様に、各調査区の種ごとの新規加入率、死亡率を求めた。

表II-2-2. 現存量推定にもちいた相対生長式 ($\ln W = a + b \ln DBH$, W : 絶乾重 (kg), DBH : 胸高直径 (cm))

サイト	出典	地域	森林	n	サンブル木			樹種	幹			枝			葉			根		
					胸高直径(cm)	最小	最大		a	b	R ²	a	b	R ²	a	b	R ²	a	b	R ²
北海道のサイト、亜高山帯(早池峰山、御岳濁河、おたの申す平)(広葉樹は式1a、1b、針葉樹は式1a、1cを使用。)																				
1a 小塚ほか 2006*		北海道・天塩	成熟林	29	6.5	55	21.4	ミズナラ、ダケカンバ、トドマツ	-2.493	2.338	0.99	-4.374	2.681	0.98	-4.350	1.973	0.96	-2.870	2.209	0.96
1b				14	6.5	55	20.8	ミズナラ、ダケカンバ						-3.487	2.147	0.99				
1c				5	10.5	50.2	21.4	トドマツ												
スギ林・北海道以外の常緑針葉樹林																				
仁駒水沢、大佐渡、芦生枡上谷、屋久島スギ林、木曾赤沢(地上部は、針葉樹は式2と3a、3bの平均、広葉樹は式4で求めた場合の平均、根は、針葉樹は式3a、3b、広葉樹は式5と式1aの平均。)																				
2 斉藤 1981		新潟	成熟林	5	22	68	18.7	スギ	-1.324	1.858	0.92	-6.215	2.725	0.82	-2.339	1.674	0.76			
針広混交林(北海道以外)																				
愛知赤津、青葉山、三之公、和歌山、上賀茂、市ノ又(地上部は、ツガは式3b、その他針葉樹は式3a、3b、広葉樹は式4cを使用。根は、ツガは式4c、モミとその他針葉樹は式3a、3b、広葉樹は式5と式1aの平均。)																				
3a Ando et al. 1977		高知	成熟林	3	10	30	-	モミ	-2.584	2.475		-4.729	2.531		-6.181	2.704		-1.370	1.746	
3b				9	30	90	-	モミ	-0.119	1.807		-4.483	2.459		-2.726	1.708		-3.813	2.464	
3c				7	4.5	50	-	ツガ	-1.665	2.185		-6.587	3.090		-6.332	2.406		-2.481	2.155	
3d				29	10	80	-	広葉樹	-2.825	2.586		-4.270	2.656		-3.853	1.743				
落葉広葉林(北海道以外の冷温帯)																				
金目川、カヌマ沢、小佐渡豊岡、カヤの平、小川、秩父ブナ・イヌブナ林、秩父ウダイカンバ林、秩父18は1二次林、大山文殊越、半田山、芦生モンドリ谷、大山沢、大滝沢、高原山、西丹沢、那須高原、椎葉																				
(根は、ツガは式3c、モミとその他針葉樹は式3a、3b、広葉樹は式5と式1aの平均。)																				
4 生島 1964		丹沢	成熟林	29	0.5	83.5	-	落葉広葉樹	-2.104	2.380**		幹枝			-3.497	1.720		-2.501	2.000	
5 Ogino 1977		京都	成熟林	8	0.5	≤ 70	-	落葉広葉樹												
常緑広葉樹林(亜熱帯、暖温帯)																				
佐田山、緑、田野二次林、対馬龍良、屋久島照葉樹林、奄美、与那、函南、春日山、粕屋、小笠原石門、宮島(地上部は、式6~8の平均、根は、ツガは式3c、モミとその他針葉樹は式3a、3b、広葉樹は式5と式1aの平均。)																				
6 Kawanabe 1977		沖縄・与那	二次林	13	5.2	43.6	13.6	常緑広葉樹	-2.111	2.215		-4.269	2.490		-4.688	2.000				
7 Kimura 1960		鹿児島	成熟林	10	-	-	-	常緑広葉樹	-2.003	2.340**		幹枝			-3.638	1.890				
8 Kohyama 1989		鹿児島	二次林	16-19	-	-	-	常緑広葉樹	-2.129	2.390†	0.99	地上部			-3.747	1.930	0.96			

備考: Takyu et al. (2005) を元に作成。*提供データを元に算出; **幹・枝現存量; †地上部現存量

2) 樹木の多様性

調査開始時から 2013 年度までに記録された種は、総計で、73 科 173 属 390 種（変種、途中で消失した種も含む）であった（表Ⅱ-2-3）。うち 2013 年度に調査を行った調査区で記録された種は 53 科 103 属 218 種であった（表Ⅱ-2-4）。前年度までと同様に年平均気温が高い場所の森林は低い場所の森林に比べ種数が多い傾向が見られた（表Ⅱ-2-3）。

調査開始時から最新調査年までに新たに加入した種は 0 ～ 4 種、調査区から消失した種は 0 ～ 6 種だった。多くのサイトで種数に大きな変化はないが、2013 年度は田野において 4 種が根返りや枯死によって消失した。

表Ⅱ-2-3. 2回以上調査した調査区での種数及び調査開始時から新たに加入した種と消失した種

調査区	年平均 気温	調査開始 年	最新調査 年	最新調査 年での種	新規加 入種数	消失種 数	加入した種	消失した種
大雪山	1.4	2008	2013	6	0	0		
御岳濁河	3.3	2005	2010	10	0	0		
おたの申す平	3.5	2006	2013	8	0	0		
雨龍	3.9	2005	2013	14	1	0	ハリウツギ	
足寄花輪	4.1	2007	2013	18	0	0		
早池峰	4.1	2005	2010	16	0	0		
足寄拓北	4.2	2006	2013	32	1	1	イヌエンジュ	ツルアジサイ
足寄美盛	4.4	2005	2013	17	0	1		チョウゼンヤマナラシ
カヤの平	4.7	2005	2013	20	1	1	ヤマウルシ	タラノキ
大山沢	6.1	2008	2012	45	1	0	ホソエカエデ	
苫小牧成熟林	6.9	2004	2013	33	0	2		ウダイカンバ ヤマブドウ
苫小牧二次林208林班	6.9	2005	2010	28	1	0	ナナカマド	
野幌	7	2005	2010	31	0	2		ミヤマザクラ オオバボダイジュ
苫小牧二次林404林班	7	2006	2011	39	1	0	イタヤカエデ	
苫小牧アカエゾマツ人工林	7.1	2007	2012	19	0	0		
苫小牧トドマツ人工林	7.1	2008	2011	7	0	0		
臥龍山	7.2	2007	2013	27	0	0		
苫小牧カラマツ人工林	7.2	2008	2010	21	2	1	ハンノキ バッコヤナギ	マユミ
大山文珠越	7.4	2006	2011	25	1	1	サワフタギ	ミズナラ
木曾赤沢	7.4	2008	2013	19	0	1		マンサク
秩父ブナ・イヌブナ林	7.6	2004	2013	50	0	4		ベニドウダン マユミ サンショウ アオダモ
大滝沢	7.6	2008	2013	24	1	0	リョウブ	
高原山	8.1	2008	2013	53	1	0	モミ	
秩父ウダイカンバ林	8.3	2004	2009	31	0	1		ツガ
秩父181二次林	8.3	2007	2012	36	0	0		
大佐渡	8.3	2004	2012	24	3	1	クロモジ ハリギリ ハウチウカエデ	エゾユズリハ
西丹沢	8.3	2008	2013	57	3	0	ツリバナ チョウゼンゴシイボタノキ	
金目川	8.4	2005	2010	26	2	0	ツノハシバミ ヤブデマリ	
カヌマ沢溪畔林	8.5	2004	2013	29	4	1	ツノハシバミ オオヤマザクラ コシアブラ マンサク	ウワミズザクラ
富士	8.7	2004	2009	35	0	3		シラビソ ミヤマザクラ ツタウルシ
小川	8.7	2004	2012	44	1	2	オオウラジロノキ	クサギ イヌザクラ
秩父矢竹沢	9.3	2004	2009	1	0	0		
芦生耕上谷	9.5	2007	2013	32	2	2	エゾユズリハ ツルアジサイ	ヤマウルシ クロモジ
和歌山	10.2	2005	2013	38	1	0	ウリカエデ	
青葉山	11.4	2005	2010	48	0	1		リョウブ
函南	11.9	2005	2010	41	0	0		
市ノ又	12	2005	2013	46	1	0	シイモチ	
小佐渡豊岡	12.5	2005	2012	23	1	0	オオバクロモジ	
愛知赤津	12.6	2004	2013	37	0	0		
屋久島スギ林	12.8	2007	2012	27	3	2	イヌツゲ クサギ ヤブニッケイ	シラカシ アオガシ
春日山	12.9	2006	2011	42	1	0	ヤブニッケイ	
柏屋	12.9	2006	2011	46	0	3		ツツラフジ ヤマハゼ アカメガシワ
綾	13.3	2004	2013	30	3	1	クロキ テツカエデ イイギリ	モチノキ
半田山	14.1	2007	2011	34	3	0	クロガネモチ ヤマコウバシ センダン	
上賀茂	14.2	2007	2013	16	1	1	ヤブツバキ	アセビ
対馬龍良山	14.5	2007	2012	30	1	1	アオキ	ユズリハ
田野二次林	15.7	2004	2013	61	2	6	ミサオノキ バリバリノキ	クマノミズキ マテバシイ イヌガシ シキミ ネムノキ ミズキ
佐田山	15.9	2007	2012	41	0	0		
屋久島照葉樹林	18.7	2006	2010	44	0	1		シャシヤンボ
奄美	19.2	2005	2010	56	0	1		ギーマ
与那	20.6	2004	2012	63	3	0	ホンバムクイヌビワ シマイズセンリョウ ウカキ バカンノキ	

表 II-2-4. 2013 年度に集計した調査区の出現種ごとの幹本数

種名	苦小牧成熟林	愛知赤津	足寄拓北	足寄美盛	足寄花輪	芦生棚上谷	綾	秩父ブナ・イヌブナ林	臥龍山	市ノ又	上賀茂	カヌマ沢深野林	カヤの平	おたの申す平	高原山	田野二次林	西丹沢	大雪山	大滝沢	木曽赤沢	雨窪	和歌山	合計
ヒノキ	0	590	0	0	0	0	0	0	0	40	852	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	1638	
サワラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	86	
スギ	0	0	0	0	0	656	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	692	
ネズミサシ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
アスナロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	0	397	
モミ	0	0	0	0	0	0	0	18	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	307	335	
ウラジロモミ	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	
オオシラビソ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268	
トドマツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	131	0	421	
アカエゾマツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	10	0	50	
エゾマツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	169	
トウヒ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	
アカマツ	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	58	
コマツガ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	286	
ツガ	0	0	0	0	0	0	0	37	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	276	
イヌマキ	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7	
カヤ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
シキミ	0	2	0	0	0	0	4	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	126	
クスノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
ヤブニツグイ	0	0	0	0	0	0	348	0	0	10	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	2	377	
カナクダノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
シロモジ	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	2	52	
オオバクロモジ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
バリバリノキ	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	
カゴノキ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	22	
アオガシ	0	0	0	0	0	0	74	0	0	67	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	147	
タブノキ	0	0	0	0	0	0	31	0	0	8	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	98	
イヌガシ	0	0	0	0	0	0	81	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
シロダモ	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	
ホノノキ	40	4	17	6	5	14	0	0	14	2	0	13	0	0	1	1	7	0	52	151	13	1	341
キタコブシ	19	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
タムシバ	0	112	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	156	
オガタマノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
ツグ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
アヲノキ	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	81	
ヤマビロ	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	153	
ヤマモガシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
カウラ	24	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	
ユズリハ	0	0	0	0	0	1	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
エゾユズリハ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
ヒメユズリハ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
イスノキ	0	0	0	0	0	0	410	0	0	18	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	1114	
マンサク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
マルバマンサク	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
ヤマブドウ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
キバシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
アデク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
ウルマサキ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
ヒロハツリバナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
ツリバナ	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	1	0	2	0	0	41	
マユミ	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	0	0	0	21	
イヌエンジュ	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
フジ	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
ケヤマハノキ	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
ネコシテ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
ヤエガワカンバ	0	0	0	16	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
ダケカンバ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	66	0	0	70	0	0	22	0	163	
ミズメ	0	0	0	0	0	12	0	2	4	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	3	27
ウダイカンバ	1	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	
シラカンバ	0	0	0	5	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
オノオレカンバ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
サワシバ	70	0	1	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	64	0	21	0	0	0	0	311	
クマシテ	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	5	39	
アカシテ	0	17	0	0	0	3	31	0	4	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	91	164	
イヌシテ	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	20	
ツリハシバミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0	0	0	4	0	0	0	0	29	
アサダ	53	0	67	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	128	
クリ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	
ツブラジイ	0	0	0	0	0	0	0	0	21	45	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	137	
スダジイ	0	0	0	0	0	0	35	0	0	87	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	268	
ブナ	0	0	0	0	0	69	0	47	282	0	0	64	246	0	95	0	131	0	25	0	3	962	
イヌブナ	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	226	0	1	0	0	0	0	589	
マテバシイ	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 II-2-4. (続き)

種名	苦 小 牧 成 熟 林	愛 知 赤 津	足 寄 拓 北	足 寄 美 盛	足 寄 花 輪	芦 生 棚 上 谷	綾	秩 父 ブ ナ ・ イ ヌ ブ ナ 林	臥 龍 山	市 ノ 又	上 智 茂	カ ヌ マ 沢 深 野 林	カ ヤ の 平	お た の 申 す 平	高 原 山	田 野 二 次 林	西 丹 沢	大 雪 山	大 滝 沢	木 曽 赤 沢	雨 窪	和 歌 山	合 計
コナラ	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	139
ツクバハカシ	0	13	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
サワグルミ	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	103	0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	176
ヤマモモ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37
アカメガシワ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
シラキ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	1	77
イイギリ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
チョウセンヤマナシ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ハッコヤナギ	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
コバノミナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	37
ホルトノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
ハコネグミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
イヌビワ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	11
ヤマグワ	36	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
クロウモドキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
オオウラジロノキ	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	15
カマツカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	114
カスミザクラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
ウリミズザクラ	0	0	0	0	0	2	0	5	1	0	0	0	22	0	13	0	0	0	1	4	0	0	48
マメザクラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	46
ヤマザクラ	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	3	18
ミヤマザクラ	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
オオヤマザクラ	21	0	18	25	7	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	75
シウリザクラ	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	20	0	150	
アズキナシ	39	19	3	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	77
ナナカマド	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	36	1	0	0	0	1	0	0	144	0	190
ウラジロノキ	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	12
ハルニレ	10	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
オヒョウ	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
ケヤキ	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
シナノキ	80	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	28	0	0	0	21	0	173
オオハクダイジュ	53	0	111	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	168
スルデ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ヤマウルシ	0	1	13	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26
キハダ	6	0	4	16	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	7	0	53
カラスザンショウ	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ザンショウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
オオモミジ	12	0	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	2	0	18	0	0	0	0	8	58
ヤマモミジ	10	0	11	0	5	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
アサノハカエデ	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
ナドリノキ	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ミツバカエデ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ウリカエデ	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
カジカエデ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	13	0	0	0	0	24
ヒトツバカエデ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ハウチワカエデ	29	0	9	0	1	0	0	20	20	0	0	12	81	0	8	0	10	0	6	0	0	0	196
コミネカエデ	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	26	0	41
クロビイタヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
イタヤカエデ	283	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	40	0	0	0	0	6	0	15	0	226	7	584
オニイタヤ	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
ウラゲエンコウカエデ	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
エゾイタヤ	0	0	128	28	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
エンコウカエデ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
アカイタヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
イトマキイタヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
メグスリノキ	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	17
テツカエデ	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
ウリハダカエデ	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	13	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26
オオイタヤメイゲツ	0	0	0	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	29
コハナチワカエデ	0	140	0	0	0	25	0	37	4	0	0	3	0	0	8	0	2	0	6	0	0	5	230
ヒナウチワカエデ	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	5	0	7	0	0	2	0	0	17
ミネカエデ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
オガババ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	52	0	0	0	0	54
トチノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	46	20	0	0	0	0	40	0	0	0	0	144
ヤマボウシ	0	6	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	0	0	6	4	12	0	0	0	0	0	47
ミズキ	11	0	1	0	1	0	0	3	3	1	0	28	53	0	15	0	13	0	2	0	0	2	133
ウツギ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
ナリウツギ	2	0	37	13	3	1	0	0	1	0	0	0	131	0	0	0	16	0	1	0	1	0	206
ツルアジサイ	21	0	0	0	0	2	0	0	0	0													

表 II-2-4. (続き)



種名	苦 小 牧 成 森 林	愛 知 赤 津	足 寄 拓 北	足 寄 美 盛	足 寄 花 輪	芦 生 棚 上 谷	綾	秩 父 ブ ナ ・ イ ヌ ブ ナ 林	臥 龍 山	市 ノ 又	上 賀 茂	カ ヌ マ 沢 深 畔 林	カ ヤ の 平	お た の 申 す 平	高 原 山	田 野 二 次 林	西 丹 沢	大 雪 山	大 流 沢	木 曽 赤 沢	雨 窪	和 歌 山	合 計
アセビ	0	57	0	0	0	38	0	125	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	560
ミツバウツジ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	17
ヤマウツジ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	12
アカヤシオ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
シロヤシオ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	182
トウゴクミツバウツジ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
オンツツジ	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
シヤンヤンボ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	8
タイミンチバチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
ザカキ	0	333	0	0	0	0	278	0	0	428	10	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	46	1127
ヒサカキ	0	190	0	0	0	1	87	0	0	117	5	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	85	592
モッコク	0	0	0	0	0	0	7	0	0	17	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	26
オオバサガラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
エゴノキ	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	2	0	0	0	0	0	20
ハクウンボク	50	0	0	0	0	5	0	8	6	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	78
サワフタギ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16
タンナサワフタギ	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	37
ミズバレイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
クロキ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
ハイノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
クロバシ	0	0	0	0	0	0	0	0	163	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	176
カンザブロウノキ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	21
ヤブツバキ	0	68	0	0	0	0	113	0	0	126	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	486
ユキツバキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
サザンカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
ヒメシガラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	71
ナツツバキ	0	0	0	0	0	0	0	23	42	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	80
タニワタリノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
ミサオノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ムラサキシキブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
クサギ	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
ハマクサギ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
クアオダモ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
アオダモ	184	0	30	0	2	6	0	0	22	0	0	3	0	0	65	0	71	0	1	2	0	1	387
ヤチダモ	6	0	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
シロジ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
マルバアオダモ	0	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
ネズミモチ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	9
イボタノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ミヤマモミタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	79
コシアブラ	14	0	0	0	0	19	0	3	6	0	2	1	24	0	1	0	1	0	0	4	5	2	82
タラノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
カクレミノ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
タカハツメ	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
ハリギリ	5	0	16	25	12	0	0	3	1	0	0	2	0	0	2	1	2	0	2	1	67	0	139
シイモチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	26
ナナミノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
イヌツグ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
フウリンウメモドキ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ツグモチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	7
モミノキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	17
アオハダ	0	64	0	0	0	43	0	8	0	3	4	0	0	0	20	0	9	0	7	18	0	6	182
タマシズキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ソコヨ	0	60	0	0	0	18	0	0	0	1	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	156
クロガネモチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
クローンヨ	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
ニワトコ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
オオカメノキ	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
ヤブデマリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	10
オオミヤマガマズミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ニシキウツギ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ツクバネウツギ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6

* 種名は、佐竹ほか(1999)に拠り、同種異名は標準和名に統一した(同種異名は括弧内に示す)。

* 「イタヤカエデ」は亜種レベル(オニイタヤ、ウラゲエンコウカエデ、エゾイタヤ、エンコウカエデ、アカイタヤ、イトマキイタヤ)で区別していないイタヤカエデ類を指す。

3) 森林の炭素蓄積量とその変化

全調査区の樹木の地上部現存量を図Ⅱ-2-1 に、コアサイト調査区の地上部現存量の増減の経年変化を図Ⅱ-2-2 に示す。2013 年度は和歌山サイト、愛知赤津サイトなどにおいて地上部現存量の減少がみられた。この原因として、和歌山では台風による影響、愛知赤津では2010 年度に発生したカシノナガキクイムシの影響が考えられる。




図Ⅱ-2-2. 2004～2013 年度のコアサイトにおける地上部現存量の増減量の推移

t 年の現存量から $t-1$ 年の現存量を引いた値が t 年の増減量である(ただし春先に調査を実施しているサイト(雨龍、小川)では、 $t-1$ 年の変化量としている)。0 より大きい場合は、樹木の地上部に蓄積している炭素量(現存量)が増えたことを示し、0 より小さい場合は現存量が減少したことを示す。

2回以上調査を実施した調査区の調査開始時からの炭素蓄積の変化量を図Ⅱ-2-3に示す。一部の調査区を除き、多くの調査区で炭素蓄積量は増加していた。また、前年度までと同様、増加量は温かい場所の森林ほど多い傾向があったが、年平均気温が15℃を超えると増加量が少なくなる傾向があった。

今後も調査を継続し、炭素蓄積の長期的な変動及び地理的な傾向を明らかにしていく必要がある。



図Ⅱ-2-3. 調査開始時からの地上部現存量の増減量と年平均気温の関係
増減量は5年あたりに換算した値。常緑針葉樹林 ■、針広混交林 △、落葉広葉樹林 ○、常緑広葉樹林 ●、×人工林。

4) 森林動態

2013年度の各調査区の全幹における新規加入率は0.2～1.9%・年⁻¹ (図Ⅱ-2-4 上段)、死亡率は0.5～4.3%・年⁻¹ (図Ⅱ-2-4 中段)、であり、回転率は0.3～2.5%・年⁻¹ (図Ⅱ-2-4 下段)、であり、多くの調査区で例年並みの数値であった。一方、田野や和歌山では死亡率が例年より高い値であった。田野では乾燥の影響、和歌山では台風の影響によって、死亡率が増加したものと考えられる。




図 II-2-4. 2004～2013 年度の新規加入率、死亡率、回転率の変化

$t-1$ 年の調査から t 年の調査の間に、新規に調査対象となった幹の割合を t 年の新規加入率とし、またこの期間に死亡した幹の割合を t 年の死亡率として示している。ただし春先に調査を実施しているサイト(雨龍、小川)では、 $t-1$ 年の春の調査から t 年の春の調査までの新規加入率及び死亡率は、 t 年よりも $t-1$ 年の影響を強く受けているので $t-1$ 年の値として表示している。雨龍の 2005 年、小佐渡豊岡の 2006 年、大佐渡の 2007 年、足寄花輪の 2012 年の値は過大・過少評価の可能性があるため、表示していない。




図 II-2-4. (続き)。

引用文献

- Takyu, M., Kubota, Y., Aiba, S., Seino, T. and Nishimura, T. 2005. Pattern of changes in species diversity, structure and dynamics of forest ecosystems along latitudinal gradients in East Asia. *Ecological Research*, 20: 287-296.
- 佐竹 義輔・亙理 俊次・原 寛・富成 忠夫, 1999. 日本の野生植物 木本 (1) ~ (2). 平凡社.

3. 落葉落枝・落下種子調査

(1) 調査方法

コアサイト及び一部の準コアサイトにおいて、落葉落枝・落下種子調査（リター・シードトラップ調査）を実施した。

調査区内にリター・シードラップを 25 個設置した。設置期間は、積雪量の少ない南方のサイトでは通年、積雪量の多いサイトでは晩秋もしくは初冬にリタートラップを撤去し、翌年の春先に設置した。

およそ 1 か月おきに、トラップに落下した葉、枝、繁殖器官など（リターフォール）を回収し、その乾燥重量を計測した。繁殖器官のうち種子は、任意の調査として樹種ごとに仕分け、種子数・健全種子数と種子重量・健全種子重量を計測した。

(2) 平成 25 (2013) 年度調査結果

2013 年度は 21 サイト 22 調査区で調査を行った。9 サイトで 12 か月間の落葉落枝・落下種子を回収した（表 II-3-1）。積雪の多い 12 サイト 13 調査区では原則として春先から晩秋までの落葉落枝・落下種子を回収し、うち 6 サイト 7 調査区では冬季の間トラップを林床に置き続けて冬季の落葉落枝・落下種子も回収した。回収した落葉落枝・落下種子は計量・計数した。

表 II-3-1. 2013 年度の調査期間 点線は冬季に林床にトラップを置き続けたことを示す。

サイト名	調査区名	調査 間隔	2013年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
雨龍	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
足寄	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
足寄	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
苫小牧	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
秋父	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
大山沢	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
大佐渡	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
小佐渡	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
カヤの平	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
おたの申す平	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
愛知赤津	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
上賀茂	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
戸生	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
和歌山	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
田野	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
与那	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
小川	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
カヌマ沢	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
市ノ又	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
綾	コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
青葉山	準コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
奄美	準コア	毎年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(3) 集計・解析

1) 集計・解析方法


集計・解析対象は、これまでに調査を行った調査区すべてについて、2014年2月28日まで
にサイトから提出されたデータとした。

各月の 1 日当たりのリターフォール量及び落葉量を求めた。これらの値をもとに 4 月か

ら翌年3月末までの年間リターフォール量及び年間落葉量を求めた。また、各月の1日当たりの落下種子数（果実を含む）を求め、4月から翌年3月末までに回収された種子数を年間落下種子数とした。

2) 落葉落枝量

各調査区のリターフォール量の季節変化及び経年変化を図II-3-1に示す。基本的に落葉広葉樹林と常緑針葉樹林では秋に落葉量が多かった。常緑広葉樹林では春と秋に2回、落葉量・リターフォール量の多い時期があった。



図II-3-1. 各調査区の2004～2012年（一部2013年を含む）の各月の1日当たりのリターフォール量及び落葉量の平均の変化（絶乾重）
 実線は各設置期間のリターフォール量、白色の部分落葉量、灰色の部分落葉以外のリターフォール量を示す。調査区名の後の括弧内は森林タイプを示す。DB：落葉広葉樹林、EB：常緑広葉樹林、BC：針広混交林、EC：常緑針葉樹林。
 図は年平均気温の低い順にサイトを並べた。秩父のウダイカンバ林における落葉落枝・落下種子調査は2009年度までで終了した。




図 II-3-1. (続き)





図 II-3-1. (続き)


年間落葉量および年間リターフォール量は、与那では2010年・2011年は台風の影響などで多い傾向だったが、2012年は例年並みの値であった（図Ⅱ-3-2）。



3) 落下種子量

複数のサイトで種子が多数回収された12種の落下種子乾重量の年次変動を図Ⅱ-3-3に示す。2011年はアカシデの豊作だったサイトが多かったが、2012年は凶作に転じた。また、サカキも同様に、2011年の豊作から2012年は凶作に転じた。

調査開始年から2012年までに、ブナ、ミズナラ、シイ類などのブナ科を始めとして、アカシデやイヌシデなどのクマシデ属、サカキ、ヒサカキ、イタヤカエデにおいて、その種子生産量の豊凶に調査区間での同調性が確認された。このような種子生産の豊凶と同調性は種子を利用する動物の活動にも影響するため、種子生産の豊凶の機構に気象要因などがどのように関係するのか今後解明する必要がある。



図Ⅱ-3-3. 主要樹種の2004～2012年の各年の落下種子重量
落下種子重量は調査を行った全ての年の平均に対する相対値として示した。スダジイとツブラジイは、両者を区別できないものを含むため、シイ類としてまとめた。

4. 地表徘徊性甲虫調査

(1) 調査方法

林床を徘徊し、飛翔能力を持たない又は乏しい甲虫類（昆虫綱甲虫目（鞘翅目））の生息状況を調査するために、ピットフォールトラップ法を用いた。ピットフォールトラップ法とは、林床に落とし穴状のトラップを設置し、そこに落ちた動物を採取する方法である。各サイトで定めた調査区内の5か所のサブプロットに、落とし穴状のトラップとして開口部直径90 mm、深さ120 mmの容器を各4個（1調査区当たり合計20個）設置した。

季節ごとの地表徘徊性甲虫類の群集構造を把握するため、5月中旬から11月中旬までの期間中に、およそ1か月～2か月の間隔で年4回の調査を実施した。毎回落とし穴状のトラップ容器の蓋を開放し、72時間後に、トラップ内に落下していた甲虫類を回収した。このとき、サブプロットごとに全4トラップ分の甲虫類をひとまとめにして回収した。調査は雨天をなるべく避け、トラップ開放期間中の天候、最高・最低気温、降水量、及び、サブプロットごとの調査実施時の林床の草本層の被度を記録した。

採取した甲虫類の全個体について、分類群の同定及び乾燥重量（バイオマス）の測定を行った。地表徘徊性甲虫類の主要分類群であるオサムシ科、シデムシ科、センチコガネ科と、ハネカクシ亜科の地表性大型種の成虫については、形態によって種まで同定した（以下、これらの分類群を総称して「地表徘徊性甲虫類」と呼ぶ）。その他の科の成虫については、科まで（可能な場合は種まで）同定を行った。

甲虫類の生息環境を評価するために、上記と同じ5か所のサブプロットにおいて、堆積落葉層の量と化学組成、表層土壌の化学組成、林床におけるセルロースの分解速度を測定した。6～8月に林床の堆積落葉層を25cm四方の範囲から採取し、その直下の深さ0～5 cmの土壌100mlを、採土円筒を用いて採取した。落葉層の乾燥重量を計測した後、落葉層及び土壌の全炭素及び全窒素含有率を、全窒素全炭素測定装置（SUMIGRAPH NC-900、住化分析センター）により測定した。2012年9～11月に、各サブプロットにおいて、5 cm四方のセルロース紙（ベンチコート2300-916、ワットマン）2枚を、堆積落葉層と土壌の間に水平に設置した。さらに、別の2枚を土壌中（深さ0～5 cm）に垂直に設置した。2013年の5～6月にこれらを回収し、各セルロース紙について、設置前と回収後の重量を測定し、設置期間中の重量減少率（ $=1-W_t/W_0$ 。ただし、 W_0 は設置前の重量、 W_t は設置後 t 日目の重量を表す）を算出した。

(2) 平成25（2013）年度調査結果

22 サイト（コアサイト 19、準コアサイト 3）の 29 調査区で、ピットフォールトラップ法による調査、堆積落葉層の採取及びセルロース分解試験を実施した（表Ⅱ-4-1）。さらに、得られた試料の同定・測定を行った。大山沢では、台風の影響で9月にピットフォールト

ラップ調査が実施できなかったため、11月に調査を行った。

表 II-4-1. 2013 年度の各調査区におけるピットフォールトラップ調査及び関連する調査の実施日

調査区名	プロットID	サイト プロット コード	ピットフォールトラップ調査				堆積落葉層 ・土壌採取	セルロース 紙回収**	
			1回目	2回目	3回目	4回目			
北海道	雨龍	UR-BC1	201201	6/7	6/28	9/6	10/4	6/28	6/4
	足寄拓北	AS-DB1	201301	6/3	7/4	9/9	10/4	7/1	5/31
	苫小牧成熱林	TM-DB1	200101	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧二次林404林班	TM-DB2	200102	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧二次林308林班	TM-DB3	200103	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧二次林208林班	TM-DB4	200104	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧アカエゾマツ人工林	TM-AT1	200105	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧カラマツ人工林	TM-AT2	200106	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	苫小牧トドマツ人工林	TM-AT3	200107	6/24	7/22	9/12	10/21	7/19	6/21
	佐渡	大佐渡	OS-EC1	200301	6/3	7/12	9/27	10/24	7/12
小佐渡豊岡		KS-DB1	200401	6/3	7/11	9/27	10/27	7/11	6/3
小佐渡キセン城		KS-DB2	200402	6/4	7/11	9/27	10/27	7/11	6/4
本州	カヌマ沢溪畔林	KM-DB1	200201	6/1	7/3	8/28	10/2	8/8	5/29
	青葉山	AO-BC1	202601	5/24	8/12	9/30	11/1	7/19	5/21
	小川	OG-DB1	200501	5/27	7/19	9/22	10/24	8/9	5/24
	秩父ブナ・イヌブナ林	CG-DB1	200601	5/31	6/28	9/13	11/1	6/25	5/28
	大山沢	OY-DB1	203801	5/26	6/21	10/24	11/19	6/21	5/26
	カヤの平	KY-DB1	201401	6/7	7/9	8/10	9/6	8/10	6/7
	おたの申す平	OT-EC1	201501	6/21	7/19	8/13	9/9	8/13	6/18
	愛知赤津	AI-BC1	200801	5/24	6/17	9/13	11/1	6/14	5/21
	芦生枅上谷	AU-EC1	203101	5/27	6/27	9/12	10/10	8/22	5/24
	上蘆茂	KG-EC1	203201	5/27	7/1	9/20	11/11	7/19	5/31
四国	和歌山	WK-EC1	201601	5/23	6/24	9/20	10/21	7/11	5/23
	市ノ又	IC-BC1	201701	5/19	6/13	10/7	11/15	6/10	5/19
九州	佐田山*	SD-EB1	203601	5/24	6/21	10/4	11/8	6/18	5/21
	綾	AY-EB1	200901	5/20	6/19	10/2	11/8	6/19	5/17
	田野二次林	TN-EB1	201001	5/16	6/17	10/24	11/29	6/14	5/13
南西 諸島	奄美	AM-EB1	202301	5/18	7/1	10/4	11/11	6/25	5/15
	与那	YN-EB1	201101	4/25	6/28	10/4	11/8	6/28	4/22

* 佐田山は自主的調査による

** 2012年9～11月に設置

(3) 集計・解析

1) 集計・解析方法

サブプロットごとに、採取した甲虫類の各分類群の個体数、バイオマスを集計した。さらに、これらの値の調査区ごとの合計値、平均値、標準誤差を求めた。また、調査区ごとに、地表徘徊性甲虫類及びオサムシ科について、種数と多様度指数 (Shannon-Wiener の多様度指数 (H')、Simpson の多様度指数 ($1/D$ 、 $1-D$)、Fisher の多様度指数 (α)、Pielou の均等度指数 (J')) を求めた。サブプロット・設置層位ごとに、セルロース紙の分解速度定数 (k) を求めた (指数関数的分解モデル ($M_t = e^{-kt}$) を仮定。ただし、 t は設置からの日数、 M_t は t 日目の重量残存率 ($= (W_t - R) / (W_0 - R)$)、 R はセルロース紙の片面を覆っている樹脂フィルム の重量 (W_0 の 22.65 ± 0.16 % (平均 $\pm$ 標準誤差)) を表す)。堆積落葉層の重量、堆積落葉層及び土壌の炭素含有率、窒素含有率、炭素窒素比、及びセルロース紙の分解速度定数については、調査区ごとの平均値と標準誤差を求めた。

上述の各測定値 (セルロース紙の分解速度定数を除く) について、調査区ごとの経年変化の傾向を、一般化線形混合モデル (GLMM) と尤度比検定を用いて解析した。まず、2013 年度の値が過去の年度の値と比べて有意に異なるかどうかを検証するために、年度・サブプロットごとの測定値を応答変数、2013 年度か他の年度かを表すダミー変数を説明変数、サブプロット名をランダム変数とする GLMM への当てはめを行い、尤度比検定によって説明変数の有意性を検定した。次に、各測定値が調査開始から直線的な上昇・下降傾向にあるかどうかを検証するために、上記の説明変数を年度 (連続変数) に変えて、同様の解析を行った。

冬季のセルロース分解試験は、2011 年度に改定されたマニュアルで新たに追加された項目であり、比較可能な過去のデータがないため、上述の解析は行えない。そこで、各調査区における分解速度定数 (k) と設置期間中の気象条件との相関関係を解析した。

甲虫類のバイオマスは対数変換値を、堆積落葉層の測定値は採取時期の影響を補正した値を用いた。堆積落葉層の測定値の補正は以下のように行った。まず、同一調査地の全年度・全サブプロットの 6 月 (または 5 月) ~ 9 月 (または 10 月) の実測値 (乾重、窒素濃度の場合は対数変換値) を採取日 (1 月 1 日からの日数) で直線回帰した。この回帰線上の値を、この期間の平年値とみなし、残差 (平年値からの偏差) を実測値の代わりに解析に用いた。甲虫類の個体数はポアソン分布に、その他の応答変数は正規分布に従うと仮定した。種数、多様度指数は、サブプロットごとではなく調査区ごとに求めているため、これらを応答変数として解析する際は、上述のモデルからランダム変数 (サブプロット番号) を除いたモデルを用いた。

大山沢では、台風の影響でピットフォールトラップ調査を例年と同じ時期に実施できなかったため、地表徘徊性甲虫類の測定値については、2013 年度と過去の年度の比較は行わず、年変化傾向の解析には 2013 年度の値を含めなかった。

なお、集計・解析対象としたデータは 2014 年 2 月 28 日までにサイトから提出されたデ

ータとした。

2) 地表徘徊性甲虫

2013 年度の甲虫類の総捕獲個体数は 9,394 個体、成虫は 8,858 個体であった(表Ⅱ-4-2)。オサムシ科成虫の個体数は 5,389 個体で、成虫全体の 61%を占めていた。オサムシ科に次いで多い順にシデムシ科が 1,496 個体、ハネカクシ科が 879 個体、センチコガネ科が 751 個体、コガネムシ科が 163 個体であり、それぞれ成虫全体の 17%、10%、8%、2%を占めていた。上記の 5 科以外に 100 個体以上が捕獲された科はなかった。すべての調査区を通じた地表徘徊性甲虫類の種数は 97 種であり、その内でオサムシ科の種数は 81 種であった(表Ⅱ-4-3)。

地表徘徊性甲虫類全体及び主要な分類群の捕獲個体数、バイオマスの年変化の傾向を、表Ⅱ-4-4、図Ⅱ-4-1、表Ⅱ-4-5、図Ⅱ-4-2 に示す。総個体数、総バイオマスが過去の年度に比べて高い水準を示したのは、それぞれ 13、10 調査区であり、総個体数、総バイオマスが全年度を通じて増加傾向にあるのは、それぞれ 14、7 調査区であった。一方、総個体数、総バイオマスが過去の年度に比べて低い水準を示したのは、それぞれ 7、1 調査区であり、総個体数、総バイオマスが全年度を通じて減少傾向にあるのは、それぞれ 9、3 調査区であった。

林齢が 100 年未満と推定される二次林・人工林の調査区では、総個体数・オサムシ科・シデムシ科及びオサムシ科の主要な 3 属(オサムシ属、*Pterostichus* 属、*Synuchus* 属)の個体数が増加傾向にある場合が多く、特に *Synuchus* 属はすべての調査区で増加傾向を示した。一方、林齢 100 年以上と推定される成熟林・高齢二次林では、調査区によって増減傾向が様々であったが、冷涼な調査区(北海道及び本州の標高 1000m 以上の 7 サイト 7 調査区; 1971~2000 年の平均気温が 8℃未満)の多くでは個体数の減少傾向が強く、総個体数・オサムシ科・オサムシ属・*Pterostichus* 属の個体数が減少傾向を示した。特に本州の高標高地の 4 調査区(秩父ブナ・イヌブナ林、大山沢、カヤの平、おたの申す平)では、個体数の減少傾向が明瞭であった。

2012 年度は、オサムシ属が例年より少ないというサイトが多かった一方、*Synuchus* 属が多いというサイトが多かった。ところが 2013 年度は、比較的温暖な地域を中心に、オサムシ属が例年より多く、*Synuchus* 属が少ない、というサイトが多かった。

バイオマスの変動も、個体数の変動と同様であったが、増減傾向はより不明瞭であった。

種多様性の各指数は例年と同様の値を示すサイトが多く、有意な増減傾向を示すサイトは少なかった(表Ⅱ-4-6)。

表 II-4-2. 2013 年度に各調査区で捕獲された甲虫類の科ごとの個体数(4季節・5サブプロットの合計)

科名	北海道										本州										四国		九州		南西諸島	合計						
	雨龍	足寄・苫北	宮小牧成帯林	宮小牧二次林404林班	宮小牧二次林308林班	宮小牧二次林208林班	宮小牧アカエゾツイン工林	宮小牧カエゾツイン工林	宮小牧トマツイン工林	大佐渡	小佐渡豊田	小佐渡キセン城	カヌエ沢渓畔林	青葉山	小川	秩父ツナ・イヌナナ林	大山沢	カヤの平	おたの申す平	愛知赤津	戸生掛上谷	上賀茂	和歌山	市ノ又			佐田山	幾	田野二次林	奄美	与那	
成虫	Carabidae	99	239	636	425	865	553	344	726	230	136	105	115	149	197	115	35	52	37	13	58	23	14	19	4	12	155	32	1	1	5389	
	Hydrophilidae					4			2	1				1				1										3			13	
	Histeridae					38	1		2			2															1				44	
	Ptilidae														2																2	
	Agrytidae																														1	
	Leiodidae												1															2			10	
	Scydmaenidae													2																	27	
	Silphidae					3		9							5													9			1496	
	Staphylinidae	9	57	94	108	195	48	10	141	8	10	10	2	10	38	4	1	1	40								15	58	14		879	
	Lucanidae					1	1					1										1					1				6	
	Trogidae									1																					1	
	Geotrupidae	13	138	78	81	160	80	24	49	20	35	7				61	2					1						2			751	
	Scarabaeidae																										1	5	18	2	1	163
	Elaterridae	1	2			1				1												2					1				8	
	Lampyridae													1																	1	
	Nitidulidae													1		1					5										7	
	Cryptopogonidae															3															3	
	Discolomidae															1															1	
	Goryphidae	1																											1	1	3	1
	Melandryidae														1																1	
	Tenebrionidae					2	1					5	2		1													1				12
	Mordellidae																															1
	Anthicidae												1															1				1
	Cerambycidae													1																		1
	Chrysomelidae					1	1																									2
	Dryophthoridae					1														1												2
	Curculionidae	1						1	1			2	1		2	3	1	1				4	1							5	24	
Scolytidae														1														4			5	
Unknown						3											1														4	
幼虫																																
Carabidae		1							1																						3	
Silphidae			28	55	9	10	3	22				5	1	160				1	6												300	
Unknown	1	4	14	10	83	8	6	3		2	2	8	5	9	2			6	2	1		2	2	3	1	1		53	3	2	233	
合計	124	451	1051	790	1706	810	401	1154	273	229	549	141	176	656	123	37	68	45	60	58	27	26	28	5	16	178	182	5	25		9394	

表 II-4-3. 2013 年度に各調査区で捕獲された地表徘徊性甲虫類の種ごとの個体数(4季節・5サブプロットの合計)

属名	種名	北海道										佐渡		本州										四国		九州		南西諸島		合計			
		雨龍	足寄拓北	苫小牧成熟林	苫小牧二次林404林班	苫小牧二次林308林班	苫小牧二次林208林班	苫小牧アカエゾマツ人工林	苫小牧カラマツ人工林	苫小牧トドマツ人工林	大佐渡	小佐渡豊岡	小佐渡キセン城	カヌマ沢溪畔林	青葉山	小川	秩父ブナ・イヌブナ林	大山沢	カヤの平	おたの申す平	愛知赤津	芦生峠上谷	上賀茂	和歌山	市ノ又	佐田山	綾	田野二次林	奄美		与那		
オサムシ科 Carabidae																																	
Leistus	キノカワゴミムシ								1																						1		
	フトキノカワゴミムシ																												1		1		
Cicindela	ニワハシミョウ																											1			1		
Cylindela	マガタマハシミョウ									22	7	10	1	11																	51		
Cychrus	セダカオサムシ		2	22	2		2	1	2																						31		
Calosoma	アオカタビロオサムシ				1	2					1	1																			5		
	クロカタビロオサムシ				1	1																									2		
Carabus	アオオサムシ										1				3																4		
	アカガネオサムシ			7	25	11	2		43																						88		
	イワウキオサムシ																							10							10		
	オオオサムシ																				1		8								9		
	オオクロナガオサムシ																							4							4		
	オオルリオサムシ	13			2				1																						16		
	キタクロナガオサムシ		7	4	1	8	6			3				24	4	11		1		2											71		
	クロオサムシ			153	17	180	7	11	41	2	31	16	41	56	143	75	18	11													802		
	クロナガオサムシ															2	1		9			4									16		
	コブスジアカガネオサムシ	6	8	1	5	17	6		17																							60	
	シコクオサムシ																										1					1	
	ヒメオサムシ																										2	9	53	19		83	
	ヒメクロオサムシ	27	98	95	8	74	40	11	20	68																						441	
	ホソアカガネオサムシ										50				5		2															57	
	ホソヒメクロオサムシ													1				9		2												12	
	マイマイカブリ	28	1	8	1	1	3	1	3	2			1	4		1																54	
	マヤサンオサムシ																						4	1								5	
ミカワオサムシ																					34										34		
ヤマトオサムシ																					20										20		
アキオサムシ																						5									5		
オサムシ属の一種																	1														1		
Brachinus	オオホソクビゴミムシ																									2	47	4			53		
Trechus	オンタケチビゴミムシ																	1													1		
Chlaenius	スジアオゴミムシ										1	8																17			1	27	
	アトボシアオゴミムシ													1																	1		
Planetes	フタホシスジバネゴミムシ																														1		
Nipponoharpalus	ハコダテゴモクムシ					1								4																	5		
Trichotichnus	シガツヤゴモクムシ																			1											1		
	オクタマツヤゴモクムシ																														2		
Badister	チビカタキバゴミムシ		1																													1	
Agonum	チビモリヒラタゴミムシ															2																2	
Negreum	ベントンモリヒラタゴミムシ																		4													4	
Platynus	ヤマトクロヒラタゴミムシ																			5												5	
Rupa	ケブカヒラタゴミムシ																								1							1	
Xestagonum	ツヤモリヒラタゴミムシ																			1												1	
Myas	アカガネオオゴミムシ										4	10	2			3							1									20	
	キンイロオオゴミムシ																															7	
Poecilus	オオキンナガゴミムシ			4				2	1									1	2													7	
Pterostichus	アトマルナガゴミムシ	3	4	2	6	9	7		39																							70	
	エゾマルガタナガゴミムシ		43	1	1	7	9	6	14																							81	
	オクタマナガゴミムシ																		2													2	
	カタシナナガゴミムシ																															2	
	クロホソナガゴミムシ																															19	
	コガシラナガゴミムシ				2		8	10	8		2		1																			31	
	ツンベルグナガゴミムシ	22	68	199	231	271	280	236	375	149																						1831	
	ニセクロナガゴミムシ																															3	
	ベーツナガゴミムシ														11		3			1												15	
	マルガタナガゴミムシ		2	23	17	161	45	18	121																							392	
	ミトウナガゴミムシ																			1												1	
	ミヤマナガゴミムシ																															1	
	ムナビロヒメナガゴミムシ																										2		20	1		23	
	ヤノナガゴミムシ																															3	
	ヨリトモナガゴミムシ										23	3	5	9	7	4	2	1															62
	トケジナガゴミムシ																															4	
	タカオヒメナガゴミムシ														3	3																6	
ニッコウヒメナガゴミムシ														7																	7		
ミヤマクロナガゴミムシ																															2		
Rhagadus 亜属の一種											6											2	2		4						17		
	Pterostichus 属の一種					2																										2	
Stomis	キバナナガゴミムシ										1							1														2	
Trigonotoma	ルイスオオゴミムシ											1																12				13	
Pristosia	ホソヒラタゴミムシ															1																1	

表 II-4-3. (続き)

属名	種名	北海道										佐渡			本州										四国	九州	南西諸島	合 計				
		雨龍	足寄拓北	苫小牧成熟林	苫小牧二次林404林班	苫小牧二次林308林班	苫小牧二次林208林班	苫小牧アカエゾマツ人工林	苫小牧カラマツ人工林	苫小牧トドマツ人工林	大佐渡	小佐渡豊岡	小佐渡キセン城	カヌマ沢溪畔林	青葉山	小川	秩父ブナ・イヌブナ林	大山沢	カヤの平	おたの申す平	愛知赤津	芦生樹上谷	上賀茂	和歌山	市ノ又	佐田山	綾		田野二次林	奄美	与那	
Synuchus	オオクロツヤヒラタゴミシ		4	3		5	7					6	6		1						1						1				34	
	クロツヤヒラタゴミシ			6	9	25	102	31	23	4	1	41	30	3	4		7						4								290	
	コクロツヤヒラタゴミシ			107	93	86	27	16	12	2	1	1	5	13	5	3		8													379	
	シラハタクロツヤヒラタゴミシ	1				1							1	11													1	1			16	
	タケウチツヤヒラタゴミシ													1																	1	
	タンザワツヤヒラタゴミシ																1														1	
	ヒメクロツヤヒラタゴミシ				2		1																								3	
	ヒメツヤヒラタゴミシ														1														2		3	
	マルガタツヤヒラタゴミシ										1	11	4		6																22	
	ヤスマツツヤヒラタゴミシ																														2	
	ニッポンツヤヒラタゴミシ																1															1
	Synuchus 属の一種																	1														1
Amara	マルガタゴミシ属の一種															3															3	
Perigona	クロズホナシゴミシ																												3		3	
Eustra	エグリゴミシ																													1		
不明	チビゴミシ亜科の一種																			1												
	オサムシ科の一種			1	1	3	1	1	5									1		1											14	
シデムシ科 Silphidae																																
Nicrophorus	ヨツボシモンシデムシ					1	1						2	1	1																6	
	Nicrophorus 属の一種																	1													1	
Silpha	ヒラタシデムシ		9	20	12	86	42	13	180	2																						364
	ホソヒラタシデムシ										38							1														39
Eusilpha	オオヒラタシデムシ			173	91	245	65		14	9	331			158																		1086
ハネカクシ科 Staphylinidae (大型地表性種)																																
Anisolinus	ツヤケシブチヒゲハネカクシ									1																						1
Agelosus	オオアカバハネカクシ									1	8			2	1	1							2									15
	オオクロバネハネカクシ																											2				2
Ontholestes	サビハネカクシ										1			2																		
Platydacus	アカバハネカクシ			37	8	27	4	1	3			4			5														3			92
	カラカネハネカクシ			16	13	34	9		14	1					16	2																105
	Platydacus 属の一種													1		1																2
Protocypus	Protocypus 属の一種																								2							2
Staphylinus	ダイミョウハネカクシ					5	67	4	1	74																						151
Algon	ムネビロハネカクシ			15	23	13	6	2	5																							64
センチコガネ科 Geotrupidae																																
Phelotrupes	オオセンチコガネ			6																			1									7
	センチコガネ	13	132	78	81	160	80	24	49	20	35	7			61	2													2			744
合 計		112	386	975	659	1498	763	385	1066	263	217	448	117	153	441	121	35	54	37	13	58	23	15	23	4	12	160	34	0	1		8068

表 II-4-4. 各調査区における地表徘徊性甲虫類の捕獲個体数の年変化の傾向

調査区名	2013 vs 2005~2012*														2005~2013の変化傾向**																							
	オサムシ科	オサムシ属	オオオサムシ亜属	クロオサムシ	クロナガオサムシ亜属	キタクロナガオサムシ	クロナガオサムシ	ヨリトモナガコムシ	Rhagadus 亜属	Synuchus 属	クロツヤヒラタコムシ	コクロツヤヒラタコムシ	オオクロツヤヒラタコムシ	シテムシ科	ハナカクシ科(大型地表性種)	セシチコガネ科	Phelotrupes 属	セテムシ科	オサムシ科	オサムシ属	オオオサムシ亜属	クロオサムシ	クロナガオサムシ亜属	キタクロナガオサムシ	クロナガオサムシ	ヨリトモナガコムシ	Rhagadus 亜属	Synuchus 属	クロツヤヒラタコムシ	コクロツヤヒラタコムシ	オオクロツヤヒラタコムシ	シテムシ科	ハナカクシ科(大型地表性種)	セシチコガネ科	Phelotrupes 属	セテムシ科		
北海道	雨龍	ns	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	足寄拓北	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	苫小牧成熱林	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	苫小牧二次林404林班	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	苫小牧二次林308林班	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	苫小牧二次林208林班	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
佐渡	苫小牧アカエゾマツ人工林	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	苫小牧トラマツ人工林	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	大佐渡	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	▲	ns	ns	ns	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	▲	▲	▲	
	小佐渡豊岡	ns	△	ns	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	▲	ns	ns	ns	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
本州	小佐渡キセン城	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	△	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	ns	-	-	-	
	カヌマ沢溪畔林	ns	ns	▲	▲	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	-	-	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	-	-	-		
	青葉山	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	小川	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns		
	秩父ブナ・イヌブナ林	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns		
	大山沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四国	カヤの平	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	おたの串す平	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns		
	愛知赤津	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	芦生柁上谷	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	上賀茂	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns		
	和歌山	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns		
九州	市ノ又	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	佐田山	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
南西諸島	綾	▲	▲	▲	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
	田野二次林	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	
南西諸島	奄美	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	与那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

地表徘徊性甲虫類全体、及び20個体以上採取されているサイトが4サイト以上ある科・属・亜属・種の傾向を示す。

* 2013年度か否かを説明変数とする一般化線形混合モデルによる解析の結果。▲:2013年度の値>2005~2012年度の値、△:2013年度の値<2005~2012年度の値、ns:有意差なし($P>0.05$)。

** 年を説明変数とする一般化線形混合モデルによる解析の結果。▲:増加傾向($P<0.05$)、△:減少傾向($P<0.05$)、ns:傾向なし($P>0.05$)。

- 20個体未満。




図 II-4-1. 各調査区における地表徘徊性甲虫類の捕獲個体数の年変動(5サブプロットの平均±標準誤差)

表 II-4-5. 各調査区における地表徘徊性甲虫類の捕獲バイオマスの年変化の傾向

調査区名	2013 vs 2005~2012*															2005~2013の変化傾向**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	オサムシ科															センチコガネ科															シナムシ科																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	全種	オサムシ属	オオオサムシ属	クロオサムシ	クロナガオサムシ属	キタナガオサムシ属	クロナガオサムシ	Pterostichus属	Rhagadus亜属	Synuchus属	クロツヤヒラタミムシ	クロツヤヒラタミムシ	オオクロツヤヒラタミムシ	シナムシ科	ハネカクシ科(大型地表性種)	センチコガネ科	Phelotrupes属	センチコガネ	オサムシ科	オオオサムシ属	オオオサムシ属	クロオサムシ	クロナガオサムシ属	キタナガオサムシ属	クロナガオサムシ	Pterostichus属	ヨリトモナカミムシ	Rhagadus亜属	Synuchus属	クロツヤヒラタミムシ	クロツヤヒラタミムシ	オオクロツヤヒラタミムシ	シナムシ科	ハネカクシ科(大型地表性種)	センチコガネ科	Phelotrupes属	センチコガネ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
北海道	▲	ns	ns	ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	-	-	-	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

地表徘徊性甲虫類全体、及び20個体以上採取されているサイトが4サイト以上ある科・属・亜属・種の傾向を示す。

* 2013年度か否かを説明変数とする一般化線形混合モデルによる解析の結果。▲:2013年度の値>2005~2012年度の値($P<0.05$)、▽:2013年度の値<2005~2012年度の値($P<0.05$)、ns:有意差なし($P>0.05$)。

** 年を説明変数とする一般化線形混合モデルによる解析の結果。▲:増加傾向($P<0.05$)、▽:減少傾向($P<0.05$)、ns:傾向なし($P>0.05$)。

- 20個体未満。




図 II-4-2. 各調査区における地表徘徊性甲虫類の捕獲バイオマスの年変動(5サブプロットの平均±標準誤差)

表 II-4-6. 各調査区における地表徘徊性甲虫類の種多様性の、2013 年度の測定値及び年変化の傾向

調査区名	2013年度										2013 vs 2005~2012*										2005~2013の変化傾向**									
	地表徘徊性甲虫類					オサムシ科					地表徘徊性甲虫類					オサムシ科					地表徘徊性甲虫類					オサムシ科				
	総	エ	♀	♂	♀	総	エ	♀	♂	♀	総	エ	♀	♂	♀	総	エ	♀	♂	♀	総	エ	♀	♂	♀	総	エ	♀	♂	♀
	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数	個体数
北海道	雨龍	7	1.76	0.81	5.27	1.66	0.91	6	1.59	0.77	4.43	1.41	0.89	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	足寄拓北	15	1.77	0.77	4.41	3.11	0.65	12	1.53	0.72	3.52	2.66	0.62	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧成熟林	21	2.30	0.87	7.72	3.78	0.76	15	1.80	0.79	4.76	2.76	0.67	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧二次林404林班	26	2.17	0.82	5.47	5.41	0.67	18	1.53	0.65	2.83	3.81	0.53	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧二次林308林班	25	2.45	0.89	9.08	4.27	0.76	17	1.89	0.80	5.07	3.00	0.67	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧二次林208林班	23	2.20	0.82	5.47	4.47	0.70	16	1.67	0.69	3.26	3.08	0.60	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧アカエゾマツ人工林	16	1.55	0.60	2.53	3.37	0.56	11	1.23	0.51	2.04	2.17	0.51	ns	▽	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧カラマツ人工林	24	2.20	0.82	5.55	4.37	0.69	16	1.69	0.69	3.21	2.90	0.61	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧トマツ人工林	12	1.29	0.60	2.53	2.59	0.52	7	0.89	0.49	1.97	1.36	0.46	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	大佐渡	13	2.02	0.85	6.51	3.03	0.79	10	1.61	0.76	4.11	2.49	0.70	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	小佐渡豊岡	17	1.14	0.44	1.79	3.50	0.40	13	1.95	0.79	4.81	3.91	0.76	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	小佐渡キセン城	14	1.95	0.79	4.79	4.15	0.74	13	1.90	0.78	4.63	3.77	0.74	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
本州	カヌマ沢溪畔林	18	2.17	0.82	5.45	5.30	0.75	15	2.07	0.81	5.17	4.16	0.77	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	青葉山	20	1.77	0.74	3.91	4.31	0.59	13	1.21	0.46	1.87	3.13	0.47	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	小川	18	1.65	0.60	2.51	5.85	0.57	14	1.46	0.56	2.27	4.18	0.55	ns	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	秩父ブナ・イヌブナ林	8	1.51	0.68	3.12	3.24	0.72	8	1.51	0.68	3.12	3.24	0.72	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	大山沢	16	2.37	0.87	7.96	8.14	0.85	15	2.32	0.87	7.67	7.37	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カヤの平	6	1.31	0.65	2.89	2.03	0.73	6	1.31	0.65	2.89	2.03	0.73	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	おたの申す平	7	1.86	0.83	6.00	7.03	0.96	7	1.86	0.83	6.00	7.03	0.96	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	愛知赤津	5	0.94	0.54	2.15	1.31	0.58	5	0.94	0.54	2.15	1.31	0.58	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	芦生粉上谷	5	1.52	0.76	4.23	1.97	0.94	5	1.52	0.76	4.23	1.97	0.94	ns	ns	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	上賀茂	5	1.23	0.63	2.71	2.63	0.76	4	1.05	0.58	2.39	1.87	0.76	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	和歌山	6	1.53	0.73	3.75	2.64	0.85	4	1.15	0.63	2.71	1.55	0.83	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
四国	市ノ又	2	0.69	0.50	2.00	1.59	1.00	2	0.69	0.50	2.00	1.59	1.00	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	佐田山	3	0.72	0.40	1.67	1.28	0.66	3	0.72	0.40	1.67	1.28	0.66	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
九州	綾	12	1.73	0.77	4.36	3.00	0.70	10	1.62	0.76	4.10	2.39	0.70	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	田野二次林	9	1.54	0.66	2.90	4.00	0.70	8	1.40	0.62	2.60	3.42	0.67	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
南西諸島	奄美	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	与那	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 2013 年度か否かを説明変数とする線形モデルによる解析の結果。▲: 2013 年度の値 > 2005~2012 年度の値 ($P < 0.05$)、▽: 2013 年度の値 < 2005~2012 年度の値 ($P < 0.05$)、ns: 有意差なし ($P > 0.05$)。** 年を説明変数とする線形モデルによる解析の結果。▲: 増加傾向 ($P < 0.05$)、▽: 減少傾向 ($P < 0.05$)、ns: 傾向なし ($P > 0.05$)。

— 10 個体未満

3) 林床環境

林床植生被度の測定結果及び年変化の傾向を表Ⅱ-4-7に示す。全体の半数近い12調査区で、林床植生被度が減少傾向にあった。一方、増加傾向にあった調査区は5か所のみで、いずれも冷涼な調査区であった。

堆積落葉層、土壌の測定結果及び年変化の傾向を表Ⅱ-4-8、9に示す。2013年度の堆積量は、苫小牧二次林208林班、カヌマ沢溪畔林、和歌山で過年度より有意に大きく、市ノ又で有意に小さかったが、それ以外の調査区では、過年度の値と有意に異ならなかった。堆積落葉量が全年度を通じて増加傾向を示したのは7調査区、減少傾向を示したのは4調査区であった。減少傾向の4調査区の中の3調査区（小佐渡豊岡、市ノ又、綾）では、林床植生被度も減少傾向にあり、斜面上での林床植生の衰退が堆積落葉層の流出を招いた可能性もある。

セルロース分解試験の測定結果を表Ⅱ-4-10、図Ⅱ-4-3に示す。土壌層中での分解速度は、設置期間（11～5月）中の気温・降水量と正の相関を示した。一方、堆積落葉層中での分解速度は降水量と正の相関を示したものの、気温とは有意な相関を示さなかった。落葉層中では乾燥にさらされやすく、気温よりも湿度によって分解が律速されやすい可能性がある。土壌層においても、気温より降水量の方が、分解速度との相関が強かった。落葉層・土壌層いずれにおける分解速度も、最も高温多湿な調査区である与那で最大であった。さらに、分解速度は森林タイプによっても異なる傾向があり、同じ気温・降水量の条件下では、落葉広葉樹林で分解が速く、針葉樹林で遅い傾向が見られた。

表 II-4-7. 各調査区における林床植生被度の、2013 年度の測定値(5サブプロットの平均±標準誤差)及び年変化の傾向

調査区名	2013年度(平均±標準誤差)					2013 vs 2005~2012*		2005~2013の变化傾向**	
	1回目 (%)	2回目 (%)	3回目 (%)	4回目 (%)	年平均 (%)	年最大 (%)	年平均	年最大	年平均
北海道	雨龍	56±2	62±4	66±2	58±4	61±2	68±2	ns	▲
	足寄拓北	63±8	67±9	62±9	63±10	64±9	67±9	ns	▼
	苫小牧成熟林	29±1	29±1	30±0	30±0	30±1	30±0	ns	▼
	苫小牧二次林404林班	33±2	33±2	36±2	36±2	35±2	36±2	ns	▲
	苫小牧二次林308林班	27±1	29±2	32±1	32±1	30±1	32±1	ns	▼
	苫小牧二次林208林班	12±1	12±1	14±1	14±1	13±1	14±1	ns	▼
	苫小牧アカエゾマツ人工林	9±2	10±2	14±2	14±2	12±2	14±2	ns	▲
	苫小牧カラマツ人工林	24±2	25±2	24±1	24±1	24±1	25±2	ns	▲
	苫小牧トドマツ人工林	6±1	6±1	5±0	5±0	6±1	6±1	ns	ns
	カヌマ沢溪畔林	63±10	82±3	78±6	75±5	75±5	84±4	ns	ns
本州	青葉山	21±12	21±12	19±12	18±11	20±12	21±12	ns	▼
	小川	8±2	16±6	11±4	8±3	11±3	16±6	ns	ns
	秩父ブナ・イヌブナ林	3±3	3±3	3±3	0±0	2±2	3±3	ns	▼
	カヤの平	54±5	80±5	78±4	78±5	73±5	82±4	▲	▲
	おたの申す平	31±13	31±13	35±14	37±15	34±14	37±15	ns	ns
	愛知赤津	4±0	4±0	4±0	4±0	4±0	4±0	ns	ns
	芦生枡上谷	5±0	5±0	6±1	5±0	5±0	6±1	▼	▼
	上賀茂	33±11	38±11	28±11	33±12	33±11	39±11	ns	ns
	和歌山	9±2	14±2	12±3	10±2	11±2	14±2	ns	▼
	市ノ又	8±2	9±3	9±3	9±3	9±3	9±3	ns	▼
四国	佐田山	15±2	15±2	17±3	14±3	15±3	17±3	ns	▼
九州	綾	9±6	9±6	9±6	9±6	9±6	9±6	▼	▼
南西	奄美	14±3	17±2	17±3	12±2	15±3	18±3	▼	▼
諸島	与那	15±5	15±5	23±5	23±5	19±5	23±5	▲	ns

* 2013 年度か否かを説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲: 2013 年度の値>2005~2012 年度の値($P < 0.05$)、▼: 2013 年度の値<2005~2012 年度の値($P < 0.05$)、ns: 有意差なし($P > 0.05$)。

** 年を説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲: 増加傾向($P < 0.05$)、▼: 減少傾向($P < 0.05$)、ns: 傾向なし($P > 0.05$)。

表 II-4-8. 各調査区における堆積落葉層の乾燥重量、炭素(C)・窒素(N)含有率、炭素窒素比(C/N)の、2013 年度の測定値(5サブプロットの平均±標準誤差)及び年変化の傾向

	調査区名	2013年度(平均±標準誤差)				2013 vs 2005~2012*				2005~2013の変化傾向**			
		乾重	C含有率	N含有率	C/N	乾重	C含有率	N含有率	C/N	乾重	C含有率	N含有率	C/N
		(ton ha ⁻¹)	(%)	(%)									
北海道	雨龍	14.8±3.1	43.0±1.3	1.65±0.06	26.2±1.5	ns	▽	ns	▽	ns	ns	ns	ns
	足寄拓北	13.1±1.2	39.9±2.5	1.77±0.12	23.0±2.1	ns	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	苫小牧成熟林	5.4±0.4	45.9±1.1	1.87±0.04	24.5±0.4	ns	ns	ns	▽	▲	ns	ns	ns
	苫小牧二次林404林班	5.1±0.8	47.4±1.0	1.75±0.07	27.2±1.0	ns	ns	ns	ns	▲	ns	ns	ns
	苫小牧二次林308林班	4.9±0.6	36.9±2.8	1.50±0.12	24.7±0.8	ns	▽	▽	▽	▲	ns	ns	ns
	苫小牧二次林208林班	6.8±0.7	44.6±1.6	1.79±0.07	25.0±1.1	▲	ns	ns	ns	▲	ns	ns	ns
	苫小牧アカエゾマツ人工林	17.0±1.4	46.7±1.2	1.32±0.04	35.7±1.7	ns	▽	ns	ns	ns	▽	ns	ns
	苫小牧カラマツ人工林	22.7±1.6	44.7±0.3	1.57±0.04	28.5±0.7	ns	▽	ns	ns	ns	ns	▲	ns
	苫小牧トマツ人工林	15.3±2.3	46.4±1.4	1.55±0.06	30.2±1.9	ns	▽	ns	ns	▲	ns	ns	ns
	大佐渡	7.7±1.1	42.6±1.1	1.17±0.08	37.1±2.7	ns	▽	ns	▽	ns	▽	ns	▽
佐渡	小佐渡豊岡	6.2±0.8	37.7±2.2	1.27±0.09	30.0±2.3	ns	▽	ns	▽	▽	▲	ns	▽
	小佐渡キセン城	7.1±0.7	36.0±2.0	1.21±0.07	30.0±1.6	ns	▽	▽	ns	ns	ns	ns	ns
	カヌマ沢溪畔林	8.9±1.5	51.3±1.1	1.97±0.09	26.2±0.9	▲	▲	ns	ns	▲	ns	ns	ns
本州	青葉山	6.9±0.7	52.7±0.4	1.77±0.11	30.3±2.3	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	小川	4.7±0.6	52.9±2.9	2.19±0.09	24.2±1.0	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	秩父ブナ・イヌブナ林	14.1±2.3	48.8±2.9	1.44±0.04	34.0±2.1	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	大山沢	11.1±1.3	50.2±1.5	2.36±0.10	21.4±0.5	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	カヤの平	9.6±1.1	54.5±1.2	2.03±0.09	27.0±1.1	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	おたの申す平	13.7±1.1	53.4±0.4	1.77±0.08	30.4±1.4	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	愛知赤津	7.6±1.5	42.4±0.8	1.01±0.03	42.0±1.2	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	芦生枅上谷	17.2±2.8	42.0±1.2	1.12±0.10	38.6±3.2	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	上賀茂	44.1±6.9	38.1±3.1	1.22±0.05	31.2±2.5	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	和歌山	17.4±2.9	30.2±3.3	0.78±0.10	38.9±2.4	▲	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns
四国	市ノ又	4.5±1.2	38.8±1.6	0.95±0.04	41.2±1.4	▽	▽	ns	ns	▽	ns	ns	ns
	佐田山	6.4±0.4	35.5±1.8	1.08±0.08	33.1±1.2	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
九州	綾	7.6±0.7	43.9±0.6	1.30±0.03	33.7±1.0	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	田野二次林	4.2±0.7	41.4±1.2	1.11±0.06	37.6±1.2	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
南西諸島	奄美	5.3±0.9	47.3±1.9	1.35±0.05	35.1±0.7	ns	▽	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	与那	9.2±0.7	41.2±2.3	1.52±0.08	27.3±1.8	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

* 2013 年度か否かを説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲:2013 年度の値>2005~2012 年度の値($P<0.05$)、▽:2013 年度の値<2005~2012 年度の値($P<0.05$)、ns:有意差なし($P>0.05$)。

** 年を説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲:増加傾向($P<0.05$)、▽:減少傾向($P<0.05$)、ns:傾向なし($P>0.05$)。

表 II-4-9. 各調査区における土壌の炭素(C)・窒素(N)含有率、炭素窒素比(C/N)の、2013 年度の測定値(5サブプロットの平均±標準誤差)及び年変化の傾向

調査区名	2013年度(平均±標準誤差)			2013 vs 2005~2012*		2005~2013の変化傾向**	
	C含有率 (%)	N含有率 (%)	C/N	C含有 率	N含有 率	C/N	C/N
北海道	雨龍	15.1±2.5	0.88±0.14	17.1±0.5	ns	ns	ns
	足寄拓北	12.1±0.7	0.96±0.07	12.7±0.3	ns	ns	ns
	苫小牧成熱林	8.2±1.1	0.60±0.07	13.4±0.3	ns	▽	▽
	苫小牧二次林404林班	9.3±2.2	0.65±0.15	14.0±0.4	ns	▽	▽
	苫小牧二次林308林班	5.8±0.5	0.43±0.03	13.7±0.2	▽	▽	▽
	苫小牧二次林208林班	4.8±0.6	0.37±0.05	13.3±0.2	▽	ns	▽
	苫小牧アカエゾマツ人工林	12.6±5.4	0.63±0.19	18.2±2.0	ns	ns	ns
	苫小牧カラマツ人工林	7.4±1.0	0.47±0.05	15.7±0.5	ns	ns	ns
佐渡	苫小牧トドマツ人工林	6.1±0.7	0.46±0.05	13.4±0.5	ns	ns	ns
	大佐渡	28.0±6.0	1.61±0.29	16.8±0.9	ns	▲	▽
	小佐渡豊岡	12.5±1.7	0.52±0.08	24.5±1.5	ns	▲	▲
	小佐渡キセン城	10.6±0.2	0.71±0.02	15.0±0.4	ns	ns	ns
本州	カヌマ沢溪畔林	17.7±4.9	1.10±0.25	15.3±1.0	ns	▽	▽
	青葉山	15.4±4.9	0.88±0.24	16.7±1.0	ns	▲	▽
	小川	13.2±1.4	0.89±0.11	14.8±0.4	ns	ns	ns
	秩父ブナ・イヌブナ林	13.2±0.9	0.89±0.06	14.9±0.7	ns	ns	▲
	大山沢	24.5±3.7	1.90±0.29	13.0±0.4	ns	ns	ns
	カヤの平	40.4±2.7	2.41±0.08	16.7±0.7	▲	▲	▲
	おたの申す平	30.2±3.6	1.42±0.14	21.1±0.5	ns	ns	ns
	愛知赤津	14.7±4.1	0.60±0.16	24.3±1.2	ns	▲	▽
	芦生枡上谷	24.3±4.1	1.29±0.17	18.6±1.0	ns	ns	ns
	上賀茂	7.3±0.8	0.29±0.03	25.4±1.0	▽	ns	▲
四国	和歌山	11.8±1.5	0.64±0.08	18.6±0.6	ns	ns	ns
	市ノ又	22.1±3.0	1.04±0.11	20.9±1.2	ns	ns	ns
九州	佐田山	7.5±1.0	0.54±0.08	13.8±0.2	ns	▽	ns
	綾	17.1±2.3	1.14±0.11	14.7±0.7	▲	▲	ns
南西諸島	田野二次林	7.5±0.4	0.40±0.02	18.9±0.9	ns	ns	ns
	奄美与那	8.9±2.2	0.48±0.10	18.1±0.7	ns	ns	ns
		7.7±0.9	0.38±0.03	20.2±0.9	▽	ns	ns

* 2013 年度か否かを説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲: 2013 年度の値>2005~2012 年度の値($P<0.05$)、▽: 2013 年度の値<2005~2012 年度の値($P<0.05$)、ns: 有意差なし($P>0.05$)。

** 年を説明変数とする線形混合モデルによる解析の結果。▲: 増加傾向($P<0.05$)、▽: 減少傾向($P<0.05$)、ns: 傾向なし($P>0.05$)。

表 II-4-10. 各調査区におけるセルロース紙の分解率と分解速度定数(5サブプロットの平均±標準誤差)

		堆積落葉層		土壌層	
		分解率 (%)	分解速度定数 k (日 ⁻¹)	分解率 (%)	分解速度定数 k (日 ⁻¹)
北海道	雨龍	72.4±2.2	0.014±0.002	71.0±2.4	0.013±0.002
	足寄拓北	57.2±3.8	0.006±0.001	55.2±6.8	0.008±0.002
	苫小牧成熟林	73.8±2.1	0.018±0.003	74.5±1.0	0.016±0.003
	苫小牧二次林404林班	76.5±1.3	0.024±0.002	76.1±0.7	0.019±0.003
	苫小牧二次林308林班	77.6±0.4	0.024±0.002	76.6±0.7	0.022±0.002
	苫小牧二次林208林班	76.2±0.6	0.019±0.003	73.5±3.0	0.021±0.004
	苫小牧アカエゾマツ人工林	61.5±2.9	0.007±0.001	41.2±6.6	0.004±0.002
	苫小牧カラマツ人工林	69.1±5.2	0.018±0.005	48.2±8.3	0.010±0.005
	苫小牧トドマツ人工林	59.7±5.1	0.009±0.003	48.7±7.8	0.008±0.005
佐渡	大佐渡	71.6±2.4	0.015±0.003	59.0±4.1	0.008±0.002
	小佐渡豊岡	76.4±0.8	0.024±0.003	75.5±2.0	0.024±0.004
	小佐渡キセン城	75.1±1.1	0.019±0.002	68.3±5.2	0.014±0.003
本州	カヌマ沢溪畔林	67.5±2.2	0.011±0.002	63.5±2.7	0.008±0.001
	青葉山	77.0±0.3	0.030±0.003	68.4±4.3	0.019±0.005
	小川	76.3±1.1	0.021±0.003	65.3±5.0	0.008±0.002
	秩父ブナ・イヌブナ林	67.3±2.4	0.010±0.001	47.0±7.6	0.006±0.002
	大山沢	53.3±5.0	0.006±0.001	53.2±6.5	0.007±0.001
	カヤの平	76.9±0.5	0.024±0.002	62.4±2.7	0.008±0.001
	おたの申す平	53.1±3.3	0.005±0.001	43.4±5.8	0.004±0.001
	愛知赤津	45.1±6.3	0.006±0.002	59.8±3.5	0.008±0.002
	芦生枡上谷	66.0±3.5	0.012±0.003	62.3±3.1	0.009±0.002
	上賀茂	22.8±7.0	0.002±0.001	29.8±7.4	0.003±0.001
四国	和歌山	58.1±4.8	0.008±0.002	52.2±7.2	0.008±0.003
	市ノ又	44.8±9.9	0.010±0.005	56.1±7.6	0.015±0.006
九州	佐田山	52.7±6.3	0.010±0.005	57.3±5.2	0.011±0.004
	綾	56.4±5.3	0.013±0.006	55.4±8.8	0.016±0.006
南西 諸島	田野二次林	33.1±7.9	0.004±0.002	47.2±6.9	0.008±0.002
	奄美	70.4±1.0	0.014±0.001	68.9±4.8	0.021±0.003
	与那	71.7±4.5	0.032±0.003	77.2±0.9	0.034±0.005




図 II-4-3. セルロース紙の分解速度定数(5サブプロットの平均±標準誤差)と設置期間中の気象条件(2012年11月～2013年5月)との関係

5. 鳥類調査

(1) 調査方法

1) 鳥類調査

本調査では、コアサイト及び準コアサイトの調査区内またはその周辺に5か所の定点を設定し、目視観察により鳥類の種及び種別個体数の記録を行った。また、定点周囲の植生状況の簡単な記録を行った。

鳥類の調査方法は、定点とその周辺にいる鳥をすべて記録していくスポットセンサス法（以下、「スポットセンサス」という）を採用した。この調査法は、従来のラインセンサス法よりも鳥類を記録できる率が高く、環境との対比や調査地点間の比較がしやすい利点がある。以下に、調査方法の概略を示す。

調査方法の概要（スポットセンサス）	
調査頻度	毎年繁殖期と越冬期に、5か所の定点で各4回（定点1か所につき原則1日に2回。各期2日間実施）、10分間の定点調査を実施した。ただし、多雪地域での越冬期調査は行わないこととした。
調査時期	繁殖期：繁殖期の前半に1日と繁殖期の最盛期に1日の合計2日間 越冬期：12月から2月の間で2週間以上の間隔をあけた2日間
調査定点	定点は、調査区内またはその周辺に200m程度の間隔をあけた上で極力、調査区と類似した（同一の）環境にA～Eの5つの定点を設置した。調査順はA→B→C→D→E→E→D→C→B→Aのように、折り返すようにして調査した。往路の調査終了後、復路の調査開始までには15分以上の間隔をあけた。
調査範囲	各定点において、半径50mの範囲。
記録内容	調査中に出現した鳥の種名、個体数、行動等を記録した。対象地域付近の生息種をより多く記録するために、調査範囲外も同様に記録した。記録は各定点につき10分間の調査を2分ごとの5回に分けて行った。
調査地点の写真	周辺環境の記録、調査地点の再現性の確保を目的に、各定点で写真を撮影した。

2) 植生概況調査

植生の調査は、定点の調査範囲内に約25m四方の調査区画を設定し、その中の植物の被度を林床（へそ高以下）、低木層（身長1.5m程度まで）、亜高木層（10m程度まで）、高木層（林冠）、高高木層（突出木）に分けて記録した。各層の植物の被度は、6階級で記録し、階級はランク0＝植生なし、1＝1～10%、2＝10～25%、3＝25～50%、4＝50～75%、5＝75%以上とした。

(2) 平成 25 (2013) 年度調査結果

20 か所のコアサイトと 7 か所の準コアサイトで調査を計画し、実施した (表 II-5-1)。また、越冬期の調査は積雪のために調査地へのアクセスが困難な場所や狩猟のために調査者の安全が確保できない場所では調査を行わなかった。その結果、調査サイト数は繁殖期に 20 か所のコアサイトと 7 か所の準コアサイト、越冬期に 14 か所のコアサイト、4 か所の準コアサイトとなった (表 II-5-1)。

表 II-5-1. 2013 年度の調査実施状況

ID	サイト名	種別	調査間隔	繁殖期	越冬期	備考
1	苫小牧	コア	毎年	○	○	
2	カヌマ沢	コア	毎年	○		
3	大佐渡	コア	毎年	○		
4	小佐渡	コア	毎年	○	○	
5	小川	コア	毎年	○	○	
6	秩父	コア	毎年	○	○	
8	愛知赤津	コア	毎年	○	○	
9	綾	コア	毎年	○	○	
10	田野	コア	毎年	○	○	
11	与那	コア	毎年	○	○	
12	雨龍	コア	毎年	○	○	
13	足寄	コア	毎年	○		
14	カヤの平	コア	毎年	○		
15	おたの申す平	コア	毎年	○		
16	和歌山	コア	毎年	○	○	
17	市ノ又	コア	毎年	○	○	
31	芦生	コア	毎年	○		
32	上賀茂	コア	毎年	○	○	
38	大山沢	コア	毎年	○	○	
45	那須高原	コア	毎年	○	○	
23	奄美	準コア	毎年	○	○	
39	大雪山	準コア	5年に1度	○		
40	大滝沢	準コア	5年に1度	○		
41	高原山	準コア	5年に1度	○	○	
42	木曾赤沢	準コア	5年に1度	○		
43	西丹沢	準コア	5年に1度	○	○	
46	筑波山	準コア	5年に1度	○	○	

（３）集計・解析

１）集計・解析方法

①鳥類調査

鳥類調査については、各調査サイトで確認された種数及び個体数を繁殖期、越冬期別に集計し、それを基に出現率、優占度、バイオマスを計算した。

種数は、調査範囲外を含めた全種数とした。大型キツツキ、大型ツグミのように種まで同定できなかった記録については、例えば同じサイトでそれとは別にアカゲラやアオゲラ等の大型キツツキが記録されている場合は、「大型キツツキ」の記録があっても種数に含めなかったが、記録されていない場合は１種として数えた。

個体数は、調査範囲内で記録されたものを対象とした。Ａ～Ｅまでの各定点で行った４回の調査のうち、各定点における種ごとの最大個体数を求め、それをＡ～Ｅの５地点分合計した値を各サイトにおける個体数とした。

出現率は、ある種の記録されたサイト数の総サイト数に対する割合とした。

優占度は、各サイトで記録された全種の個体数に対するその種の個体数の割合（％）を算出し、それを全サイトで平均した値をその種の優占度とした。

バイオマスは各種鳥類の個体数にその種の平均体重を掛けて算出した。

これらの値について、食物別、採食場所（ギルド）別に集計を行い、サイト間での比較を行った。解析には、繁殖期については 2009 年度から 2013 年度調査までのデータ、越冬期については 2009 年度から 2012 年度調査までのデータを用いた。

2) 越冬期群集構成

①種数及びバイオマス

越冬期の鳥類の記録状況について、2009～2012 年度の結果を示した（表Ⅱ-5-2）。繁殖期の鳥類相が比較的安定しているのに対して、越冬期の4年間の結果は年によって大きな変動が認められた。越冬期に群れで活動しているカラ類などが記録できるかどうかという確率的なばらつきとともに、群れで越冬するツグミ類、アトリ類などの渡来数の多少といった年変動による影響が大きいと考えられる。

表Ⅱ-5-2. 2009-2012 年度越冬期の鳥類の記録状況

サイト名	越冬期確認種数				越冬期バイオマス(kg/10ha)			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
雨龍	8	12	8	8	2.83	6.66	0.63	1.02
野幌		20				21.44		
苦小牧	15	16	14	12	5.98	25.83	22.38	22.97
青葉山		28				79.11		
小佐渡	24	21	22	20	11.97	14.09	18.88	10.47
那須高原	22	18	19	19	5.14	2.31	12.70	3.56
小川	25	27	15	23	10.57	22.68	10.84	7.41
高原山	14				5.01			
筑波山	23				11.12			
大山沢	14	16	15	12	3.78	2.37	4.36	3.24
秩父	19	17	18	20	3.55	3.26	10.39	5.84
西丹沢	15				6.43			
富士			22				15.88	
函南		21				8.35		
愛知赤津	14	12	11	12	9.02	10.85	12.53	7.24
上賀茂	19	22	16	21	23.79	15.61	33.13	23.41
春日山			23				32.26	
和歌山	17	9	14	13	7.52	1.05	6.05	1.84
半田山			14				1.74	
宮島	18				115.43			
市ノ又	12	14	13	15	3.16	5.43	4.64	2.73
佐田山				18				13.41
対馬龍良山				14				6.31
粕屋			17				15.43	
椎葉	21				7.46			
綾		20	18	13		4.99	3.92	4.32
田野	18	21	16	19	12.63	13.55	5.61	9.71
屋久島照葉樹林		13				22.51		
屋久島スギ林				11				2.73
奄美	16	20	15	13	30.62	35.49	10.21	14.27
与那	17	17	13	18	38.98	30.44	23.33	20.04
西表	15				18.13			
小笠原石門			5				3.35	

※ゴシックはコアサイト、明朝体は準コアサイトを示す。

②優占種

出現率と優占度の上位種について 2009～2012 年度の結果を示した（表Ⅱ-5-3）。出現率はヒヨドリ、ヤマガラ、コゲラ、シジュウカラが上位を占め、優占度はヒヨドリ、メジロ、シジュウカラ、ヤマガラが上位を占めることが多い点は例年と共通していたが、ヒガラが上位 10 種に入らなかった点は異なっていた。また、アトリ、マヒワといった鳥も上位には入らなかった。

表Ⅱ-5-3. 2009～2012 年度越冬期の鳥類の出現率および優占度の上位 10 種

	2012年度		2011年度		2010年度		2009年度
出現率							
1 ヒヨドリ	94.4	ヤマガラ	90.0	コゲラ	94.7	ヤマガラ	90.0
2 ヤマガラ	88.9	コゲラ	85.0	ヒヨドリ	94.7	コゲラ	85.0
コゲラ	83.3	ヒヨドリ	85.0	ヤマガラ	94.7	ヒヨドリ	85.0
カケス	72.2	シジュウカラ	85.0	ハシブトガラス	94.7	エナガ	65.0
5 シジュウカラ	72.2	ハシブトガラス	80.0	シジュウカラ	84.2	ハシブトガラス	65.0
6 メジロ	72.2	メジロ	70.0	エナガ	73.7	シジュウカラ	60.0
7 エナガ	61.1	キジバト	55.0	ゴジュウカラ	63.2	メジロ	55.0
シロハラ	61.1	アオゲラ	55.0	メジロ	63.2	シロハラ	55.0
ハシブトガラス	55.6	シロハラ	55.0	シロハラ	57.9	ミソサザイ	50.0
ゴジュウカラ	44.4	ヒガラ	55.0	カケス	57.9	カケス	45.0
優占度							
1 ヒヨドリ	9.9±6.8	エナガ	8.3±15.7	エナガ	8.8±8.4	ヒヨドリ	11.8±8.7
2 メジロ	9.8±9.5	ヒヨドリ	8.3±8.7	アトリ	7.0±21.2	エナガ	8.5±9.5
3 ヤマガラ	9.3±9.0	ヒガラ	6.9±13.6	ヤマガラ	6.7±5.8	メジロ	7.5±8.1
4 エナガ	7.4±8.9	アトリ	6.1±15.6	ヒヨドリ	6.2±5.7	ヤマガラ	7.5±7.7
5 コゲラ	5.4±4.5	ヤマガラ	5.9±6.6	シジュウカラ	5.7±5.3	コゲラ	5.2±4.2
6 シジュウカラ	5.2±5.5	メジロ	5.6±7.3	ヒガラ	5.4±10.8	ヒガラ	4.2±6.5
7 カケス	5.0±7.1	ハシブトガラス	4.5±8.3	メジロ	5.3±5.9	ハシブトガラス	4.2±7.0
8 コガラ	3.6±7.5	シジュウカラ	4.2±5.3	コゲラ	4.4±4.4	ハシブトガラ	4.2±13.5
9 キクイタダキ	3.4±8.7	コゲラ	3.9±4.6	マヒワ	3.7±8.1	シジュウカラ	4.0±4.7
10 ゴジュウカラ	3.3±4.9	ツグミ	2.8±8.4	ゴジュウカラ	2.8±4.1	ゴジュウカラ	4.0±5.4

コアサイトでヒガラが上位に入らなかった反面、2012 年度の冬は低地でヒガラやヤマガラ、ウソなどが多かったことが話題になっていた（植田・平野 2013）。また、ツグミも少なかったといわれた 2011 年度とは異なり、低地で普通に見られた。2011 年度は低地で鳥が少なかったが、山地では多く確認されたため、2012 年度は逆に山地にあるコアサイトでこれらの種が少ないのではないかと考察した。

ツグミについてみると、予想通り、小川サイトを除き、2012 年度は 2011 年度より記録数が減っていた。小川サイトは、標高 600m と比較的低い低山で、2011 年度に個体数が少なく、2012 年度は多いという低地と同じ変動を示していた。ツグミにとって小川サイトは山地よりも低地的な場所に位置していることが推測される。

ヒガラもほとんどの場所で 2012 年度は個体数が減少していた（図Ⅱ-5-1）。増加していたのは市の又と上賀茂、小佐渡である。市の又と上賀茂はヒガラが記録されたもっとも南の調査地の 2 つで、おそらく山地から低地に移動するという標高方向への動き以外に北から南に移動するという南北の動きもあり、そのためこれらのサイトでは個体数が増加した

のだと考えられる。また、小佐渡については佐渡が「島」だという特性が効いているのではないかと思われる。積雪の多い北側の大佐渡から、積雪の少ない小佐渡への島内の移動があって、そのため小佐渡でヒガラが多くなったことがうかがえる。

それに対してヤマガラは、ほとんどの場所で多く記録された。このことは、山地から低地に移動したという推測と矛盾する。昨年、少なくとも秩父サイトではヤマガラの繁殖状況が例年より好成績であるため、個体数の増えたヤマガラが山地から低地に移動し、山地と低地の両方で多かった可能性も考えられる。




図 II-5-1. ツグミ, ヒガラ, ヤマガラの越冬期の記録羽数の年変化

③食物別及び採食場所（ギルド）別の生息状況

2012 年度まで 3 年間調査が行われたサイトの食物別、採食場所別のバイオマスの割合を図 II-5-2 に示した。地理的な傾向は認められなかったが、多少の変動はあるものの 3 年間の構成比はおおむね一致しており、ギルド構成の年による変化は大きくないと考えられた。




図 II-5-2. 2010～2012 年度越冬期に記録された食物別、採食場所別の鳥類のバイオマスの割合

3) 繁殖期群集構成

①種数及びバイオマス

2009～2013 年度の繁殖期調査における鳥類の種数及びバイオマスを表Ⅱ-5-4 に示した。種数は年による変動はあるものの比較的安定していたが、バイオマスは変動が大きかった。ただし、越冬期ほど変動は小さくなく、繁殖期の鳥類相の方が安定していた。これは、繁殖期の鳥類はなわばりをもつ鳥が多く、それらの鳥が一定の密度で生息するのに対して、越冬期の鳥類は群れで移動する鳥が多く、食物の多寡によって分布が大きく変化することに由来しているものと考えられる。

表Ⅱ-5-4. 2013 年度繁殖期に記録された種数及びバイオマス

サイト名	種名					バイオマス(kg/10ha)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
足寄	27	33	30	30	34	5.3	5.7	5.5	7.7	7.9
雨龍	33	27	36	32	29	10.8	6.3	10.0	3.4	5.0
苫小牧	26	28	24	25	29	26.4	21.7	25.9	15.2	23.6
カヌマ沢	20	21	24	19	22	6.2	5.8	4.8	7.7	2.1
大佐渡	25	32	27	31	27	8.2	10.1	11.8	13.4	13.5
小佐渡	30	33	28	27	32	9.9	17.2	17.0	10.5	15.9
小川	22	24	25	26	33	14.7	13.9	15.5	13.4	25.3
那須高原	30	36	32	32	28	6.4	11.7	7.9	11.1	7.6
大山沢	27	36	29	27	30	4.7	9.3	5.6	4.4	4.0
秩父	33	38	28	29	31	8.4	8.5	5.8	3.2	4.0
カヤの平	22	23	25	29	27	4.2	4.5	5.2	6.9	7.9
おたの申す平	19	20	14	17	22	3.0	2.8	1.3	1.9	1.5
愛知赤津	23	19	22	18	22	8.8	8.1	13.6	9.7	8.9
芦生	25	25	20	22	17	15.7	25.8	8.4	24.4	6.0
上賀茂	23	22	16	21	21	25.8	26.9	27.9	23.3	25.0
和歌山	24	19	19	23	21	7.4	5.9	5.2	14.0	8.5
市ノ又	20	21	18	22	23	5.6	7.7	5.8	7.8	8.4
綾	22		24	23	25	3.9		5.4	4.0	6.5
田野	22		25	20	24	7.6		18.3	5.5	5.6
与那	16	17	16	17	17	17.5	22.1	19.8	19.6	14.9
奄美		19	18	16	17		24.1	22.5	21.5	14.2
大雪山					32					1.8
野幌		31					27.4			
大滝沢	23				24	8.1				6.0
早池峰		22					5.1			
青葉山		26					20.0			
金目川		35					15.7			
高原山	27				34	5.7				4.8
筑波山	28				28	8.7				11.0
西丹沢	24				32	5.6				4.1
富士			30					12.5		
函南		27					12.6			
御岳濁河		22					3.8			
木曾赤沢	20				16	1.4				1.0
春日山			25					16.4		
大山文珠越			23					10.8		
半田山				15					2.8	
臥龍山			23					16.1		
宮島	21					27.4				
佐田山				16					13.0	
対馬龍良山				14					6.6	
粕屋			20					8.3		
椎葉		26					11.4			
屋久島スギ林				15					7.2	
屋久島照葉樹林		14					11.6			
西表	15					21.7				
小笠原石門			4					3.1		

②優占種

出現率と優占度の上位種について 2009～2013 年度の結果を示した（表Ⅱ-5-5）。出現率はウグイス、キビタキ、シジュウカラ、ハシブトガラス、コゲラが上位を占め、優占度はヒヨドリ、ヒガラ、シジュウカラ、ヤマガラが上位を占めることが多かった。年による順位の入れ替わりはあるものの、上位種は安定していた。この安定性は越冬期よりも高く、繁殖期の鳥類相が安定していることがうかがえる。

表Ⅱ-5-5. 2009～2013 年度の繁殖期の出現率および優占度の上位 10 種


出現率										
順位	2013年		2012年		2011年		2010年		2009年	
	種名	出現率	種名	出現率	種名	出現率	種名	出現率	種名	出現率
1	キビタキ	96.3	ウグイス	92.0	ウグイス	96.4	ウグイス	92.6	シジュウカラ	92.6
2	シジュウカラ	92.6	シジュウカラ	92.0	キビタキ	89.3	シジュウカラ	88.9	キビタキ	85.2
3	ウグイス	88.9	ハシブトガラス	88.0	シジュウカラ	89.3	キビタキ	85.2	コゲラ	85.2
4	コゲラ	81.5	コゲラ	84.0	ハシブトガラス	82.1	コゲラ	81.5	ヒヨドリ	74.1
	ハシブトガラス	81.5	キビタキ	84.0	ヒガラ	78.6	ハシブトガラス	81.5	ヤマガラ	74.1
6	ヒガラ	77.8	ヤマガラ	84.0	ヒヨドリ	75.0	ヒヨドリ	77.8	ウグイス	74.1
	ヤマガラ	77.8	ヒヨドリ	72.0	ヤマガラ	75.0	ヒガラ	77.8	カケス	74.1
	カケス	77.8	ヒガラ	72.0	コゲラ	71.4	ヤマガラ	77.8	ヒガラ	66.7
	オオルリ	77.8	キジバト	64.0	カケス	71.4	カケス	74.1	エナガ	66.7
	ツツドリ	77.8	ツツドリ	64.0	エナガ	64.3	ツツドリ	70.4	イカル	59.3

優占度										
順位	2013年		2012年		2011年		2010年		2009年	
	種名	優占度	種名	優占度	種名	優占度	種名	優占度	種名	優占度
1	ヤマガラ	7.6±6.3	ヒヨドリ	9.0±7.1	ヒガラ	6.2±7.5	ヒヨドリ	8.6±8.1	ヒヨドリ	8.5±7.5
2	ヒガラ	6.7±6.3	ヤマガラ	7.5±6.6	ヤマガラ	5.2±5.3	ヒガラ	7.2±6.0	ヒガラ	6.8±7.2
3	ヒヨドリ	6.6±6.6	シジュウカラ	7.0±4.4	ヒヨドリ	5.1±6.1	シジュウカラ	5.6±3.6	シジュウカラ	6.5±3.6
4	シジュウカラ	6.4±3.3	エナガ	6.2±9.9	シジュウカラ	4.8±4.1	ヤマガラ	5.4±4.5	ヤマガラ	6.4±5.6
5	キビタキ	5.8±4.7	ヒガラ	5.3±5.9	キビタキ	4.4±4.5	ウグイス	5.1±4.0	ウグイス	5.7±5.2
6	エナガ	3.5±6.1	キビタキ	5.3±4.0	ウグイス	3.7±3.9	キビタキ	4.9±3.4	キビタキ	5.1±3.9
7	ウグイス	3.4±3.9	メジロ	5.0±6.1	エナガ	3.0±5.2	メジロ	4.4±5.7	メジロ	4.4±6.6
8	カケス	3.3±3.7	ウグイス	4.5±4.3	メジロ	3.0±4.3	コゲラ	3.4±3.0	エナガ	4.2±5.2
9	コゲラ	3.2±2.7	コゲラ	4.5±3.2	ミソサザイ	2.8±4.4	エナガ	3.0±3.8	コゲラ	3.7±2.4
10	メジロ	3.1±4.4	ミソサザイ	2.5±4.6	カケス	2.7±3.0	ミソサザイ	2.9±3.9	カケス	2.9±2.7

※順位は 2013 年度による。

③食物別及び採食場所（ギルド）別の生息状況

食物別、採食場所別のバイオマスの割合を図Ⅱ-5-3 に示した。寒冷な場所で特定のギルドが高くなるなどといった、地理的な傾向はあまり明確でなかった。しかし、特定の調査地のギルド構成の年による変化は小さく、ギルドの構成の年変動は小さいものと考えられた。



図Ⅱ-5-3. 2011-2013 年度繁殖期に記録された食物別、採食場所別の鳥類のバイオマスの割合
左ほど寒冷な調査地

4) 植生概況調査

大台ヶ原では、ニホンジカの採食により下層植生がなくなり、下層植生を利用するウグイス、コルリ、コマドリ等の種が減少し、逆に開けた場所を好むアカハラやビンズイ等が増加したことが報告されている (Hino 2000、日野 2004)。2010 年度の集計では、モニタリングサイト 1000 の結果からも低木層の被度と藪性の鳥のバイオマスには弱い正の相関が、地上性の鳥のバイオマスとは弱い負の相関があることが示された。本年度の集計では、4 年間の植生データが蓄積されたので、各地の林床や低木層の被度に変化が起きているかを検討した。

この簡易植性調査では、植生被度を 0 = なし、1 = 1 ~ 10%、2 = 10 ~ 25%、3 = 25 ~ 50%、4 = 50 ~ 75%、5 = 75% 以上の 6 段階に分けて記録している。目測で記録しているため、たとえ実際の植生に年変動がなかったにしても、調査員の植生評価の年によるばらつきが出てしまうことが懸念された。しかし、表 II-5-6 に 5 地点の平均値を示したように、年によるばらつきが小さかったため、この手法で経年的な植生の変化をとらえられることが期待できる。

経年的な被度の変化が大きかったのがカヌマ沢であった。林床、低木層ともに減少しており、特に低木層は 2009 年の 4.6 から 2011 年の 2.4 に大きく減少しており、2012 年、2013 年も 2.4 と 2.6 だった。今後の変化と、それに伴う鳥類層の変化に注意する必要がある。

表 II-5-6. コアサイトの5年間の簡易植生調査の結果

林床と低木層の結果を示した。数値は被度のランクの5地点の平均を示す。ランクは0=なし、1=1~10%、2=10~25%、3=25~50%、4=50~75%、5=75%以上である。

調査地名	林床					低木層				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
足寄	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.6	2.2	2.2	2.0	2.6
雨龍	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.6	1.6	1.6	2.0	1.8
苦小牧	4.0	3.0	3.4	3.2	4.2	3.0	2.2	2.0	2.0	2.0
カヌマ沢	3.4	2.4	2.8	3.0	4.6	4.6	4.4	2.4	2.4	2.6
大佐渡	5.0	4.4	4.4	4.0	4.8	3.6	4.0	4.6	4.0	4.2
小佐渡	3.4	2.8	3.6	3.4	4.2	3.4	2.8	3.2	3.0	4.0
おたの申す平	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
カヤの平	5.0	5.0	5.0	4.6	4.8	1.8	2.4	2.6	2.2	2.0
那須	5.0	4.8	4.6	5.0	4.6	2.4	2.4	2.4	2.6	2.2
小川	2.4	2.6	2.6	3.4	3.4	2.8	2.6	2.6	2.8	3.2
大山沢	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	1.8	1.8	2.6	2.6
秩父	0.6	1.0	1.0	1.4	1.2	1.8	2.2	2.2	1.8	2.6
愛知赤津	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.8	3.0	3.0	2.6	2.8
芦生	1.6	1.6	1.6	1.0	1.6	1.2	1.2	1.4	0.8	1.4
上賀茂	3.0	3.0	3.0	2.4	2.8	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2
和歌山	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.0	2.0	2.2	1.6	2.2
市ノ又	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
田野	2.6		2.6	2.6	2.6	3.4		3.4	3.4	3.4
綾	1.3		1.6	1.6	1.6	3.0		3.0	3.0	3.0
奄美	3.6		1.8	2.2	2.4	3.6		2.6	2.4	3.2
与那	3.2	3.2	2.8	3.2	3.0	3.6	3.6	3.2	2.8	2.2

引用文献


- Hino, T., 2000. Bird community and vegetation structure in a forest with a high density of Sika Deer. *Japanese Journal of Ornithology*, 48: 197-204.
- 日野輝明, 2004. シカが鳥のすみかを左右する. 森の野鳥を楽しむ 101 のヒント. pp. 164-165. 日本林業技術協会, 東京.
- 植田睦之・平野敏明, 2013. この冬は西高東低～冬鳥調査の結果から～. *バードリサーチニュース*, 10(4): 1.

Ⅲ 一般サイト調査実施状況及び調査結果

1. 調査サイトの配置状況

全国約 1,000 か所のモニタリングサイトのうち、森林・草原の一般サイトは 419 か所を占める。これらサイトでは、おおむね 5 年に 1 回の頻度で陸生鳥類調査（繁殖期及び越冬期）及び植生概況調査（繁殖期にのみ実施）を実施している。

2013年度繁殖期は、森林71サイト、草原13サイト、計84サイトに調査を依頼した。2013年度の調査依頼サイトは、過年度とほぼ同じ水準で、生物多様性保全のための国土10区分と標高帯を網羅できている（図Ⅲ-1-1）。繁殖期に調査を依頼したサイトのうち、23サイトでは積雪などの理由により越冬期調査が不可能であったため、越冬期の調査サイト数は繁殖期より少ない。



図Ⅲ-1-1. 2013年度調査依頼サイト

2. 植生概況調査

(1) 調査方法

植生と鳥類の関係では、面積が大きな森ほど（村井・樋口 1988）、また、林内の植生の階層構造が発達した林ほど（Hino 1985など）鳥類の多様性は高くなることが知られている。樹冠部の状況は、衛星写真や空中写真などで把握することができるが、階層構造まで把握することは困難である。そこで、簡便であり、植物に詳しい調査者でなくても実施可能な方法により、繁殖期に植生概況調査を実施した（調査方法の詳細は、「V 資料 7. 調査マニュアル」を参照）。

森林サイトの植生階層構造の調査では、鳥類のスポットセンサス（「III 3. 鳥類調査（1）調査方法」を参照）を行った各定点で約 25m 四方の調査区を設定し、階層別に植物の被度を記録した。階層は、林床、低木層、亜高木層、高木層（林冠）、高高木層（突出木）の 5 層に分けた。各層の植物の被度は、6 階級（植生なし、1～10%、10～25%、25～50%、50～75%、75%以上）に分けて記録した。

草原サイトの植生概況調査では、鳥類のスポットセンサスを行った各定点で約 50m 四方の調査区を設定し、水平方向の環境構造の把握を目的として、草本は丈によって、ひざ下の草、へそ下の草、背丈程度、背丈以上の 4 区分、また他の要素については耕作地、樹木、裸地、水域の 4 区分（合計 8 区分）に分け、各環境の被度を 6 階級（植生なし、1～10%、10～25%、25～50%、50～75%、75%以上）にて記録した。

森林サイトにおいては、植生タイプについても調査した。各層の植生をササ、草、落葉広葉樹、常緑広葉樹、常緑針葉樹、落葉針葉樹、タケの 7 タイプに分け、優占度が高いものから 1～7 位の順位をつけた。

(2) 平成25（2013）年度調査結果

繁殖期は森林 68 サイト、草原 12 サイト、計 80 サイトにて植物が展葉している繁殖期に植生概況調査を実施した。

(3) 集計・解析

1) 集計・解析方法

解析可能なデータが得られた森林65サイトについて解析した。調査方法に誤りが認められた【100224 古処山】、【100237 妙善坊】、調査が実施されなかった【100183 大國林道】は除いた。なお、サイト中の一部地点のみ植生データが欠けていたり調査表への記入の誤りと思われるサイトがあったが、調査員への聞き取りや環境写真から値を評価できた場合は補完して本解析に使用した。なお、これらサイトの一部には、鳥類データが得られていないサイトも含まれている。森林サイトは植生の階層構造について十分なサンプル数を得られているが、草原サイトは各年度の調査サイト数が10前後と少なく、単年度での解析は

困難である。

森林において鳥類の種多様度と正の関係を持つ傾向が知られている群葉高多様度（FHD）（e.g. MacArthur and MacArthur 1961、Recher 1969）をサイトごとに被度階級に基づいて算出した。群葉高多様度は、各階層の群葉密度から求められるShannon-Weaver関数であり、ある階層における植物被度ランクをFA、全階層のFAを合計したものをFASUMとすると、以下の式で表される。

$$FHD = - \sum_{i=1}^s P_i \ln P_i \quad s: \text{階層数}, P_i: i\text{番目の階層のFAのFASUMに対する割合。}$$

各サイトのFAは、5定点のデータの平均値とした。

一方、草原サイトについては、過年度の結果より単年度での環境構造の解析は、サンプル数が不十分であると判断されたため、1期分5か年を蓄積して解析する事が妥当である。それゆえ草原サイトについては単年度での評価は見送った。

2) 植生の構造解析

a) 森林サイトにおける植生階層構造

繁殖期の森林65サイトにおいて算出した群葉高多様度は、2009-2012年度とほぼ同じだった（図Ⅲ-2-1； 1.42 ± 0.12 SD）。群葉高多様度の最下位より2サイトは、統計的にはずれ値であった（高知県【100531 鏡ダム】、千葉県【100081 麻綿原】）。

はずれ値となった2サイトの地域的統一性は認められなかった。これは昨年の傾向と同様であるが、一昨年度のはずれ値はいずれも北海道であったことと異なる結果である。

最下位であった【100531 鏡ダム】は、標高帯は250mに位置し、植生は低層～亜高木層が常緑広葉樹によって構成されるが、それより高い高木層・高高木層に植生がなかった。このように本サイトは広葉樹で構成され樹高が低かった。

次に低かった【100081 麻綿原】は、標高帯は500mに位置し、ウツギ、カエデ、ヤマザクラ、スギ、アカマツ、シラカシなどが主体の主に落葉広葉樹を中心とし常緑針葉樹が少数まじる環境であった。ただし、本サイトは植生調査に不十分な点があり、林床植生の調査精度が低かったので、この点が群葉高多様度を幾分押し下げた可能性はある。

群葉高多様度と鳥類調査結果との関係については、「Ⅲ 3. 鳥類調査 （3）集計・解析 3）森林サイトにおける植生階層構造と鳥類の種多様度の関係（繁殖期）」に記した。




図 III-2-1. 森林サイトにおける群葉高多様度の分布

3. 鳥類調査

(1) 調査方法

一般サイトでは、1つのサイトについておおむね5年に1回、年度内の繁殖期（4～7月上旬）と越冬期（12月中旬～2月中旬）を調査することとしている。ただし、多雪地域や高標高のサイトにおいて、越冬期の調査が困難な場合は、繁殖期のみの調査でも可としている。

調査方法は、2008年度よりスポットセンサス法を採用している。各サイトにおいて、延長1kmの調査路に100m以上の間隔を置いて5つの定点（A～E）を設けた。繁殖期には、繁殖期前半の1日に各定点2回ずつ（調査路の往復）、繁殖最盛期にも同様に1日に各定点2回ずつ、合計で各定点4回の調査を行った。往路の調査終了後、復路の調査開始までには15分以上の間隔をあけた。越冬期にも同様に、2週間以上間隔をあけた2日間で、各定点合計4回の調査を行った。1回の調査は、各定点で10分間、半径50m以内の範囲とそれ以上の範囲に分けて、目視あるいは鳴き声を確認した鳥類の種類と個体数を記録した。記録は10分間を2分ごとの5回に分けて行った。調査時間帯は、繁殖期は早朝から9:00まで、越冬期は8:00～11:00の間に設定している。雨天と強風の時には調査を行わなかった。

(2) 平成25（2013）年度調査結果

繁殖期については、森林69サイト、草原12サイト、計81サイトで、越冬期については、森林50サイト、草原8サイト、計58サイトで調査を実施した（表Ⅲ-3-1及び表Ⅲ-3-2）。

(3) 集計・解析

1) 集計・解析方法

本報告書では、2013年度繁殖期と2012年度越冬期の調査結果を集計・解析した。ここでは、2013年12月31日までにチェックを終え、解析に使用できると判断されたデータのみ解析に用いた。繁殖期に解析可能な鳥類データの得られたサイトは、森林63サイト、草原12サイト、計75サイト（表Ⅲ-3-1）であり、越冬期は、森林48サイト、草原7サイト、計55サイトであった（表Ⅲ-3-2）。

調査時期（調査日）や調査時間帯等の間違いがあったとしても、その程度が軽微であった場合は、すべてのデータを解析に用いた（詳細は、表Ⅲ-3-1及び表Ⅲ-3-2の備考欄を参照）。調査時間帯については、過去のモニタリングサイト1000 森林・草原調査における解析と同様に、午前中に行われた調査は正しい方法で行われたと見なした。【100049 酒田北部】、【100144 岡山県立森林公園】、【100237 妙善坊】、【100327 皿ヶ峰】、【100524 松川温泉】、【100533 高坂ダム】については、調査方法の誤りや調査回数の不足があったため解析対象から除外した。

出現種の集計は、解析目的によって、定点から半径50m以上の範囲で記録された種もすべ

て含める場合と、50m以内で記録された種のみを含める場合に分けた。個体数のデータには、定点から半径50m以内の範囲で記録されたもののみ解析に使用した。サイトで観察された個体数は、サイトの定点ごとに観察された種の最大個体数を、5 定点分合計した個体数を用いた。各定点における調査回ごとの個体数は、10分の調査時間を 5 分割したうちの最大個体数を採用した。つまり、その各調査回の各定点の個体数のうち最大数を、A～E の 5 定点分合計したものが各サイトの個体数となる。

表Ⅲ-3-1. 2013年度繁殖期調査実施状況一覧

サイト コード	調査サイト名	都道府県	生態系 タイプ	10 区分	標高帯	経度	緯度	繁殖期				越冬期		
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考	調査 依頼	調査 実施	備考
100018	売買川	北海道	森林	1	250	143.16	42.87	○	○	○		○	○	
100020	平取町芽生	北海道	草原	1	250	142.40	42.69	○	○	○		○	○	
100035	吉田川	宮城県	草原	3	250	141.01	38.44	○	○	○		○	○	
100047	天元台	山形県	森林	4	2000	140.15	37.75	○	×	×	土砂崩れで調査不可	×	—	
100049	酒田北部	山形県	森林	4	250	139.84	38.98	○	○	×	調査方法の誤り	○	○	
100060	茨城県民の森	茨城県	森林	6	250	140.44	36.48	○	○	○		○	○	
100061	北筑波登山道	茨城県	森林	6	750	140.10	36.23	○	○	○		○	○	
100081	麻綿原	千葉県	森林	6	500	140.17	35.19	○	○	○		×	—	
100084	津久井町鳥屋	神奈川	森林	6	500	139.21	35.53	○	○	○		○	×	調査員の都合つかず
100093	八尾(猿倉山)	富山県	森林	4	250	137.23	36.56	○	○	○		○	○	
100095	美女平探鳥コース	富山県	森林	4	1000	137.47	36.58	○	○	○	調査終了時刻がやや遅い	×	—	
100098	別所岳	石川県	森林	5	250	136.85	37.19	○	○	○		○	○	
100118	下呂市御厩野	岐阜県	森林	6	1000	137.33	35.78	○	○	○		○	○	
100125	中山川流域	静岡県	森林	6	250	137.90	34.95	○	○	○		○	○	
100129	新城市庭野	愛知県	森林	6	250	137.51	34.89	○	○	○		○	○	
100131	印賀	鳥取県	森林	5	500	133.34	35.22	○	×	×	調査員の都合つかず	×	—	
100133	波関・使原線	鳥取県	森林	5	750	133.97	35.41	○	○	○		○	○	
100143	芋原コース	岡山県	森林	7	500	133.39	34.75	○	○	○		○	○	
100144	岡山県立森林公園	岡山県	森林	5	1000	133.88	35.28	○	○	×	調査回数不足	○	○	積雪で調査回数不足
100159	三嶺	徳島県	草原	8	1750	133.99	33.84	○	○	○		×	—	
100162	白峰寺遍路道	香川県	森林	7	500	133.93	34.33	○	○	○		○	○	
100163	鹿庭	香川県	森林	7	750	134.20	34.20	○	○	○		○	○	積雪で調査回数不足
100165	高鉢山	香川県	森林	7	500	133.94	34.19	○	○	○		○	○	
100183	大國林道	沖縄県	森林	9	500	128.21	26.73	○	○	○	調査実施時期がやや遅い	○	○	
100193	愛知川河川敷	滋賀県	草原	6	250	136.22	35.12	○	○	○	調査実施時期がやや遅い	○	○	
100198	京丹波町坂井	京都府	森林	7	500	135.34	35.20	○	○	○		○	○	
100212	竜王湖	奈良県	森林	6	750	135.99	34.57	○	○	○		○	○	
100221	新宮市高田農道	三重県	森林	8	250	135.91	33.74	○	○	○		○	○	
100224	古処山	福岡県	森林	8	750	130.72	33.48	○	○	○	調査実施時期がやや遅い	○	○	積雪で調査回数不足

表Ⅲ-3-1. (続き)

サイト コード	調査サイト名	都道府県	生態系 タイプ	10 区分	標高帯	経度	緯度	繁殖期				越冬期		
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考	調査 依頼	調査 実施	備考
100227	大小野ー大楮間林道	佐賀県	森林	8	500	130.31	33.35	○	○	○		○	○	
100237	妙善坊	大分県	森林	8	250	131.53	33.47	○	○	×	雨天のため調査中断	×	—	
100244	原沢ノ後林道	鹿児島	森林	8	250	130.85	31.18	○	○	○	調査実施時期がやや遅い	○	○	
100255	有珠善光寺	北海道	森林	2	250	140.78	42.52	○	○	○		○	○	
100258	氷ノ山坂ノ谷	兵庫県	森林	5	1250	134.52	35.33	○	○	○		×	—	
100261	興部	北海道	草原	1	250	143.11	44.49	○	○	○		○	○	
100269	高妻山	長野県	森林	4	1500	138.08	36.78	○	○	○		×	—	
100270	手賀沼(岩井)	千葉県	草原	6	250	140.03	35.86	○	○	○		○	○	
100273	和歌山県高野山	和歌山	森林	8	1000	135.61	34.22	○	○	○		○	○	
100276	南丘貯水池	北海道	森林	2	250	142.40	43.97	○	○	○		×	—	
100278	21世紀の森	北海道	森林	2	750	142.70	43.72	○	○	○		×	—	
100281	本山寺	岡山県	森林	7	500	134.01	34.94	○	○	○		○	○	
100284	笠岡湾干拓地	岡山県	草原	7	250	133.49	34.47	○	○	○		○	○	
100315	大床谷	三重県	森林	8	500	136.73	34.39	○	○	○		○	○	
100323	荒雄岳観光道路	宮城県	森林	4	750	140.72	38.82	○	○	○		○	×	積雪で調査不可能
100324	石鎚山	愛媛県	森林	8	1500	133.13	33.79	○	○	○	調査実施時期がやや遅い	○	○	調査実施時期がやや遅い
100326	高縄山	愛媛県	森林	7	1000	132.85	33.95	○	○	○		○	○	
100327	皿ヶ峰	愛媛県	森林	8	1000	132.89	33.72	○	○	×	調査方法の誤り	○	○	
100330	篠山	愛媛県	森林	8	750	132.65	33.05	○	○	○		○	○	
100332	背あぶり山	福島県	森林	4	500	139.97	37.48	○	○	○		×	—	
100334	猪苗代湖北岸	福島県	草原	4	750	140.14	37.51	○	○	○		○	×	積雪で調査不可能
100344	伊香保森林公園	群馬県	森林	3	1250	138.92	36.48	○	○	○		○	○	調査実施時期がやや遅い
100346	須衛	岐阜県	森林	6	250	136.90	35.44	○	○	○		○	○	
100351	白山・白川自然休養林	岐阜県	森林	4	1500	136.82	36.15	○	○	○		×	—	
100355	海上の森	愛知県	森林	6	250	137.12	35.19	○	○	○		○	○	
100359	平家平	福井県	森林	4	1000	136.49	35.83	○	○	○		○	×	調査員の都合つかず
100365	芦生上谷	京都府	森林	5	750	135.74	35.35	○	○	○		×	—	
100368	西岡水源池	北海道	森林	2	250	141.38	42.98	○	○	○		○	○	
100376	豊平龍頭山	広島県	森林	7	750	132.44	34.67	○	○	○		○	○	

表Ⅲ-3-1. (続き)

サイト コード	調査サイト名	都道府県	生態系 タイプ	10 区分	標高帯	経度	緯度	繁殖期				越冬期		
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考	調査 依頼	調査 実施	備考
100377	川井谷(藤尾川)	広島県	森林	7	500	133.26	34.66	○	○	○		○	○	
100382	三平峠	群馬県	森林	4	1750	139.30	36.91	○	○	○		×	—	
100384	本山寺自然環境保全地域	大阪府	森林	7	500	135.61	34.92	○	○	○		○	○	
100392	県立短大農場牧草地	秋田県	草原	4	250	139.96	40.00	○	○	○		○	×	調査員の都合つかず
100398	横手市山内大松川大倉沢	秋田県	森林	4	250	140.66	39.33	○	○	○		×	—	
100403	河北潟干拓地	石川県	草原	5	250	136.69	36.69	○	○	○		○	○	
100412	角田山	新潟県	森林	5	250	138.85	37.79	○	○	○		○	○	
100413	月岡林道	新潟県	森林	4	250	138.98	37.60	○	○	○		○	○	
100424	太平山	栃木県	森林	3	250	139.69	36.36	○	○	○		○	○	
100447	岩木山岳登山道	青森県	森林	4	500	140.27	40.64	○	○	○		○	○	
100455	発地	長野県	草原	3	1000	138.60	36.31	○	○	○		○	○	
100458	白河	福島県	森林	3	500	140.19	37.11	○	○	○		○	○	
100465	下折紙沢	青森県	森林	4	250	140.89	40.81	○	○	○		○	×	雪崩の危険性あり 調査不可
100492	行騰山	宮崎県	森林	8	500	131.58	32.62	○	○	○		○	○	
100515	積丹岬	北海道	草原	2	250	140.48	43.37	○	×	×	調査員の都合つかず	○	×	調査員の都合つかず
100524	松川温泉	岩手県	森林	4	1000	140.91	39.87	○	○	×	調査実施時期が遅い	×	—	
100531	鏡ダム	高知県	森林	8	250	133.48	33.62	○	○	○		○	○	
100533	高坂ダム	山形県	森林	4	500	140.16	38.97	○	○	×	調査回数不足	×	—	
100536	大塚	鹿児島県	森林	8	750	130.64	32.13	○	○	○		○	○	調査実施時期がやや 遅い
100549	平田	島根県	森林	5	250	132.76	35.42	○	○	○		○	○	
100555	活平	北海道	森林	1	250	143.70	42.95	○	○	○		○	○	
100558	花園	北海道	森林	1	250	143.66	43.88	○	○	○		○	○	
100566	カルルス温泉	北海道	森林	2	500	141.10	42.51	○	○	○		○	○	
100567	郡山	福島県	森林	3	500	140.46	37.40	○	○	○		○	○	
100584	砥峰高原	兵庫県	草原	7	1000	134.69	35.15	○	○	○		×	—	
100588	大矢岳	熊本県	森林	8	1250	131.01	32.79	○	○	○		○	×	調査員の都合つかず

調査依頼(○:依頼した、×:依頼していない)

調査実施(○:実施済み、×:実施できず、空:報告待ち)

データの解析可否(○:解析可、△:一部データは解析不可、×:解析に用いず)

備考:解析可否判断根拠

表Ⅲ-3-2. 2012 年度越冬期調査実施状況一覧

サイト コード	調査サイト名	生態系 タイプ	都道府県	10 区分	標高帯	緯度	経度	越冬期			
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考
100011	夕来	草原	北海道	1	250	45.22	141.58	○	○	○	
100031	高野	森林	岩手県	3	250	38.88	141.30	○	○	○	
100107	林道水晶線	森林	長野県	3	1000	36.45	138.23	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100131	印賀	森林	鳥取県	5	500	35.22	133.34	○	×	—	積雪のため調査できず
100206	鏑市ダム	森林	兵庫県	7	500	35.12	135.28	○	○	○	
100207	山田	森林	兵庫県	7	250	35.07	135.07	○	○	○	
100209	城崎	森林	兵庫県	5	250	35.65	134.77	○	○	○	
100253	佐白城趾	森林	茨城県	6	250	36.38	140.27	○	○	○	
100256	三川山	森林	兵庫県	5	500	35.56	134.64	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100264	小清水原生花園	草原	北海道	1	250	43.94	144.41	○	○	○	
100269	高妻山	森林	長野県	4	1500	36.78	138.08	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100274	護摩壇山	森林	和歌山	8	1250	34.06	135.57	○	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100286	菊池溪谷	森林	熊本県	8	1000	33.00	130.98	○	○	○	
100292	大関山	森林	熊本県	8	1000	32.20	130.55	○	○	○	
100294	熊田溜池	森林	山口県	5	500	34.49	131.59	○	○	○	
100297	牛島	森林	山口県	7	250	33.86	132.02	○	○	○	
100299	蓋井島	森林	山口県	8	250	34.25	131.31	○	○	○	
100300	小串	森林	山口県	5	500	34.21	130.98	○	○	○	
100303	木更津小櫃川河口三角州	草原	千葉県	6	250	35.41	139.90	○	○	○	
100304	館山野鳥の森	森林	千葉県	6	250	34.92	139.84	○	○	○	
100310	大台ヶ原	森林	奈良県	8	1500	34.19	136.08	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100322	荒谷	草原	宮城県	3	250	38.60	140.94	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100324	石鎚山	森林	愛媛県	8	1500	33.79	133.13	×	—	—	
100325	瓶ヶ森	草原	愛媛県	8	1750	33.79	133.19	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100332	背あぶり山	森林	福島県	4	500	37.48	139.97	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100333	細野野鳥の森	森林	福島県	4	1000	37.69	140.04	○	×	—	積雪のため調査できず
100349	二口林道	森林	宮城県	4	500	38.27	140.54	○	○	○	
100359	平家平	森林	福井県	4	1000	35.83	136.49	○	×	—	積雪のため道路閉鎖
100361	三里山	森林	福井県	5	250	35.94	136.23	○	○	○	
100363	野坂いこいの森	森林	福井県	5	500	35.61	136.03	○	○	○	
100370	尿前溪谷つづ沼コース	森林	岩手県	4	500	39.12	140.89	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず

表Ⅲ-3-2. (続き)

サイト コード	調査サイト名	生態系 タイプ	都道府県	10 区分	標高帯	緯度	経度	越冬期			
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考
100371	陸中川尻・湯川	森林	岩手県	4	500	39.27	140.77	○	○	○	
100372	野手崎	森林	岩手県	3	250	39.31	141.33	○	○	○	
100380	桧枝岐	森林	福島県	4	1750	36.98	139.30	○	×	×	積雪のため調査できず ^a
100383	岩湧山	森林	大阪府	7	750	34.37	135.55	○	○	○	
100391	老人福祉エリア散策路 (小友沼東エリア)	森林	秋田県	4	250	40.18	140.08	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100395	八塩山	森林	秋田県	4	750	39.24	140.23	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100396	大神成	森林	秋田県	4	750	39.54	140.72	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100397	岳岱自然観察教育林	森林	秋田県	4	750	40.42	140.27	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100405	田老	森林	岩手県	3	250	39.74	141.98	○	○	○	
100406	閉伊崎	森林	岩手県	3	250	39.64	142.02	○	○	○	
100408	害鷹森	森林	岩手県	4	1000	39.72	141.58	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100410	稲荷岡	森林	新潟県	5	250	38.02	139.29	○	○	○	
100414	矢代田	森林	新潟県	5	250	37.72	139.07	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100422	戦場ヶ原赤沼～三本松	草原	栃木県	4	1500	36.77	139.45	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100429	猿橋町藤崎	森林	山梨県	3	500	35.61	138.99	○	×	—	調査員健康上できず ^a
100430	武田の杜内健康の森	森林	山梨県	3	500	35.70	138.54	○	○	○	
100431	四尾連湖	森林	山梨県	3	1000	35.53	138.52	○	○	○	
100434	曲淵	森林	北海道	1	250	45.31	141.98	○	○	○	
100438	土橋自然観察教育林	森林	北海道	2	250	41.92	140.22	○	—	—	調査員健康上できず ^a
100439	函館山	森林	北海道	2	250	41.76	140.70	○	○	○	
100448	雲仙あざみ谷コース	森林	長崎県	8	1250	32.76	130.29	○	○	○	
100450	島原	森林	長崎県	8	250	32.80	130.32	○	○	○	
100451	ヒッ岳（五島列島）	森林	長崎県	8	250	32.69	128.69	○	○	○	
100456	霧ヶ峰池のくるみ遊歩道	草原	長野県	3	1750	36.48	138.88	○	○	×	積雪のため1日のみの調査
100457	蓼科	森林	長野県	3	2250	36.06	138.35	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100458	白河	森林	福島県	3	500	37.11	140.19	○	×	—	積雪のため調査できず ^a
100459	磐城金山	森林	福島県	3	750	37.02	140.28	○	○	○	
100467	湯川登山道	森林	福島県	4	1000	37.64	140.32	○	×	—	積雪のため調査できず ^a
100471	有峰湖	森林	富山県	4	1250	36.47	137.43	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず ^a
100475	小笠山	森林	静岡県	6	250	34.74	138.00	○	○	○	
100476	医王山	森林	石川県	5	500	36.53	136.77	○	○	○	

表Ⅲ-3-2. (続き)

サイト コード	調査サイト名	生態系 タイプ	都道府県	10 区分	標高帯	緯度	経度	越冬期			
								調査 依頼	調査 実施	解析 可否	備考
100477	古宇利島	森林	沖縄県	9	250	26.71	128.02	○	○	○	
100484	晩生内	草原	北海道	2	250	43.38	141.82	○	○	○	
100489	扇ノ山 沢川	森林	鳥取県	5	1000	35.42	134.45	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100491	御池野鳥の森	森林	宮崎県	8	750	31.88	130.95	○	○	○	
100493	大崩山林道	森林	宮崎県	8	750	32.74	131.54	○	○	○	
100494	陸上自衛隊霧島演習場	草原	宮崎県	8	750	31.99	130.79	○	○	○	
100506	床丹	草原	北海道	1	250	43.43	145.25	○	×	—	積雪のため調査できず
100511	黒河林道～三国山方面	森林	福井県	5	750	35.53	136.04	○	○	×	
100512	養老牛温泉	森林	北海道	1	250	43.59	144.73	×	—	—	越冬期調査困難のため依頼せず
100514	小樽西部	森林	北海道	2	250	43.21	140.98	○	○	○	
100515	積丹岬	草原	北海道	2	250	43.37	140.48	○	×	—	調査員の健康上の問題
100517	黒岳	森林	大分県	8	1000	33.12	131.29	○	○	○	
100518	九重町長者原	草原	大分県	8	1250	33.12	131.23	○	○	○	
100520	竹田市岡城跡	森林	大分県	8	500	32.97	131.40	○	○	○	
100521	高尾山自然公園	森林	大分県	8	250	33.22	131.65	○	○	○	
100522	野津原 県民の森	森林	大分県	8	250	33.15	131.54	○	○	○	
100528	横倉山	森林	高知県	8	750	33.53	133.20	○	○	○	
100529	工石山	森林	高知県	8	1000	33.67	133.52	○	○	○	
100530	春分峠	森林	高知県	8	750	33.32	133.03	○	○	○	
100535	紫尾山	森林	鹿児島	8	1000	31.98	130.37	○	○	○	
100537	二股トンネル北	森林	鹿児島	8	500	31.25	130.95	○	○	○	
100539	唐仁原	森林	鹿児島	8	250	31.44	130.29	○	○	○	
100541	母島	森林	高知県	8	250	32.72	132.57	○	○	○	
100550	西郷	森林	島根県	5	250	36.24	133.33	○	○	×	積雪のため1日のみの調査
100571	印野	森林	静岡県	3	1500	35.32	138.78	○	○	○	
100593	父島	森林	東京都	10	250	27.04	142.13	○	○	○	
100594	ウトナイ湖南東部湿原	草原	北海道	2	250	42.69	141.72	○	○	○	

調査依頼(○:依頼した、×:依頼していない)

調査実施(○:実施済み、×:実施できず、空:報告待ち)

データの解析可否(○:解析可、△:一部データは解析不可、×:解析に用いず)

備考:解析可否判断根拠

a) 記録鳥類

出現率は全調査サイト数に対してその種が出現したサイトの割合（％）とした。優占度は各サイトで記録された全種の個体数に対するその種の個体数の割合（％）を算出し、それを全サイトで平均した値とした。これらの上位10位までの種を、モニタリングサイト1000第1期（2003～2007年度、本調査は2004年度の越冬期から開始）を踏まえて第2期（2008～2012年度）の傾向と比較した。

b) 森林サイトにおける植生の階層構造と鳥類の種多様度の関係

鳥類データと植生データの両方が得られたものは、森林63サイトであった。これらについて解析を行った。森林サイトにおいて、先に求めた群葉高多様度が高くなるに従って、繁殖期の鳥類の種多様度（BSD）が高くなる傾向があるかを Spearman の順位相関係数と単回帰分析で解析した。鳥類の種多様度は、50m 以内に出現した種とその個体数のデータを用いて計算した。鳥類の種多様度も群葉高多様度と同様に Shannon-Weaver 関数であり、ある種の出現個体数と、全種の出現個体数から求めた（式は群葉高多様度を参照）。

c) 草原サイトにおける環境の構造と鳥類の種多様度の関係

今年度は昨年度の約半数の12サイトしかないため、統計解析を行うにはサンプル数が不十分であると判断し、解析を見送った。

d) 外来種

在来生態系への悪影響が懸念される外来種について、繁殖期における記録地点、生息状況を記載した。なお、解析にあたっては調査回数の不足等で個体数等を用いた解析には不可としたサイトについても、在不在情報では使用可能として、解析に用いた。また、記録地点を前年度または第6回自然環境保全基礎調査の分布域（環境省自然環境局生物多様性センター 2004）と比較した。

2) 記録鳥類

2012年度繁殖期には、合計132種の鳥類が確認された。これは昨年度の138種、一昨年度の153種、さらに前年度の一昨年度の152種よりも少ない値となった。これは解析可能サイト数が63サイト（昨年度76サイト、一昨年度は87サイト）とやや少ない事が出現種数の減少につながった可能性がある。昨年度は一昨年度よりも出現種数が減少し、このときもサイト数の減少がその原因として考えられた。今年度、調査サイト数のさらなる減少とともに出現種数が減少した事で、サイト数が確認種数へ与える影響ありうる事が示唆されたといえよう。森林及び草原における出現率、優占度の上位種をそれぞれ表Ⅲ-3-3～Ⅲ-3-4に示した。第1期の森林における第1期（2004～2007年度）及び現在の第2期（2008年度～2012年度）の出現率の上位10種の順位は、年により種の多少の入れ替わりがある

がほぼ一致していた。第1期～昨年度までの上位10種はウグイス、オオルリ、キジバト、キビタキ、コゲラ、シジュウカラ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ホオジロ、ホトトギス、メジロ、ヤマガラ（五十音順）であった。一部の種の入替わりはあるが、今年度（2013）も傾向はこれまでと同様であった。さらにこれに加えて同率であるものの、イカル、ツツドリが上位10種へランクインした。一昨年度は第2期の開始以降の1位であったウグイスが2位に後退し、長年2～3位であったシジュウカラが1位となる変化がみられた。この変化が継続するかどうかに着目していたが、昨年度は再びウグイスが1位、シジュウカラが2位となった。しかし、今年度は再びシジュウカラがウグイスと同率1位となった。順位の逆転は一昨年度のみとならず、シジュウカラがウグイスへ肉薄している状況が示唆された。このシジュウカラの順位変動は一時的なものではなさそうであることが推察された。今後の長期モニタリングにおいても、こうした最優占種の変動に注意を要する。

草原サイトも今年度（2013）の出現傾向は過去と同様の傾向で畑地・里山の鳥種が上位を占めた。ただし、草原サイトは森林サイトよりも、種の入替わり及び上位10種間の順位の入れ替わりが激しい傾向がある。これは1年当たりの草原サイトの調査地点数が多くないことに起因する変動（測定上の誤差）であろう。また、過年度の植生に関する解析であきらかになったように、調査サイト数の少なさと各サイトの環境が大きく異なることが主な理由となり、年度間の草原サイトの環境のばらつきは非常に大きい。調査年毎に調べた環境が異なれば、出現する鳥種も変わってくるのは自明と言える。草原サイトの出現種については1期5か年のデータの取得を待って解析する事が妥当であり、年度間での比較を行う際には注意を要するだろう。

今年度（2012）の越冬期には合計107種の鳥類が確認された。これは2011年度の137種、2010年度の118種よりも少ない値であった。調査サイト数が昨年度（2011）62サイトの約3/4ほどへ大きく減少した事が種数減少へ影響した可能性がある。ただし、一昨年度（2010）の42サイトよりも僅かに多い。確認種数の年変動や配置の影響も考えられるが、30種もの減少は、サイト数の減少による影響が大きいと考えるのが妥当であろう。次に越冬期の森林における出現率、優占度の上位10種をそれぞれ表Ⅲ-3-5に示した。なお、越冬期の草原サイトは調査サイト数が少ないため、昨年度と同様に算出を見送った。第1期～2011年度の森林サイトの出現率の上位10種は、アオジ、ウグイス、エナガ、カケス、カワラヒワ、キジバト、コゲラ、シジュウカラ、シロハラ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ、ルリビタキ（五十音順）であり、年により多少順位に入れ替わりはあるものの、種構成と順位の傾向は毎年おおむね一致していた。2012年度についても、順位の入替わりはあるが、傾向は第1期と同様であった。ただし、ヤマガラが2位となっており、これは初めてのことである。過去4年間の上位3種は、ヒヨドリ、ハシブトガラス、コゲラで安定しており、4位以下はシジュウカラ、エナガ、ヤマガラであった。ヤマガラは5位か6位で安定していたが、今年は順位上昇が見られた。また、ウソが上位10種にはじめてランクインしていた。繁殖期同様に今後の長期モニタリングにおいて、こうした優占種の

変動に注意を要するといえよう。

表 III-3-3. 2013 年度繁殖期の出現率の上位 10 種

a) 森林 ($n = 63$)

b) 草原 ($n = 12$)

順位	種名	出現率	順位	種名	出現率
1	ウグイス	93.7	1	ウグイス	91.7
1	シジュウカラ	93.7	1	キジバト	91.7
3	コゲラ	90.5	3	ハシブトガラス	83.3
4	ハシブトガラス	87.3	3	ハシボソガラス	83.3
4	ヤマガラ	87.3	3	ヒヨドリ	83.3
6	キビタキ	85.7	6	アオサギ	75.0
6	ヒヨドリ	85.7	6	スズメ	75.0
8	キジバト	76.2	6	ヒバリ	75.0
9	オオルリ	74.6	10	オオヨシキリ	66.7
10	イカル	65.1	10	カッコウ	66.7
10	エナガ	65.1	10	カワラヒワ	66.7
10	ツツドリ	65.1	10	ツバメ	66.7

表 III-3-4. 2013 年度繁殖期の優占度の上位 10 種

a) 森林 ($n = 63$)

b) 草原 ($n = 12$)

順位	種名	平均優占度	順位	種名	平均優占度
1	ヒヨドリ	12.1	1	スズメ	10.5
2	ウグイス	6.0	2	ムクドリ	8.1
3	シジュウカラ	5.6	3	ウグイス	7.7
4	ヤマガラ	4.8	4	ツバメ	7.2
5	キビタキ	4.8	5	ヒバリ	6.0
6	メジロ	4.7	6	オオヨシキリ	5.9
7	エナガ	4.4	7	ホオジロ	4.6
8	ヒガラ	3.8	8	カワラヒワ	3.5
9	コゲラ	3.7	9	キジバト	3.1
10	ハシブトガラス	2.9	10	ハシブトガラス	2.9

表Ⅲ-3-5. 2012 年度越冬期の出現率と優占度の上位 10 種

a) 森林 出現率 ($n = 48$)b) 森林 優占度 ($n = 48$)

順位	種名	出現率	順位	種名	平均優占度
1	ヒヨドリ	93.8	1	ヒヨドリ	12.6
2	ヤマガラ	87.5	2	エナガ	8.3
3	ハシブトガラス	85.4	3	シジュウカラ	7.8
4	コゲラ	81.3	4	メジロ	7.8
5	シジュウカラ	79.2	5	ヒガラ	5.0
6	メジロ	68.8	6	ハシブトガラス	4.2
7	シロハラ	66.7	7	ヤマガラ	4.0
8	ウグイス	62.5	8	カケス	3.1
9	ウソ	58.3	9	コゲラ	3.0
10	コゲラ	58.3	10	ウソ	3.0


3) 植生の階層構造と鳥類の種多様度の関係

a) 森林サイトにおける植生の階層構造と鳥類の種多様度の関係（繁殖期）

森林 61 で群葉高多様度と鳥類の種多様度の両方が算出できた（群葉高多様度： 1.41 ± 0.12 SD、鳥類の種多様度： 2.69 ± 0.35 SD）。鳥類の種多様度と群葉高多様度の間に有意な関係が認められた（ $P = 0.048$ 、 $r = 0.25$ 、図Ⅲ-3-1）。これは、昨年度とは異なるが、一昨年度および前年度の結果と同一である。相関が検出された過去 2 年間では、群葉高多様度が高くなるに従って鳥類の種多様度が有意に高くなる傾向があった。今年度は傾向が検出された過年度と同様に単回帰分析を用いた場合でも、両者の相関関係が検出された。ただし、その決定係数の値は小さく、回帰式の説明力は弱かった。この点も、過年度と同様の結果であった。

一般に、群葉高多様度と鳥類の種多様度の関係は誤差が大きく、回帰直線の当てはまりがよいものではないと考えられる。本調査は群葉高多様度を階級による粗いデータから求めていることから、その誤差が大きくなりやすい。このような状況は、サンプル数不足や森林サイトの環境選択の影響を受けやすい。こうしたデータであるにも関わらず過年度の 2 年間では両者の関係が検出できていたが、昨年度は相反する結果となっていた。今年度は再び両者の相関関係が検出された。今年度は解析に用いることが出来た森林サイト数が過年度よりも少なかったが、解析サイト数は昨年度の 63 と同等であり、解析には必要な数を満たしている。それ以前の 2 年間でも両者間に関係が認められていたこと、第 2 期全体を通した解析でも、両者の相関関係が検出されていることから、昨年度は傾向が弱まっていたが、今年度は例年通りの状態に戻ったと解釈することが妥当である可能性がある。このような長期的な視点に基づく年間変動の検討には、今後の調査データを合わせて引き続

きの検討が必要であろう。



図Ⅲ-3-1. 森林サイトの群葉高多様度と鳥類の種多様度の関係

b) 森林サイトにおける植生のタイプと鳥類の種多様度の関係（繁殖期）

森林61で優占する森林タイプと鳥類の種多様度の関係について検討可能なデータを得た。ここでは特に、落葉広葉樹と常緑広葉樹について検討する。過年度における樹種カテゴリの主成分分析の結果を受けて、落葉広葉樹と常緑広葉樹は反比例の関係にあるといえる。そこでここでは、落葉広葉樹と常緑広葉樹の比（第1位が落葉広葉樹のプロット数／（第1位が落葉広葉樹のプロット数＋常緑広葉樹のプロット数））と鳥類の多様度がどのような関係をもつかを検討した。この比はいわば、調査サイトが落葉広葉樹的か常緑広葉樹的なのかという森林タイプの傾向を示す。落葉広葉樹のスコア（プロット数）、常緑広葉樹のスコア（プロット数）および両者の交互作用項を説明変数とし、鳥類の多様度を応答変数とした重回帰分析の結果、このモデルは有意ではなかった（重回帰モデル：df= 57、 $F = 2.29$ 、調整済 $R^2 = 0.06$ 、 $P = 0.088$ 、図Ⅲ-3-2a）。変数選択の結果、鳥類の多様度は落葉広葉樹のスコアのみを説明変数としたモデルで説明されたが説明力は弱かった（単回帰モデル：df= 59、 $F = 4.86$ 、調整済 $R^2 = 0.06$ 、 $P = 0.031$ 、図Ⅲ-3-2b）。説明変数ある落葉広葉樹のプロット数については、常緑広葉樹のスコアに関連せずに単独で、落葉広葉樹が多いほど鳥類の多様度が高かった（落葉広葉樹の効果：傾き 2.51、 $P < 0.01$ 、図Ⅲ-3-2b）。このことから落葉広葉樹の量が、鳥類の多様度へ影響することが示唆された。




図 III-3-2a. 森林サイトの群葉高多様度と鳥類の種多様度の関係




図 III-3-2b. 森林サイトの落葉広葉樹のスコアと鳥類の種多様度の関係

c) 草原サイトにおける環境の構造と鳥類の種多様度の関係 (繁殖期)

草原 12 サイトで環境の多様度と鳥類の種多様度の両方が算出できたが、サイト数が極めて少なく統計解析に十分なサンプル数を確保できていないことから、両者の関係の検討を見送った。

草原サイトは例年調査サイト数が少なく、かつ、森林サイトに比べて値の分散も大きい (詳細前述)。また、前述の通り本調査の被度データは精度が粗い階級値となっている。これらよりデータの誤差が非常に大きく、変数間の関係を検討することが難しいデータといえよう。単年度では難しいため、第2期調査を通した5か年全体を通して解析を行うことが妥当である。よって本件については、第2期報告書を参照されたい。

4) 外来種

外来種は、コジュケイ、コブハクチョウ、ドバト、ガビチョウ、ソウシチョウが記録された。なお、これら外来種のうちコブハクチョウは千葉県の1サイト手賀沼のみ、ドバトは2サイト千葉県の手賀沼と北海道の興部のみで記録された。ただし、両種とも日本国内の各地で見られる種であるが、森林は本来の生息地でないため偶発的に記録されたものと考えられる。ドバトについては、草原サイトに生息する可能性があるが、調査者が記録していないケースもありうるかもしれない。

第1期報告書では、コジュケイ、ガビチョウ、ソウシチョウの3種のモニタリングの必要性が指摘されている。ガビチョウとソウシチョウについては、在来生態系に特に大きな影響を及ぼすおそれがあるとして、外来生物法で特定外来生物に指定されているので、特に動向に注意する必要がある。

2013 年度繁殖期に上記の外来種3種が記録されたサイトは以下のとおりである。コジュケイは草原サイトでは滋賀県と千葉県の2サイト、森林サイトでは、宮崎県、鹿児島県(2)、香川県、高知県、佐賀県、大分県、和歌山県、岐阜県、奈良県、京都府、愛知県(2)、茨城県、栃木県、福島県(2)の計17サイト、合計18サイトで記録された。これは2011、2012年度の19サイトより微減であった(図Ⅲ-3-4)。コジュケイの記録サイトは、昨年度までの調査結果と第6回自然環境保全基礎調査(環境省自然環境局生物多様性センター2004)で確認された分布との大きな変化は認められておらず、本年度も昨年度と同様の状況が続いているか、本年度の調査サイト数が昨年度よりも減少しているため微増の可能性もあるものと考えられた。ガビチョウは草原サイトでは記録はなく、森林サイトで熊本県、群馬県、神奈川県、大分県、福岡県、福島県(2)の7サイト、よって森林・草原で合計7サイトで記録された。これは昨年度の8サイトからは微減であった(図Ⅲ-3-4)。これもコジュケイ同様に本稿における調査サイト数は繁殖期、越冬期ともに昨年よりも減少しているため、横ばいか微増と解釈するのが妥当と考えられる。ソウシチョウの草原サイトでの確認は2012年に初めて5サイトで確認されたが、今年度も徳島県にて確認された。森林サイトでは熊本県、鹿児島県、広島県、香川県、佐賀県、和歌山県、大分県、兵庫県、奈良県、愛知県、茨城県、福島県の計12サイト、合計13サイトで記録された。これは昨年度の合計15サイト(森林13、草原2サイト)よりも微減であった。ソウシチョウの個体数は、第1期と比較して第2期に入ってから毎年、出現地点数及び優占度の増加傾向が続いている。今年度は前述の通り調査サイト数が草原、森林ともに減少したが確認サイト数が微減であったことから、ソウシチョウの規模は昨年度と同等を維持しているか微増と考えられる。また、一昨年度に初確認された草原サイトでの確認が続いている事に、今後も注意を要するだろう。

一般サイト調査において、各サイトの調査は5年に1回の頻度で行われる。ゆえに、本年度の調査サイトはすべて昨年度の調査サイトと入れ替わっている。それにもかかわらず、本年度の調査結果は、昨年度と同等(またはそれ以上)にこれら3種の外来種が記録され

た。もし国内の一部地域のみこれら3種が定着しているのであれば、地点の入れ替えにより、検出されるサイト数が年ごとに大きく変化すると予想される。だが、いずれの外来種も昨年の結果を下回ることにはなかった。日本への移入時期が比較的古いコジュケイについては、過去との比較から本年度についても同程度の規模を維持していると推察される。一方、日本国内への加入が比較的新しい外来種であるソウシチョウとガビチョウは、年々、その規模を維持、拡大している傾向がうかがえる。また、調査地点の入れ替えがあっても変わらずに各地で確認されていることから、これら加入の新しい外来種が、既に全国規模で広域に定着している可能性が推察され、その確度を増したといえよう。過去の調査では確認されていない地域へのさらなる分布の拡大が懸念される。こうした外来種の個体数増加と分布の拡大は、生息環境が似通った在来種、例えばソウシチョウではウグイスなど、在来種への影響（江口・天野 2008）が懸念されており、引き続き継続的なモニタリングが重要となろう。




図 III-3-4. 2013 年度繁殖期における外来種 3 種の記録地点体数

5) 分布域の高緯度への移動

近年、大規模気候変動などに伴う生物の分布の変化と北上が懸念されている。鳥類においても、亜種リュウキュウサンショウクイで分布の変化が捉えうる可能性がある（三上・植田 2011）。本年度の調査において、亜種リュウキュウサンショウクイは、昨年度と同様に草原サイトでは記録されていなかった。森林サイトでは愛知県（2）、沖縄県、熊本県、佐賀県、鹿児島県の計6サイトで記録された。過去の記録数を見ると6→4→8と変化している。調査サイト数の減少を考慮すると昨年と同規模を維持していると考えられる。分布については、毎年九州南部にて記録があり、これは今年度も維持された。一昨年度、昨年度に記録のあった九州北部であるが、今年度は記録が無かった。過去3年間で記録された地域は、沖縄県・熊本県・鹿児島県・福岡県、高知県であったが、今年度は新たに佐賀県、愛知県で記録された。過年度に新たに記録された福岡県と合わせても、北上および分布の拡大傾向が続いている可能性がありうる。その傾向について、今後も継続観察の必要性があろう。

引用文献

- 江口和洋・天野一葉, 2008. ソウシチョウの間接効果によるウグイスの繁殖成功の低下. 日本鳥学会誌, 57(1): 3-10.
- Hino, T., 1985. Relationships between bird community and habitat structure in shelterbelts of Hokkaido, Japan. *Oecologia*, 65: 442-448.
- MacArthur, R.H. and MacArthur, J.W., 1961. On Bird Species Diversity. *Ecology* 42: 594-598.
- 三上かつら・植田睦之, 2011. 西日本におけるリュウキュウサンショウクイの分布拡大. *Bird Research*, 7: A33-A44.
- 村井英紀・樋口広芳, 1988. 森林性鳥類の多様性に影響する諸要因. *Strix*, 7: 83-100.
- Recher, H. F., 1969 Bird species diversity and habitat diversity in Australia and North America. *American Naturalist*, 103: 75-80.
- 環境省自然環境局生物多様性センター, 2004. 種の多様性調査. 鳥類繁殖分布調査報告書, 263-270.

Ⅳ 調査マニュアル（平成 25（2013）年度調査版）

※本頁以降の頁番号は、資料オリジナルの頁番号となっている。

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査

コアサイト設定・毎木調査マニュアル

Ver.2 2010 年 10 月 改訂

Ver.1 2004 年 7 月 作成

環境省 自然環境局
生物多様性センター

Ver. 1 作成
新山 馨(森林総合研究所)
柴田 銃江(森林総合研究所)

Ver. 2 改訂・連絡先
財団法人 自然環境研究センター

はじめに

この文章は、モニタリングサイト1000 森林・草原調査のうち、コアサイト内のプロット設定および毎木調査のためのマニュアルです。すでに調査区を設定している方は、このマニュアルを参考にし、調査区の設定や調査方法を再検討してください。ここに書かれたやり方がすべて最善ではありません。追加すべき事項もまだあります。皆さんの意見を取り入れてよりよいものにしたいと思います。しかし、長期のモニタリングのためには、個々のサイトの都合や個人の好みを超えて統一的に行う必要があることもご理解ください。皆様のご協力をお願いします。

目次

1. 調査の目的と意義
2. 基本設計
3. 測量
 - 3.1 面積と形状
 - 3.2 測量方法
 - 3.3 GPS 情報の記録
4. 毎木調査
 - 4.1 初回の毎木調査方法
 - 4.2 初回の毎木調査の入力形式の例
 - 4.3 2回目以降の再測定の毎木調査の方法
 - 4.4 調査道具
 - 4.5 ファイル形式
 - 4.6 データ入力上のお願い
5. 景観写真の撮影
6. 調査区情報の記載
7. 個人情報の取り扱いについて

1. 調査の目的と意義

毎木調査によって、その森林の**種組成や構造、バイオマス**がわかります。これらのデータは、炭素蓄積量の把握だけでなく、森林の状態と水源かん養力との関係や、森林に依存する生物との関係などを科学的に明らかにする上でとても重要です。調査を継続することによって、それらの経年変動も明らかになります。さらに、個々の樹種について、幹や株の生死や成長を追跡することで、**構成樹種の個体群動態**を推測する重要なデータが得られます。

2. 基本設計

- ・コアプロットの面積は原則的に1ヘクタール（100 m × 100 m）として下さい（図1）。
- ・コアプロット全域で測量し、水平距離で10mごとに杭を打ってください。
- ・落葉落枝・落下種子調査（リター・シードトラップ調査）を実施する場合は、この1ヘクタールの中に25個のリター・シードトラップを設置してください（落葉落枝・落下種子調査マニュアル参照）。20m方形区にトラップ1個の密度です。
- ・胸高周囲長15cm以上のすべての樹木にアルミタグをつけ、毎年、胸高周囲長を測定してください（図2）。

3. 測量

3.1 面積と形状

他のコアプロットと比較しやすくするため、面積や形状は、1ヘクタール（100 m × 100 m）としてください。

3.2 測量方法

測量は簡易コンパス（牛方トランジットコンパス）以上の精度のもので測量し、必ず水平距離で10mごとに杭を打ってください。起点を（0,0）とし、杭には（10,30）のようにメートル単位のX,Y座標を黒マジックか黒ペンキで描いてください（図1左）。この際、起点からY軸方向を向いて右側にむかってX軸が出るようにしてください（図1右のようにならないようにする）。

また、図1のような調査区の形状および座標の取り方を示した図を作成してください。特に、形状が100 m × 100 mではない場合や、座標の取り方が特殊な場合は必ず作成してください。作成した図は、毎木調査データとともにネットワークセンターに提出してください。

3.3 GPS 情報の記録

プロットの4隅の緯度・経度（世界測地系（WGS84））を同一のGPSで計測・記録してください（任意事項）。

4. 毎木調査

毎木調査は、最初の毎木調査と 2 回目以降の毎木調査に分けて記述しています。使う台帳の様式に一部、違いがあるのでご注意ください。毎木に使用するアルミタグ（図 3）とスチールメジャー（図 4）、ステンレス釘（図 5）、ステンレス針金はネットワークセンターがまとめて購入し、各サイトに送付します。その他の必要な消耗品は各サイトで購入するか、既存のものをお使いください。

4.1 初回の毎木調査方法

- ・ 毎木調査は 10m×10m の方形区を単位として行います。
- ・ 胸高周囲長が 15cm 以上のすべての幹を対象に測定を行います。胸高直径 5 cm を下限とすると胸高周囲長では 15.7cm が下限になりますが、測定誤差と簡便さを考え**胸高周囲長 15cm** を下限とします。
- ・ まずステンレスの釘を打ち、アルミのタグをステンレスの針金でステンレスの釘からつり下げます。このときアルミタグの下端が、幹の山側から見て、胸高（1.3m）になることが重要です（図 6）。ただし、高積雪地などではステンレス針金でアルミタグをつり下げる方法は不適です。その場所の環境条件にあった方法で樹木番号付けをすることをおすすめします。風が強く、タグの磨り減りが激しいサイトではアルミのハトメをタグの穴にかぶせて補強する方法もあります（図 3 右）。
- ・ このアルミタグの下端（胸高 1.3m）の周囲長をスチールメジャー（タジマ、エンジニアポケット 10m）で mm 単位まで測定し、記録します。**直径巻き尺や輪尺は決して使わないでください。**このスチールメジャーは始点の 0 が先端から約 10cm の位置から始まるので、木に巻きつけたときに 0 ラインの上で胸高周囲長の値を正確に読むことができます（図 7）。ただし、0 ラインの下では正確に値が読めないの、メジャーを交差させたときの 2 本のメジャーの上下関係に注意してください（図 8）。誤差の原因になるはげ落ちやすい樹皮やこけなどは簡単に手や金槌でこそげ落としてから、周囲長を測定してください。測定後、必ず測定位置に赤スプレーで半周ほど、細いラインを吹き付けてください（図 7）。太い木（周囲長 100 cm）や変形した幹、こぶや枝分かれで 1.3m よりずれて測定した場合は特に赤スプレーを忘れずに測定位置に吹き付けてください。
- ・ 樹種の同定をして、胸高周囲長とともに調査台帳に記入します。樹種の同定が難しいときは必ず標本を採って同定し、標本は保存してください。
- ・ 幹の根元位置の 10m 方形区内での X、Y 座標を、(3.1m, 2.6m) のように測定し（できるだけ正確に）、台帳に記入しておきます。地形が複雑な場合は、普通の 50m 巻き尺を X 軸方向に 10m 分引いておくと、幹の位置の確認が容易になります。
- ・ 毎木調査の現地での測定単位は個体ではなく幹です。したがって、株立個体のように、同じ個体に胸高周囲長が 15cm 以上の幹が複数ある場合は、それらすべてにアルミタグをつけ胸高周囲長を測定します。そして、それらの幹が同一の個体由来であることを示すため、**「個体のタグ番号」欄に、その株を代表する番号を記入します。**例えば、下記の初回毎木用台帳（表 1）の A3、A4、A5 のコシアブラの場合、それぞれの幹の「個体のタグ番号」欄に、A3、A3、A3 というように記入します。念のため、調査台帳の備考欄に“A3 と同株”のように、必ず同株であることのコメントを記入し

て下さい。

- ・ツルが巻き付いていて、ツル込みでしか胸高周囲長が測定できないときは、備考に必ず“ツル込み”と、コメントを書いてください。
- ・斜めになった幹、倒れた幹でも生きている場合は、根元位置から 1.3m で同じように測定して（図 6）、タグを付けてください。その際は備考欄に“斜め”や“倒れ”等のコメントを忘れずに記入してください。

4.2 初回の毎木調査の入力形式の例

表 1 初回毎木用台帳

							日付	調査者	
10m 方形区 X 座標	10m 方形区 Y 座標	幹タグ番号	個体タグ番号	幹の X	幹の Y	種名	胸高周囲長 (cm)	備考	調査日
0	0	A1		3	2	ブナ	130.7	ツル込み	20040514
10	10	A2		8	7	ミズナラ	89.3		20040514
10	10	A3	A3	0	8.5	コシアブラ	19.2	A3 と同株	20040514
10	10	A4	A3	0	8.5	コシアブラ	25	A3 と同株	20040514
10	10	A5	A3	0	8.5	コシアブラ	33.6	A3 と同株	20040514
10	20	A6		3	5.5	イタヤカエデ	48.9		20040514
10	20	A7		4	4	ブナ	189	幹半枯れ	20040514
10	20	A8	A8	8	1	イヌブナ	45.3	A8 と同株	20040514
10	20	A9	A8	3	2	イヌブナ	56.2	A8 と同株	20040514

ここでいう 10m 方形区の XY 座標は、10m 方形区の左下（起点に近い角）の XY 座標で各 10m 方形区を表しています。したがって (0, 0) から (90, 90) まで 100 個の 10m 方形区を調査することになります（10m×10m の方形区の XY 座標は必ず 0 から 90 までになるようにしてください。10 から 100 までにはしないでください）。同株の場合は例にあるように A3 の幹にも“A3 と同株”と記入します。これがないと後で個体数の集計が難しくなるので注意してください。備考欄には、虫食いと、先折れとか、気がついたことは何でも記入しておいてください（4.6 データ入力上のお願いも参照）。特に測定値に影響を与えるツルに関するコメント（ツル抜きで測定したのかツル込みでしたのか等）と幹の空洞や樹皮の枯れ落ちの情報を書いておいてください。また、測定部位に限らず、**シカ等による樹皮はぎの跡が見られた場合には、必ず記録してください**（単に食害とせず、樹皮はぎと枝葉食害は区別してください）。

4.3 2 回目以降の再測定の毎木調査の方法

2 回目以降はすでにアルミタグが付いているはずなので、初回と同様に 10m 方形区ごとに胸高周囲長をスチールメジャーで mm 単位まで測定します。このときは前回つけた赤スプレートのラインを目印

にします。用紙は前回の測定値が入った再測定用の用紙を使います。新しく胸高周囲長が 15cm 以上になった幹には新規にアルミタグをつけます。新規加入個体（幹）は、欄外に記入するか、初回毎木と同じ用紙を用意して記入するなど、やりやすい方法で記録してください。新規加入個体の確認は必ず 10m 方形区単位で行い、確認後、次の 10m 方形区に移動してください。

新規加入個体の出現した 10m 方形区の XY 座標と新規個体の XY 座標記載がないと次回の毎木調査で個体位置がわからなくなるので、記載漏れのないように注意ください。

アルミタグが紛失したときは、新しいタグを付け、必ずタグの欄と備考欄に記入しておきます。また、アルミタグの穴が釘や針金と擦れてすり減ってきた場合などは、一斉にタグを付け替えてください。釘が埋まってきた場合は、可能であれば抜いて打ち直してください。必要な資材はネットワークセンターから送付しますので、ネットワークセンターまでご連絡ください。

台帳記入者は常に前回の周囲長測定値と新しい測定値を比較し、異常値がでないよう、その場でチェックしてください。

備考には、幹半枯れ、幹 5 m で折れ、のように測定値に影響する事象のコメントも書いてください。死亡を確認した年には死亡要因を分かる範囲で記載してください。胸高以上の高い位置での折れ（もしくは伐採）があった場合は、それより下の幹の死亡が確認されるまで測定を継続してください。胸高より低い位置での折れは死亡としてください。その後、萌芽によって生じた新たな幹が胸高周囲長 15cm になった際には、新規加入としてください。

表 2 再測定用毎木台帳

10 m 方形区 X 座標	10 m 方形区 Y 座標	幹タグ番号	個体タグ番号	幹の X	幹の Y	種名	前回の胸高周囲長 (cm)	胸高周囲長 (cm)	前回の備考	備考	調査日
0	0	A1		3	2	ブナ	130.7	131.0	ツル込み		
10	10	A2		8	7	ミズナラ	89.3	90.8			
10	10	A3	A3	0	8.5	コシアブラ	19.2	20.4	A3 と同株		
10	10	A4	A3	0	8.5	コシアブラ	25		A3 と同株		
10	10	A5	A3	0	8.5	コシアブラ	33.6		A3 と同株		
10	20	A6		3	5.5	イタヤカエデ	48.9				
10	20	A7		4	4	ブナ	189		幹半枯れ		
10	20	A8	A8	8	1	イヌブナ	45.3		A8 と同株		
10	20	A9	A8	3	2	イヌブナ	56.2		A8 と同株		

4.4 調査道具

台帳(A4)、台帳台、鉛筆（必ず鉛筆かシャープペンでBより濃い芯を使用。ボールペン、フェルトペン等は不可）、金槌、ステンレス釘、ステンレス針金、アルミタグ、大工袋、スチールメジャー（タジマ、エンジニアポケット 10m）、赤スプレー、巻き尺（20m～50m）

推奨する製品・仕様

- ・スチールメジャー：タジマ、エンジニアポケット 10m (EPK-10)、 図 4。必ずこれを使ってください！
- ・台帳台：PLUS A 用箋挟 A4 蓋付き 同等品可

- ・ステンレス釘：ステンレス スクリング 平 #12 × 50mm (図 5) 同等品可
- ・ステンレス針金：直径 0.56mm 前後 アルミタグ一枚に約 24cm の長さが必用 (図 3)
- ・アルミタグ：Racetrack Aluminum Tags, Numbered Tags 1-1000, ForestrySupplies Inc. (図 3)
同等品可 注：刻印機で数字の前にアルファベットを入れる

上記の資材は、ネットワークセンターが発注し、各サイトに送付いたします。各サイトですでに使用しているものがあれば、無理に替える必要はありません。また、上記以外の製品・仕様で、よりよいものがあればネットワークセンターまでご提案ください。

4.5 ファイル形式

Excel、ACCESS ファイルなどの、基本的にカンマ区切りの csv 形式に変換できるファイルで管理してください。できればネットワークセンター指定の Excel ファイルに入力してください。

4.6 データ入力上のお願い

モニタリングサイト 1000 のデータは、長期間・多数のサイトでデータを収集し、得られたデータを公開して分析していくことを目的にしています。そのため、50 年、100 年後に誰が見ても意味が理解でき、可能な限り同じルールでデータが入力されている必要があります。

そこで、データの入力にあたっては可能な限り以下の点をお守りください (次ページ表 3 参照)。(各サイトで長年使われているルールがある場合はこの限りではありませんが、その旨をネットワークセンターに分かるようにお示し下さい。)

- ・まず、必ず入力ミスがないかどうかを確認。入力ミスを減らすためにも過去のデータの横に当年データを入力する。
- ・測定ミスと思われるもの (Gbh が昨年よりも大きく増加もしくは減少したもの) については備考欄に「測定エラーの可能性あり」と記入 (それにより入力ミスとも区別できる)。
- ・測定もれの個体は Gbh に「nd」と入力。
- ・死亡個体は死亡時の Gbh に「d」と入力。
- ・以前ツル抜きであったがツル込みで計測した場合はデータの頭に「vi」をつけて数値を記入 (例 vi36.7)。
- ・以前ツル込みであったがツル抜きで計測した場合はデータの頭に「vn」をつけて数値を記入。
- ・完全に種が同定できていない場合は、種名欄には「未同定」と記入し、補足事項 (落葉樹 or 常緑樹)、高次分類群 (科名・属名)、候補種などは備考欄に記入。
- ・以下の事象に該当するものは、なるべく以下と同じ表現 (漢字・かな) で記載。
幹折れ、立ち枯れ、根返り、樹皮はぎ、枝葉摂食、虫食い、先折れ、ツル込み、〇〇と同株、斜め、倒れ、付け替え (元〇〇〇)
- ・タグを一斉に付け替えた場合は、古いタグ番号の列は残すなど、必ず付け替える前のタグが分かるようにする。
- ・調査記録を記載 (データとは別のシート、表 4)。その他、いつ、どこで、誰が、何の目的で、どのような方法で、何を測定したかをできる限り確実に記録 (全くの他人に 50 年後に記録を残すつもりで、誰にでも分かるように)。
- ・「樹皮はぎ」の記録精度 (基準) に関しては、調査記録にどの程度の精度で記録したかを記入 (表 4)。「樹皮はぎ」が確認されなかった場合も、その旨を記録。

表3 データ入力例

10m 方形 区X座 標	10m 方形 区Y座 標	幹タグ 番号	個体 タグ番 号	幹のx 座標	幹のy 座標	種名	胸高周囲長[cm]			備考			調査日		
							2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
mesh_ xcord	mesh_ ycord	tag_no	indv_no	stem_ xcord	stem_ ycord	spc_japan	gbh08	gbh09	gbh10	note08	note09	note10	s_date08	s_date09	s_date10
0	0	A12	A12	3.4	5.3	シナノキ	38	37.8	37.9	na	na	na	20071106	20081201	20091016
0	0	A25	A25	6.5	9.6	アオダモ	na	15.1	15.5	na	新規	na	20071106	20081201	20091016
0	0	A23	A23	7.5	6.3	ハシドイ	16.2	d	na	na	幹折れ	na	20071106	20081201	20091016
0	10	A4	A4	4.1	2.3	アサダ	16.3	16.3	26.5	na	na	測定エラーの可能性あり	20071106	20081201	20091016
0	10	A20	A20	8.6	5.4	アオダモ	82.6	82.7	nd	na	na	測定もれ	20071106	20081201	20091016
0	10	A24	A24	9.1	8.2	シナノキ	15.5	15.7	d	na	na	立ち枯れ	20071106	20081201	20091016
0	20	A30	A30	5.5	14.6	ハルニレ	41.1	41.3	41.6	na	na	樹皮はぎ	20071106	20081201	20091016
0	20	A31	A31	1.1	18.6	サワシバ	48.7	48.8	48.5	傾き	傾き	傾き	20071106	20081201	20091016
0	30	A33	A33	1.2	9.7	ハルニレ	20	20.1	20.1	na	根返り	倒れ	20071106	20081201	20091016
0	30	A11	A11	9.7	9.0	ハルニレ	34.1	vi36.7	36.6	na	ツル込み	ツル込み	20071106	20081201	20091016
10	0	A14	A14	6.5	9.6	アオダモ	46.3	46.3	vn44.4	ツル込み	ツル込み	ツル抜き	20071106	20081201	20091016
10	10	A5824	A5824	4.0	9.6	ハルニレ	24.6	25.6	25.6	na	na	付け替え(元A8)	20071106	20081201	20091016
10	10	A17	A18	20.3	2.9	ハシドイ	16	16	16.2	A18と同株	A18と同株	A18と同株	20071106	20081201	20091016
10	10	A18	A18	20.3	2.9	ハシドイ	47.2	47.5	47.4	A18と同株	A18と同株	A18と同株	20071106	20081201	20091016
10	20	A27	A27	4.9	12.4	未同定	12.8	13	13	落葉樹?	落葉樹?	落葉樹?	20071106	20081201	20091016
10	20	A9	A9	4.1	9.0	アサダ	25.1	25.2	25.1	na	na	ハルニレよりアサダに樹種変更	20071106	20081201	20091016
10	20	A28	A28	4.4	12.0	シナノキ	18.4	19	19.1	na	na	na	20071106	20081201	20091016

表4 調査記録入力例

年度	調査開始日	調査終了日	調査者氏名	樹皮はぎ調査の精度・基準	特記事項	備考
2007	20071120	20071121	モニ太郎	樹皮はぎは調査していない。		
2008	20081127	20081130	モニ太郎、モニ花子	幅 4cm 以上の樹皮はぎの有無を確認したが、樹皮はぎは観察されず。	20081030 に台風が通過	
2009	20091125	20091128	モニ太郎、モニ花子	幅 4cm 以上の樹皮はぎの有無を記録。	2009 年夏、マイマイガが大発生	

5. 景観写真の撮影

長期的なモニタリングのために、可能な限り景観写真を撮ってください（任意事項）。撮影頻度は各サイトにお任せしますが、年1回同じ時期での撮影が推奨されます。展葉期、落葉期など年複数回撮影していただいても結構です。景観の変化が分かるように、必ず定点で、同じ向きで撮影してください。定点以外の写真を加えていただいてもかまいません。

推奨される撮影方法：

プロットの4隅それぞれから、水平にプロットの内側を撮影、真上方向に林冠を撮影。

撮影した写真はネットワークセンターにお送りください（任意）。CD, DVDなどで郵送していただくか、ウェブ上のファイルアップロードサービスなどをご利用ください。写真のファイル名および撮影者、撮影日、撮影位置（座標）、撮影方向、公開の可否（※注参照）、などのリストを作り、readme ファイル(csv 形式推奨)としてお送りください。その他、著作権や公開についての留意事項、利用する際の記述方法などもそのファイルに記入してください。なお、撮影者の方がご自身の調査等で写真を利用される場合にも、できるだけ利用目的をネットワークセンターまでご連絡ください。

（※注）

環境省が撮影者の方からご提供いただいた写真を公開（使用）する時には、なるべく事前に撮影者の方へ連絡をして承諾をいただく予定であり、かつ撮影者名も明記する予定ですが、諸事情により、そのようにできない可能性もあります。ですので、「公開」については、以下の1～6のいずれであるかを Readme ファイルでご回答下さい（次ページ「7. 個人情報の取り扱いについて」も併せてご参照下さい）。

事前連絡は、	撮影者名(キャシュ)は、	「公開」の種類番号
事前連絡なく使用しても構わない	入れずに公開しても良い	1
	必ず伏せる(明記してはいけない)	2
	必ず明記が必要	3
事前連絡は必ず必要	入れずに公開しても良い	4
	必ず伏せる(明記してはいけない)	5
	必ず明記が必要	6

Readme ファイルの例

#調査地名	苫小牧・成熟林				
ファイル名	撮影者	撮影日	撮影位置	撮影方向	公開
F0001. jpg	モニ太郎	20101015	(0, 0)	水平 45°	1
F0002. jpg	モニ太郎	20101015	(0, 100)	水平 135°	3
F0003. jpg	モニ太郎	20101015	(100, 100)	水平 225°	4
F0004. jpg	モニ太郎	20101015	(100, 0)	水平 315°	5
F0005. jpg	モニ太郎	20101015	(50, 50)	真上	6

6. 調査区情報の記載

調査区設定の際には、以下のような調査区情報の記載をお願いします。

サイト名：苫小牧

調査区名：苫小牧成熟林

緯度（世界測地系 WGS84）：42.7111

経度（世界測地系 WGS84）：141.5664

3 次メッシュコード（世界測地系 WGS84）：6441-0455

3 次メッシュコード N（旧測地系）：6441-0455

都道府県：北海道

支庁名：胆振支庁

標高：80 m

面積：1 ha

形状：100 m x 100 m

現地調査主体：北海道大学 苫小牧研究林

サイト代表者：日浦勉

調査開始年度：2004

調査サイトタイプ：コアサイト

毎木調査：2004-

リタートラップ：2004-

ピットフォール：2004-

鳥類：2006-

環境データ：プロットから約 500m 離れた地点で、降水量、気温、湿度、日射量、日照時間、地温、
風向、風速


プロットの GPS 測位の有無：無し

その他（国立・国定公園、保護区等の指定の有無など）：

7. 個人情報の取り扱いについて

モニタリングサイト 1000 で得られたデータは原則として公開されることになります。その際、調査者や写真撮影者などの記録も公開される可能性があります。もし個人名の公開に不都合がある場合は、その旨をデータ提出の際に必ず明記してください。

マニュアル



X軸が逆の場合




図1 調査区形状および座標の取り方



図2 アルミタグのつけ方例



図3 アルミタグ

右写真：ハトメで補強する場合の例



図4 スチールメジャー



図5 ステンレス釘




図6 測定位置の決め方




図7 胸高周囲長の測り方



図8 スチールメジャーの読み取り方.
上の写真の場合、37.8cm と読む。

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査
コアサイト設定、毎木調査マニュアル

Ver.2 更新日 2010 年 10 月 (財)自然環境研究センター 改訂
Ver.1 更新日 2004 年 7 月 新山 馨・柴田 銃江(森林総合研究所) 作成

財団法人 自然環境研究センター ネットワークセンター
担当:鈴木智之 (2010 年 10 月現在)
〒053-0035 北海道苫小牧市字高丘
北海道大学苫小牧研究林 内
電話:0144-33-2171 FAX:0144-33-2173
メール:moni1000f_networkcenter@fsc.hokudai.ac.jp

財団法人 自然環境研究センター
担当:鋤柄直純・畠瀬頼子 (2010 年 10 月現在)
〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10
Tel: 03-5824-0969 Fax: 03-5824-0970

環境省 自然環境局 生物多様性センター
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1
電話:0555-72-6033 FAX:0555-72-6035

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査
落葉落枝・落下種子調査マニュアル

Ver.2 2010 年 10 月 改訂

Ver.1 2004 年 7 月 作成

環境省 自然環境局
生物多様性センター

Ver. 1 作成
新山 馨(森林総合研究所)
柴田 銃江(森林総合研究所)

Ver.2 改訂・連絡先
財団法人 自然環境研究センター

はじめに

この文章は、モニタリングサイト 1000 森林・草原調査のうち、落葉落枝・落下種子調査(リター・シードトラップ調査)のためのマニュアルです。「モニタリングサイト 1000 森林コアサイト設定、調査マニュアル ver. 1」の中のリター・シードトラップに関するものと、「モニタリング 1000 森林部門 リター処理簡易マニュアル」を 2010 年に統合したものです。このマニュアルを参考に、リター・シードの処理を行って下さい。**努力目標として、できるだけレベル 2 (P9 の図 5 を参照) までの処理をお願いします。**

目次

1. 調査の目的
2. 調査
 - 2.1 配置
 - 2.2 設置
 - 2.3 回収方法
 - 2.4 分析方法
 - 2.4.1 内容物の 4 項目分別
 - 2.4.2 繁殖器官の分別
3. 調査記録
4. 個人情報の取り扱いについて

1. 調査の目的

リター・シードトラップ調査によって、**落葉落枝量**や**種子生産量**が推定できます。落葉落枝量は、森林の一次生産力の推定には必須です。また、樹種別に種子生産の量や数を測定することで、様々な樹種の豊凶特性などがわかります。これらのデータは、樹木の更新特性を明らかにする上で興味深いものとなります。さらに、種子を餌資源にしている動物の動態や生活史特性を説明するバックグラウンドデータとしても期待できます。

2. 調査

2.1 配置

図1のように1haの毎木調査区内に、20m置きに25個設置します。20m方形区に1個のトラップが基本の密度です。すでに25個以上のリター・シードトラップを設置している調査区は、その中の25個分をモニタリングサイト1000用にしてください。

2.2 設置

写真にあるように（図2）、3本の塩ビパイプを土壤に挿し、銅線を使ってトラップを固定します。トラップには表と裏があります。縫い代がめくれている方が裏ですのでこれが外側（塩ビパイプ側）に来るようにしてください。塩ビパイプには高さの違う2カ所の穴があります（図3）。斜面ではどちらかの穴を利用してトラップの受け取り面が水平になるよう調整して設置ください（図4）。

以下の止め方の指示を守ってください。まず塩ビパイプの穴に銅線を通し、塩ビパイプを中心に左右、同じ長さの銅線にします。トラップの縁の網の部分に、銅線の2つの先端を塩ビパイプの幅だけ離して、2カ所に、**必ず上から**突き刺し、網の下に出します。下から出た2本の銅線を塩ビパイプの外側で2～3回ひねって止めておきます。このとき嚴重に何度もねじると銅線が切れやすくなるのでご注意ください。壊れて交換する場合や、冬季に撤収することを考えて、手ではずしやすいように銅線を使っています。けっしてペンチの必要な太い針金などで固定しないでください。

設置したら、トラップ中にゴルフボールを入れ、風でトラップの網の部分が反転するのを防ぎます。風の強いところではゴルフボールを2個入れてもかまいません。

トラップには大型のビニール製ナンバーテープ等で1～25番の番号をつけます（図4）。ナンバーテープは、トラップの縁のポリエチレンチューブの外枠の部分の網目をつまんで、事務用品のステープラーで2回止めます。トラップの交換の際はこのナンバーテープを取り外して、もう一度使います。

資材が劣化・破損した場合は、サイトの判断で交換してください。必要な資材はネットワークセンターから送付いたしますので、ネットワークセンターまでご連絡ください。

2.3 回収方法

回収から分析の流れは図5を参照してください。

トラップの内容物は、最低でも月に1回、回収します。花や種子の落下時期を押さえるために月2回ないし2週間おきに回収してもかまいません。積雪期間はトラップが壊れますので、トラップの設置日と最終の回収日（トラップの撤収日）は各サイトの判断に任せます。いずれにせよ、トラップの設置日、回収日、最終の回収日（トラップの撤収日）は忘れずに記録しておいてください。

内容物の回収は、紙袋（大昭和製紙サミットバッグ No. 14）を使います。紙袋に調査区名、**回収西暦年月日**、**トラップ番号**を必ず**黒マジック**で（赤や青のマジックは耐候性がないので不可）書いて、

内容物を回収します。風よけに入れたゴルフボール以外、すべて回収します。ミズメの種子など細かな種子があるため、できるだけきれいに回収します。枝も基本的に回収します。トラップにまたがった大枝はトラップの面積にかかるぶんだけ回収します。のこぎりが必要な大枝、持ち帰れないような大枝は回収の対象としません。回収した紙袋は大きなビニール袋に入れて持ち運びます。

持ち帰った紙袋はすぐに廊下や棚に広げて風乾しておくこととサンプルの腐敗を防ぐことができます。サンプルが雨で濡れている場合は、紙袋のふたをあけるか中身を棚などに広げ、ある程度水分が蒸発した時点で、送風乾燥機（30～40℃以下、一昼夜くらい）で乾燥するとよいでしょう。

2.4 分析方法

2.4.1 内容物の4項目分別

乾燥した内容物の風乾重を、一袋分（1トラップ分）ずつ測定します（面倒ですが、作業中サンプルが紛失した場合の保険となります）。その後、白い紙の上に広げ、手で分別します。必ず葉を一枚一枚チェックしながら分別します。

分別項目は最低でも①葉、②枝、③繁殖器官（花や種子とその付随器官）、④その他（芽鱗、樹皮やこけ、昆虫の糞など）の4項目に分けます。まずこの4項目の乾燥重量を測定します。分別した4分画は、**調査区名、日付、トラップ番号、分別項目**を必ず鉛筆か**黒マジック**で書いた茶封筒や回収用紙袋に入れ、個別に風乾重を量ります（0.01g単位）。重さが0.01g未満の場合は0を、測定対象がない場合は-（半角ハイフン）を、欠測値（トラップ破損など）の場合はNA（全項目に）を記入してください（以下同様）。

絶乾重への換算式を作るため、トラップ全てのサンプルを混ぜたのち、一部をサンプリングして送風乾燥機（70℃、72時間）で乾燥させて絶乾重を測ります（0.01g単位）。換算式への努力は各サイトで負担にならない程度で行ってください。季節によって植物の持っている水分含量が違うため、換算式の作成はリター・シードの回収日ごとに行なってください。ただし、繁殖器官はすぐには絶乾せず次項（2.4.2. 繁殖器官の分別）を先に行ってください（絶乾だと花や未熟種子が著しく変色・変形したり、くっついたりして、ソーティング作業が大変になるため）。

全体風乾重と換算式で計算した（もしくは実測した）各項目別の絶乾重を表1のように記入してください。

2.4.2 繁殖器官の分別

繁殖器官のうち種子は、さらに樹種別に分けます。できるだけ主要樹種または毎木出現樹種（図5のレベル2）については分けてください（努力目標）。花や種子をさらに細かな項目（充実、虫害の状態など）に分けるかどうかは各サイトにお任せします。できるだけ、健全種子とそれ以外には分けてください。各樹種の種指数をカウント、送風乾燥機（70℃、72時間）で乾燥し、絶乾重を測ってください。表2はデータシートの記入例です。その他とは、虫食い、しいな、未熟など、健全種子以外を指しています。

分別・測定が終わった繁殖器官のサンプルの一部を、2.4.1の換算式作成のために用います（絶乾重を測定し、表1に記入）。

表1 トラップ別・内容物の4項目分別 (黄色で示したセルは必ず入力)

プロット名	トラップ番号	トラップ面積	開始日	回収日	葉絶乾重(g)	枝絶乾重(g)	種子乾重(g)	繁殖器官乾重(種子+花など)(g)	その他絶乾重(g)	風乾全量(g)	葉風乾重(g)	枝風乾重(g)	種子風乾重(g)	繁殖器官風乾重(g)	その他風乾重(g)	備考
plot	trap_id	trap_area	s_date1	s_date2	wdry_leaf	wdry_branch	wdry_seed	wdry_repro	wdry_other	w_total	w_leaf	w_branch	w_seed	w_repro	w_other	note
苦小牧	1	0.5	20041105	20041112	14.7	0.4	0.03	0.01	0.8							
苦小牧	2	0.5	20041105	20041112	18.2	0.01	0	0.12	-							
苦小牧	3	0.5	20041105	20041112	50.1	0.5	-	0.9	0.9							
	...															
苦小牧	25	0.5	20041105	20041112	NA	NA	NA	NA	NA							トラップ破損
苦小牧	1	0.5	20041112	20041215	20.2	1		1.1	0							
苦小牧	2	0.5	20041112	20041215	11.1	0.7		0.2	0.1							ゴルフボールが外に落ちており、回収物は風で飛ばされた可能性あり
	...															

表2 トラップ別樹種別の健全種子数と乾燥重量

plot	trap_id	trap_area	s_date1	s_date2	spc	number	wdry	status	form	note
プロット名	トラップ番号	トラップ面積	設置日	回収日	種名	数	絶乾重(g)	状態	形	備考
苦小牧	1	0.5	20050629	20050728	ダケカンバ	1	0	健全	種子	
苦小牧	1	0.5	20050629	20050728	イタヤカエデ	1	0.02	虫	種子	
苦小牧	1	0.5	20050629	20050728	ミズナラ	1	0.03	健全	種子	
苦小牧	2	0.5	20051029	20051130	ブナ	1	0.03	未熟	種子	
苦小牧	2	0.5	20051029	20051130	ブナ	1	0.03	しいな	種子	
苦小牧	2	0.5	20051029	20051130	ブナ	NA	0.01	かけら	種子	
苦小牧	2	0.5	20051029	20051130	カツラ	2	0.4	未熟	果実	
苦小牧	2	0.5	20050629	20050728	トドマツ	3	1.5	健全	球果	
苦小牧	2	0.5	20050629	20050728	トドマツ	1	0	不健全	種子	

健全、虫(穴)、未熟、しいな、かけら、不健全、区別なし、のいずれかを
入力

3. 調査記録

表3のような調査記録を記載してください。その他、いつ、どこで、誰が、何の目的で、どのような方法で、何を測定したか（回収したか）を出来る限り確実に記録してください（全くの他人に50年後に記録を残すつもりで、誰にでもわかるように）。

表3 調査記録入力例

年度	調査開始日	調査終了日	調査者氏名	特記事項	備考
2007	20070530	20081130	モニ太郎、モニ花子		
2008	20080501	20081130	モニ太郎、モニ花子	20081030 に台風が通過したためトラップ内容物が飛んだ	

4. 個人情報の取り扱いについて

モニタリングサイト1000で得られたデータは原則として公開されることになります。その際、調査者や写真撮影者などの記録も公開される可能性があります。もし個人名の公開に不都合がある場合は、その旨をデータ提出の際に必ず明記してください。




図1 トラップ配置図



図2 トラップ設置例1

塩ビ支柱の截断と穴開け

- ・長さ1.5m VP16(内径16mm 外径22mm)
- ・片端を地面に差し込みやすいように先端は斜めにカット
- ・もう一方の片端から5cmと25cmのところに、2カ所に直径約0.5cmの穴を開け、鋼線を通せるようにする。
- ・2箇所の穴は直交させるようにする。




図3 支柱用塩ビパイプ



図4 トラップ設置例2




図5 リター・シードの処理(回収から分析)

参考資料

参考資料1 リター・シードトラップネットの材料

品名	規格	トラップ1個に必要な量
寒冷紗	幅1.8m、1mmメッシュ、白色	1m
ミシン糸	ビニロン製ミシン糸	適量
ポリエチレンパイプ(太)(枠用)	長さ2.5m、内径12mm、外径18mm	1本
ポリエチレンパイプ(細)(枠接続用)	長さ0.15m、内径8mm、外径12mm	1本
塩ビパイプ(支柱用)	長さ1.5m、内径16mm、外径22mm	3本
銅線(トラップ固定用)	太さ1mm	0.4m×3本


参考資料2 リター・シードトラップネットの裁断

受け口0.5平方メートルの種子トラップの完成寸法

円直径=79.8cm

円周≒250cm

裁断：幅180cmの寒冷紗を縦半分におり、直径180cmの半円型に裁断。
半円の底部が布端になるようにする。



モニタリングサイト 1000 森林・草原調査
落葉落枝・落下種子調査マニュアル

Ver.2 更新日 2010 年 10 月 (財)自然環境研究センター 改訂

Ver.1 更新日 2004 年 7 月 新山 馨・柴田 銃江(森林総合研究所) 作成

財団法人 自然環境研究センター ネットワークセンター

担当:鈴木智之 (2010 年 10 月現在)

〒053-0035 北海道苫小牧市字高丘

北海道大学苫小牧研究林 内

電話:0144-33-2171 FAX:0144-33-2173

メール:monil000f_networkcenter@fsc.hokudai.ac.jp

財団法人 自然環境研究センター

担当:鋤柄直純・畠瀬頼子 (2010 年 10 月現在)

〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10

Tel: 03-5824-0969 Fax: 03-5824-0970

環境省 自然環境局 生物多様性センター

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1

電話:0555-72-6033 FAX:0555-72-6035

環境省重要生態系監視地域モニタリング推進事業(モニタリングサイト 1000)

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査

地表徘徊性甲虫調査 マニュアル

2010 年 10 月改訂版

環境省 自然環境局
生物多様性センター

財団法人
自然環境研究センター

1. はじめに

昆虫類は地球上の生物多様性の主要な構成要素であり、生態系において重要な機能を担っている。しかしながら、種数が膨大であり、また個体サイズが小さいため、種レベルでの調査には困難が伴う。昆虫類の調査はモニタリングサイト 1000 プロジェクトにおいて不可欠であるが、調査実施には分類群レベルでの検討が可能であると同時に重要な生態系機能を有するグループを対象とする必要がある。そこで、本プロジェクトでは、このようなグループとして地表徘徊性甲虫類を対象とし、ピットフォールトラップによる調査を実施する。ピットフォールトラップは多様な地上徘徊性の無脊椎動物が採集され、そのうち甲虫類では、オサムシ科、シデムシ科、およびハネカクシ科が多い。これらのピットフォールトラップで採取される甲虫類の多くは、飛翔性を失っているため移動範囲が狭く、その地域の林床環境を示す生物として注目されている。したがって、日本全国の甲虫類の多様性をモニタリングする意義は大きい。さらに対象とした甲虫類は温度に対する感受性が高く、寿命が短いため、地球温暖化影響が早期に検出できる生物として位置づけられる。

ピットフォールトラップで採取される地表徘徊性甲虫類は落葉が堆積した森林の林床を生息場所としている。森林生態系では植物の地上部生産量の約 9 割が土壤に供給される分解系の卓越した系である。森林の分解系は、栄養塩のリサイクルシステムとして森林生態系を駆動する、非常に重要な系であり、そのなかで甲虫類は上位の捕食者である。そこで、本調査では、地表徘徊性甲虫類が分解系の一員として、その林床の環境および分解機能に関与すると考え、その相互関係を明らかにするために甲虫の群集調査と同時に非生物的な環境要因および林床の分解機能を測定する。森林の林床に堆積する落葉量は、生物の分解活性と密接な関わりをもっていることから、栄養塩類の蓄積量や循環量を把握するための重要な指標となる。また表層の土壤は生物活性が高く、その有機物量が地表徘徊性甲虫類の餌である土壤動物の餌資源として評価されている。甲虫類は季節によって出現種が異なるため、調査地の地域群集および多様性を評価するために調査は 1 年を通して 4 回行う。環境要因は、落葉堆積量、土壤と落葉の質などを測定する。

補足) このマニュアルは、モニタリングサイト 1000 森林・草原調査の地表徘徊性甲虫調査のためのマニュアルです。ただし、ここにある方法が最善ではなく、この数年で皆様のご意見を取り入れ、簡便かつ長期的に実施できるものにする予定です。さらに意義のあるデータの蓄積のために、甲虫群集動態ならびに環境要因との相互関係の解明の統合によって、将来の長期動態予測を目指しています。

2. 調査方法

2. 1. ピットフォールトラップの設置

ピットフォールトラップ法とは、林床に落とし穴状のトラップを設置し、そこに落ちた動物を採取する方法である。捕獲個体数は動物の生息密度と活動性に依存する。

トラップにはポリプロピレン容器（口径 90mm、深さ 120mm）を用いる。トラップ容器の底面には、あらかじめ直径 1 mm 程度の水抜き穴を、6ヶ所程度開けておく。1 プロットにつき 20 個のトラップ容器を、モニタリングサイト 1000 ネットワークセンター（モニタリングサイト 1000 森林調査（鳥類を除く）のサンプルやデータを扱う部署。北海道大学苫小牧研究林内に設置されている。以下ネットワークセンターという）より送付する。

以下にトラップの設置手順を示す。

1. 各サイトで定めた森林プロット（毎木調査区）内に、5 m 四方のサブプロットを 15m～20m の間隔をあけて無作為に 5 地点設定する。各サブプロットの中心の X、Y 座標（1m 単位）を、毎木調査における樹木の位置測定と同じ座標系にて測定（目測）する（「モニタリングサイト 1000 森林コアサイト設定、調査マニュアル（Ver.2）」4.1 初回の毎木調査方法 参照）。
2. この 5 地点に、それぞれ 4 個のトラップを設置する（図 1。1 プロット内のトラップ総数は 20 個となる）。




図 1. 各サブプロットにおけるピットフォールトラップの配置図

3. トラップの埋設は、まず地表の落葉層を 100cm² ほどの範囲で除き、小型スコップを用いて地面に深さ 15cm ほどの穴を掘る（図 2a）。
4. トラップ開口部付近に凹凸があると小型の地表徘徊性甲虫が障害物によって落下しにくく

なるので、トラップの上端が地面から突き出ないように、周囲の土壌を埋め戻して固定する。

5. トラップ開口部付近の地表の状態が周辺環境と異ならないように、落葉落枝層で覆う（図 2b）。



図 2. トラップ容器の埋設方法. a) トラップ容器を埋設するための穴. b) トラップ容器を埋設した林床の状態.

※大型動物にトラップを抜き取られる被害が出やすい場合は、ペグ等を用いてトラップを固定する（図 3a）。

※雨水がトラップに溜まり作業に支障を来す場合は、以下のような加工を行ってよい。

- (1) トラップの真上に屋根状の雨よけを設ける（図 3b）

雨よけの大きさは 20cm 四方以内とし、地面との間に 5 cm 以上の間隔をあけ、地表徘徊性甲虫の移動を大きく妨げない構造とする。

- (2) トラップの底面に大きい水抜き穴を開ける（図 3c）

小型の甲虫が出入りできないよう、水抜き穴を覆うように目開き 1 mm 以下の網を貼り付ける。サイトでの加工が困難な場合は、ネットワークセンターに相談する。



図 3. トラップの設置・加工例. a) ペグを用いたトラップの固定. b) 雨よけの設置例. c) 底面の加工例. 大きい水抜き穴を 6 ヶ所開け、穴を覆うように目開き 1mm の網を接着している.

調査時以外はサブプロット内に立ち入らないようにし、調査で立ち入る際も歩く場所を毎回同じにするなどして、土壌の踏み固め、堆積落葉層や下層植生の攪乱などの影響の及ぶ範囲を最小限に抑えるよう努める。

2. 2. サンプルの採取

【1】甲虫類の採取

調査は、甲虫の活動性の高い5月～11月に年4回行う。年4回のそれぞれの調査は、最低1ヶ月の間隔をおいて実施する。降雨時には甲虫類の活動性が低下するので、なるべく雨天日の調査を避ける。1プロットにつき5個のサンプル回収容器を、毎調査前にネットワークセンターより送付する。

ピットフォールトラップ調査の作業手順を以下に示す。

1. ピットフォールトラップの蓋を開けて 72 時間、放置する（ピットフォールトラップには蓋がついている。調査を行わない期間中は蓋をしておき、その後の調査で使用する）。
2. 72 時間後にトラップ内に落下している無脊椎動物のみを回収する。

※以下の(1)～(4)のいずれかに該当する場合、トラップ開放期間中に甲虫の捕獲効率が変わったり、捕獲された甲虫がトラップから逃げ出したり、捕獲された甲虫が捕食された可能性が考えられるため、調査票（Excel ファイル）の「ピットフォール調査」のシートの備考欄に [] 内の文を記入する（p.9 2.3.を参照）。「x」には該当するトラップ数を、「～」には具体的理由を記入する。

(1) [埋没：x トラップ] 例：土砂や落葉落枝の混入によりトラップが埋没またはトラップの深さが著しく浅くなっていた。

(2) [水没：x トラップ] 例：降雨や増水によりトラップが水没またはトラップの深さが著しく浅くなっていた。

(3) [脊椎動物による攪乱：x トラップ] 例：動物によりトラップが動かされていた。トラップにトカゲなどの脊椎動物が入っていた。

(4) [～：x トラップ] その他の理由によりトラップが攪乱を受けたと考えられた。

3. 回収は、1 地点に設置した4個のトラップの中身をまとめて一つの回収容器に入れる（1プロットにつき5地点あるので、回収には5つの回収容器が必要となる）。

※回収容器には、殺虫および防腐効果のある酢酸エチルを浸み込ませた紙が数枚入れている。酢酸エチルは、揮発や加水分解によって効果が失われやすいので、蓋は回収した動物を入れるとき以外は開けず、回収後にはしっかりと閉めるよう注意する。またトラップ内に雨水が溜まっている場合には、極力、回収容器に水を入れないよう注意する。

4. トラップ内容物のうち、落葉や石、土壌などの異物は取り除く。
5. 回収容器に貼ってあるラベルに、回収した日付と調査者1名のローマ字氏名（ネットワークセンターで作成する甲虫標本のラベルに採集者名として印字する）を記入する。
6. 調査票（Excel ファイル）の「ピットフォール調査」のシートに調査開始および終了時間、天候、サブプロットごとの植被率を入力し、「すべての調査記録」のシートに調査記録を記入する（p.9 2.3.を参照）。

7. 調査終了後、速やかに回収した動物をネットワークセンターに送付する（夏季はクール便を利用する）。
8. 郵送時に、必要事項を入力した調査票（Excel ファイル）を作業報告（サンプルの発送日、到着予定日、備考など）と併せてメールにてネットワークセンターの担当者に送付する。
9. 気温などの気象データの抽出に時間がかかる場合は、調査票の気象データ部分は空欄とし、12 月末までに、すべての項目が入力されたファイルをプロットごとに送付する。事情によって 12 月に間に合わない場合は、その旨をネットワークセンターの担当者に連絡する。

【2】甲虫以外のサンプルの採取

堆積落葉層（A₀層）の動態を把握するために、トラップを埋設した 5 地点において、トラップの周囲の落葉層を採取する。落葉層の採取は、年 1 回（6～8 月）とする。落葉層下の土壌の採取は、3 年に 1 度、落葉層採取と同時に行う。

以下に堆積落葉層（A₀層）採取の手順を示す。

1. トラップから 3 m ほど離れた地点で落葉層の採取場所を選定する。落葉層の採取場所は、できるだけピットフォールトラップ調査時の踏み荒らしや以前の落葉層採取による攪乱の影響が残っていない場所とする。
2. 林床の 25cm×25cm の範囲の落葉や落枝を剪定バサミを用いて切り取り、その範囲内の落葉層を土壌粒子が見える深さまで採取する。
3. 落葉層の採取の際、直径 5 mm 以上の枝、礫、石は取り除く。また落葉層下部の土壌粒子が混入しないように、土壌粒子が見えてきた部分までの採取とし、付着した土壌はなるべく取り除く。
4. 1～3 の手順で、1 プロットにつき 5 地点のサンプルを採取する。
5. 採取した落葉層は封筒に入れ、封筒に(1) 調査プロット名、(2) 地点番号（1～5）、(3) 採取日を明記する。
6. 落葉落枝を入れた封筒を 60℃の送風乾燥機に入れて、48 時間以上、乾燥させる。
乾燥後に土壌粒子が封筒の底へ分離している場合、土壌粒子は送付前に捨てる。乾燥済みの落葉層をネットワークセンターに郵送する。
7. 調査票（Excel ファイル）の「すべての調査記録」のシートに採取日などの調査記録を記入し、メールにてネットワークセンターに送付する（p.9 2.3.を参照）。

以下に土壌採取の手順を示す。

1. 採取した堆積落葉層の直下の土壌を、100cc 採土円筒を用いて採取する（落葉層のサンプルと同じく 1 プロットにつき 5 地点）。
2. 採土円筒で採取した土壌は、ビニール袋に入れて持ち帰った後、封筒に移す。
3. 封筒には、(1) 調査プロット名、(2) 地点番号（1～5）、(3) 採取日を明記する。
4. 土壌を入れた封筒を 60℃の送風乾燥機に入れ、48 時間以上乾燥させる。乾燥した土壌をネットワークセンターに郵送する。
7. 調査票（Excel ファイル）の「すべての調査記録」のシートに採取日などの調査記録を記入し、メールにてネットワークセンターに送付する（p.9 2.3.を参照）。

2. 3. 調査票ファイルの記入方法

調査票の Excel ファイルは、プロットごとに1つのファイルとし、調査を行う度に入力して、ネットワークセンター担当者に送付する。まず、「プロット情報」のシートを入力する。ピットフォールトラップ調査を行った際は、「ピットフォール調査」のシートを入力する。さらに、ピットフォールトラップ調査およびその他の調査を行った際は、いつ、どこで、誰が、何の目的で、どのような方法で、何を測定したかを長期にわたり明らかにするために、「すべての調査記録」のシートを入力する。

「ピットフォール調査」のシートには、以下の項目を記入する。

- (1) 調査プロット名
- (2) 調査を行った期間
- (3) 実施期間中の天候
- (4) 積算降水量（ピットフォールトラップ開放時間（72 時間）内の積算値を記す）
- (5) 最高・最低気温（ピットフォールトラップ開放時間（72 時間）内の最高および最低気温を記す）
- (6) 各サブプロットの草本層の植被率（地上高 60cm 以下のものを草本層とする。低木類や高木性木本類の実生・稚樹およびササ類を含む。植被率は、トラップ埋設場所の 5m 四方の範囲で、概観によって調査者が判断する（図 4））
- (7) 採集代表者名（この欄に書かれた名前を、甲虫標本のラベルに印字する）
- (8) 備考（上記(1)～(7)の記入内容や甲虫の捕獲データについて通常と異なる点や解釈に注意を要する点、上記(1)～(7)以外のトラップやトラップ周囲の状況について調査時に気がついたこと等を記入する。トラップが攪乱を受けた場合の記入方法は、p.6 を参照）




図 4. 林床の草本層の植被率. a) 65%、b) 10%.

「すべての調査記録」のシートには、以下の情報を入力する。

- (1) 調査年月日
- (2) 調査プロット名
- (3) 調査者の氏名
- (4) 調査内容
- (5) 備考（調査中に気がついたこと、調査期間の前後やプロット周辺における環境や生物相の大きな変動・特筆すべき事象など）

調査記録は次の作業を行うたびに、必ず記入する。

- (1) ピットフォールトラップ調査の開始日（年4回）
- (2) ピットフォールトラップ調査の回収日（年4回）
- (3) 落葉層の採取（年1回）
- (4) セルロースフィルターの埋設（年2回）※
- (5) セルロースフィルターの回収（年6回）※
- (6) 土壌の採取（3年に1回）

※セルロースフィルターの埋設および回収については、『セルロースフィルター埋設および回収マニュアル』を参照。

3. サンプルの収蔵

各サイトで採取した甲虫、落葉層、土壌等はネットワークセンターに送付する。ネットワークセンターでは、甲虫を科（可能な限り種）まで同定し、乾燥重量を測定する。また、必要に応じて展足の後、標本箱に収納する。落葉層については、乾燥重量および炭素、窒素濃度の測定を行う。土壌については、炭素、窒素濃度の測定を行う。環境省生物多様性センターに収蔵する標本以外については、希望に応じて各サイトやその他の機関等が収蔵することも可能である。

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査
地表徘徊性甲虫調査マニュアル
2010 年 10 月改訂

環境省自然環境局 生物多様性センター
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1
電話：0555-72-6033 FAX：0555-72-6035

財団法人 自然環境研究センター
モニタリングサイト 1000 森林・草原調査 ネットワークセンター
担当：丹羽 慈（2010 年 10 月現在）
〒053-0035 北海道苫小牧市字高丘 北海道大学苫小牧研究林 内
電話：0144-33-2171 FAX：0144-33-2173
e-mail：moni1000f_pitfall@fsc.hokudai.ac.jp

財団法人自然環境研究センター
担当：鋤柄直純・畠瀬頼子（2010 年 10 月現在）
〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10
電話：03-5824-0969 FAX：03-5824-0970

環境省重要生態系監視地域モニタリング推進事業

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査

セルロースフィルター分解試験マニュアル

2011 年 7 月改訂版

環境省 自然環境局
生物多様性センター

財団法人
自然環境研究センター

はじめに

森林生態系は、1997年に採択された京都議定書において二酸化炭素の主要な吸収源として地球温暖化抑制への貢献が高く評価されている。森林の樹木は二酸化炭素（CO₂）を吸収し、ここから得られる炭素を使って、葉を作り出す。虫などに食べられてしまう葉もあるが、多くの葉は枯れて、林床へ供給される。この落ち葉は、微生物、ミミズやダンゴムシなどの土壤に生息する動物が様々な形で消費することで、分解されていく。この分解が進む過程で、二酸化炭素が大気中に放出される。このように森林生態系では、二酸化炭素が吸収される一方で、放出も行われている。

つまり、いったいどれくらいの量の葉が生産され、落葉として林床に落ちて分解されているのか、また、どれくらいのスピードで分解が進んでいくのか、を捉えることで、二酸化炭素が森林生態系の中に保持される量を認識することが可能となる。

このような森林の分解という働きは、地域によって分解される量やスピードが大きく異なる。これは、気温や土壤の状態、分解を促す生物の種類が異なるためであると考えられる。そのため、分解されていく過程を各地域で調査し、長期的なデータを集めることで、温暖化などの環境変化によって、どのような変化が生じているのかを把握することができる。さらに、各地域から集められたデータは、将来の環境予測にも役に立つ。

そこで、林床の有機物の分解過程を全国のコアサイトで一律に測定するために分解試験を行う。樹種の違いは、落葉の堅さや含まれる成分の変化をもたらすため、分解の進行具合にも影響を及ぼす。そこで、全国での試験の条件を統一するために、葉の主成分であるセルロースのフィルターを用いる。調査は、活発な分解が行われる落ち葉が堆積している落葉層とそのすぐ下の土壤層で、それぞれ行う。

調査方法

ラベルをつけて重量を測定したセルロースフィルターを、モニタリングサイト 1000 森林・草原調査ネットワークセンター（モニタリングサイト 1000 森林・草原調査（鳥類を除く）のサンプルやデータを扱う部署。北海道大学苫小牧研究林内に設置されている。以下ネットワークセンターという）から各サイトに送付する。各サイトでは、このフィルターを土壌に埋め、決められた時間が経過したら、埋設したフィルターを取り出し、ネットワークセンター担当者へ送付する。担当者は送られてきたフィルターの重量を測定し、土壌中に埋設されていた期間中の重量減少量を算出する。埋設前のフィルターの重量と埋設中の重量減少量から、有機物の分解率を算出する。

調査は3年に1度実施し、セルロースフィルターの埋設を2回、回収を4回行う。以下に、それぞれの作業の手順を示す。

1. フィルターの埋設

1. 1. 実施時期

- ・埋設1回目（回収日 A～C のフィルター）：1 回目のピットフォールトラップ調査実施時
- ・埋設2回目（回収日 D のフィルター）：4 回目のピットフォールトラップ調査実施時

1. 2. 必要な道具

【ネットワークセンターから送付するもの】

- ・セルロースフィルター（ベンチコート 2300-916（ワットマン社製）、5 × 5 cm、80 枚／調査区）
- ・針金
- ・金網（15 枚／調査区）

【各サイトで準備していただくもの】


- ・根掘り（シャベルなどでも可）
- ・標識テープ
- ・油性ペン

1. 3. 事前準備

- (1) フィルターにはセルロース面（紙の面）と樹脂面（ビニールの面）がある。


樹脂面にプロット（調査区）ID、サブプロット番号（1～5）、回収日記号（A～D）、層別記号（L：落葉層、S：土壌層）、およびフィルター通し番号（1～80）が、あらかじめ油性ペンで書いてある。

例)




- (2) サブプロット番号（1～5）と回収日記号（A～D）が同じ4枚のフィルター（層別記号 L：2枚、S：2枚）を1組として、20組に分ける（図1）。回収日 A～C は1回目の埋設時に、回収日 D は2回目の埋設時に埋設する。


サブプロット1




サブプロット2



サブプロット3



サブプロット4



サブプロット5




図 1. フィルターの分け方. サブプロットと回収日が同じ4枚を組にし、20組に分ける.

1. 4. 野外での作業

年2回の埋設時に、調査区内の5ヶ所のサブプロット（4つのピットフォールトラップを含む5m四方の範囲）において以下の作業を行う（図2）。

- (1) 土壌の安定している平坦な地形で攪乱や人為的な踏み荒らしの少ない林床を埋設地点として選定する。
- (2) **回収日が同じ4枚のフィルター**（1回目の埋設時はA、B、Cの3組。2回目の埋設時にはDの1組のみ。図1）は**15cm四方の範囲内に設置し、設置した4枚のフィルターの上に落葉層をのせ、さらにその上に金網をのせる**。フィルターの設置は、層別記号に応じて以下の要領で行う。
 - (3) 層別記号がS（Soil）と書いてあるフィルターは、土壌層での分解速度を測定するために用いる。特に、土壌における微生物による分解量の測定を目的とする。埋設時に林床表面の落葉を取り除き、土が露出した状態にする。根掘り等を用いて、**垂直に深さ5cm程度の切り込みを作成**する。作成した**切り込みの隙間にフィルターを差し込む**。この時、フィルターが土壌表面から突出しないように、フィルターの上端が土壌表面と同じ高さになるように差し込む。差し込んだ後に土壌とフィルターの間の隙間がなくなるように、両手で**土壌を切り込みの両側から押し付ける**。こうすることで、土壌とフィルターの間に隙間がなくなる。できるだけ切り込みの幅を狭くする（フィルターが入る程度）ことで、隙間を埋めるのが簡単になる。
 - (4) 層別記号がL（Litter）と書いてあるフィルターは、落葉層での分解速度を測定するために用いる。特に、落葉層を利用する生物による分解量の測定が目的である。土壌層用のフィルター（S）を差し込んだ切り込みの近くで、林床表面の落葉を取り除き、土を露出させる。**記号が書いてある樹脂面（ビニール面：分解されない面）を下にして、露出した土壌の上に水平に置く**。ただし、土壌層用のフィルターを差し込んだ切り込みを塞いでしまわないように注意する。上面がセルロース面（紙の面：分解される部分）になっていることを確認したら、**最初に取り除いた落葉をフィルターの上に被せる**。
 - (5) **4本の針金をU字型に曲げ、金網の4隅に垂直に突き挿す**。ここで、金網が固定されるように土壌の安定した部分に針金を挿すようにする。金網と針金を用いて林床から落葉およびフィルターが流亡しないようにすることが目的であるが、サイトによっては、この方法では不十分な場合もあるので、哺乳類による攪乱への対策などを担当者に相談する。
- (6) 回収時に区別できるように、**金網の上に標識テープ等で回収日A、B、Cを示しておく**。
- (7) 調査票（Excel ファイル）の「すべての調査記録」のシートに調査記録を記入する。




図 2. サブプロット1の林床にフィルターを埋設した状態の模式図(埋設1回目). 実際には、落葉層用のフィルター(L)は、樹脂面(記号の書かれている面)を下にして設置する。

2. フィルターの回収

2. 1. 実施時期

- ・埋設 1 回目のフィルターの回収 (回収日 A～C) : 当年度の 2、3、4 回目のピットフォールトラップ調査実施時
- ・埋設 2 回目のフィルターの回収 (回収日 D) : 翌年度の 1 回目のピットフォールトラップ調査実施時

2. 2. 必要な道具

【各サイトで準備していただくもの】

- ・回収、送付用のビニール袋
- ・乾燥用のバット

2. 3. 野外作業

- (1) 2 回目のピットフォールトラップ調査時に、回収日 A のフィルター（金網 A の下にある 4 枚）を回収する。 5 サブプロットから回収するので 1 回に計 20 枚を回収することになる。金網と針金は、回収してサイトで保管する。
同様に、
 - ・ 3 回目のピットフォールトラップ調査時には、回収日 B のフィルター
 - ・ 4 回目のピットフォールトラップ調査時には、回収日 C のフィルター
 - ・ 翌年度の 1 回目のピットフォールトラップ調査時には、回収日 D のフィルター
 を回収する。

- (2) 調査票（Excel ファイル）の「すべての調査記録」のシートに調査記録を記入する。
- (3) 回収したフィルターは、水中で軽くこするなどして、フィルターを損傷させないように、表面に付着した土壌や落葉等を落とす。
- (4) 洗浄したフィルターは、直ちに送風乾燥機を用いて 60℃で 24 時間程度、乾燥させる。乾燥時にセルロース面がバットや他のフィルターに付着しないように、樹脂面を下にして、バットに重ならないように広げて乾燥させる。湿ったままで長時間放置しないように留意する。
- (5) 乾燥させたフィルターは 20 枚をあわせて 1 つのチャックつきビニール袋に入れ、袋に調査区名、埋設日、回収日を必ず記入する。
- (6) 乾燥後ビニール袋に入れたフィルターを、ネットワークセンターに郵送する。乾燥を行っていれば、すぐに郵送しなくても構わないので、複数回の回収分をまとめて郵送してもよい。

※ 送風乾燥機を所持していないサイトで、乾燥作業が困難な場合はネットワークセンター担当者まで相談の上、回収後、すぐにクール便にて送付し、送付の旨をメール等で連絡する。

3. 調査時期と作業内容のスケジュール

フィルターの埋設と回収の時期を以下に示す。

	当年度				翌年度
	4月下旬～ 6月中旬	6月中旬～ 7月上旬	9月上旬～ 10月上旬	10月上旬～ 11月上旬	4月下旬～ 6月中旬
ピットフォールトラップ調査	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目
フィルター埋設	1回目(A-C)			2回目(D)	
フィルター回収		A	B	C	D




図 3. 作業の流れ

モニタリングサイト 1000 森林・草原調査
セルロースフィルター分解試験マニュアル
2011 年 7 月改訂

環境省自然環境局 生物多様性センター
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1
電話：0555-72-6033 FAX：0555-72-6035

財団法人 自然環境研究センター
モニタリングサイト 1000 森林・草原調査 ネットワークセンター
担当：丹羽 慈（2011 年 7 月現在）
〒053-0035 北海道苫小牧市字高丘
北海道大学苫小牧研究林 内
電話：0144-33-2171 FAX：0144-33-2173
メール：moni1000f_pitfall@fsc.hokudai.ac.jp

財団法人自然環境研究センター
担当：鋤柄直純・畠瀬頼子（2011 年 7 月現在）
〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10
Tel：03-5824-0969 Fax：03-5824-0970



環境省

モニタリングサイト1000

森林・草原の鳥類調査ガイドブック

植生調査の方法





モニタリングサイト1000 は、
日本の自然環境の変化を
モニタリングしていくための調査です。

森林・草原の鳥類調査では、
鳥の生息状況の変化を明らかにするとともに
鳥の生息環境の変化もモニタリングするために
簡単な植生の調査を行ないます。

調査地の植生の平面的な広がりについては、
最近では精密な航空写真や衛星写真なども
手に入れることができるようになり、
それで解析することが可能です。

しかし、森林内の
構造や樹高、草原の草丈など
高さ方向についての情報は
航空写真からはわかりません。

そこで、
モニタリングサイト1000の植生調査では
そのような部分を中心に
植生をしらべます。



植生調査の方法

▼ 調査に必要な物

1. 事務局から届いた過去の調査ルートが記入された地形図（1/25000を拡大した物）
2. 調査用紙、筆記具
3. カメラ（デジタルカメラまたはフィルムカメラ）

▼ 植生調査の種類

森林の植生調査と、草原の植生調査の2種類あります。調査の仕方に違いがありますので次項以降で別々に説明致します。

▼ 調査時期

植生調査は植物の高さ、被度（葉が被っている割合）を調べます。そのため、葉がついている繁殖期の調査の時に植生調査を行なってください。

▼ 植生調査を行なう場所


植生調査はスポットセンサスを行なった定点で実施してください。

定点5か所それぞれで調査を行ないます。

▼ 定点撮影


森林や草原の環境の変化をとらえるため、定点を設けて毎回同じ方向・同じ範囲を撮影します。撮影方向と対象については、次頁以降を参照ください。デジタルカメラで撮影した場合は、ファイル名に撮影情報（撮影した調査コースと調査区、撮影年月日と時間）を記入ください。フィルムカメラで撮影した場合は、撮影情報を写真の裏に記入ください。また、撮影方向を記録するため、地形図上に撮影地点を起点とした矢印を書き込んでください。

調査場所の地形図



森林の調査の方法

▼ 調査区の決め方



スポットセンサスを行なった定点と同じ場所に、約25m四方の調査区を設けその位置を地図に記入します。ただし道の上は調査に適していないので、道の近くの森林の中に設置してください。被度は割合で示すため、多少面積が変わっても結果に大きな影響は出ませんので、調査区の大きさは厳密でなくてもかまいません。また、定点が斜面に位置する場合は、見下しやすい場所に調査区を設定した方が調査しやすいと思います。

▲
P. 4


▼ 植生のしらべ方

まず、調査用紙に、調査コース名、調査年月日、調査員名を記入します。

・被度の調査

調査区内の植物の被度を高さ別に調べます。(図を参考に)

林床、低木層、亜高木層、高木層、高高木層の被度(葉がどれくらいおおっているか)を記録します。




※林冠とは林の一番上をおおっている樹冠の層のことです。

被度の合計は100%以上になりますが、それは林床と低木、林床と高木などのように異なる階層が重なっているためです

1. 植物の占める面積比率を被度のランクとして記録してください。あてはまるランクを0から5の数字で記入してください。

ランク0=植生なし
 ランク1=1~10%
 ランク2=10~25%
 ランク3=25~50%
 ランク4=50~75%
 ランク5=75%以上


2. 次に、該当する植生タイプについて多い順に1から数字を振ってください。
 植生タイプが同じくらいの面積の場合は無理に順位付けせずに、同一順位でよいです。
 樹高の低い林では、亜高木層がない場合もあります。
 また、林冠より突出している木がない場合は高高木を記入する必要はありません。



調査区 A

階層	被度のランク	植生タイプ (カッコ内に広さ順に数字を記入)	樹種(わかる場合)
林床(おへその高さ)	4	(1)ササ、(2)草、(4)落広、(3)常広、()常針	
低木層(身長の高さ)	4	(1)ササ、(3)落広、(2)常広、()常針、()落針	
亜高木層(~10m)	3	(1)落広、(3)常広、(2)常針、()落針、()竹	
高木層(~林冠)	3	(1)落広、(2)常広、()常針、()落針、(2)竹	
高高木層(突出木)	1	()落広、()常広、(1)常針、()落針、()竹	
林冠の高さ	~10m、10~15m、15~20m、20~30m、それ以上		
突出木の高さ	~10m、10~15m、15~20m、20~30m、それ以上		
地形	斜面、尾根、平地	沢の有無	有・なし

落広：落葉広葉樹
 常広：常緑広葉樹
 常針：常緑針葉樹
 落針：落葉針葉樹



・樹高の調査

林冠の高さと、突出木の高さについて該当するものに丸をつけてください。

・地形の調査


地形（斜面、尾根、平地）と、沢の有無についてご記入ください。

・写真撮影

デジタルカメラで、それぞれの調査区ごとに真上（林冠）、斜面の下方向（平地の場合は北方向）、森林の階層の特徴がわかるような写真を、それぞれなるべく広角（望遠の反対）で撮影してください。写真の提出方法については、「P.3」を参照してください。

草原の調査の方法


▼ 調査区の決め方



スポットセンサスを行なった定点と同じ場所に、約50m四方の調査区を設け、その位置を地図に記入します。

ただし、道の上は調査に適していないので、道を避けた場所に設置してください。

被度は割合で示すため、多少面積が変わっても結果に大きな影響は出ませんので、調査区の大きさは厳密でなくてもかまいません。また、草原では低いところからの見通しがきかないので、できれば堤防の上など高いところからの調査が行えるような場所に調査区を設定してください。



▼ 植生のしらべ方

まず、調査用紙に、調査コース名、調査年月日、調査員名を記入します

・被度の調査

1. 調査地全体を見渡して考えて、該当する草原タイプに丸をつけてください。
また水域の有無についても記入ください。

2. 植物や土地利用の区分が占める面積比率を被度のランク（0～5）として記録してください。あてはまるランクを0～5の数字で記入してください。

ランク0＝植生なし
 ランク1＝1～10%
 ランク2＝10～25%
 ランク3＝25～50%
 ランク4＝50～75%
 ランク5＝75%以上

3. 次に、該当する植生タイプについて面積が広い順に1から数字を振ってください。植生タイプが同じくらいの面積の場合は無理に順位付けせずに、同一順位でよいです。

草原の植生 調査用紙

草原のタイプ	湿性草原 ・ 乾燥草原 ・ 牧草地 ・ その他
水域の有無	河川 ・ 湖沼 ・ 海 ・ 水域なし

調査区 A

区分	被度の ランク	植生タイプ（カッコ内に広さ順に数字を記入）
ひざ下の草	2	()アシ、(/)単子葉：細い葉、()双子葉：広い葉、(/)ツル
へそ下の草	1	()アシ、()単子葉：細い葉、(/)双子葉：広い葉、()ツル
背丈程度	3	(/)アシ、()単子葉：細い葉、()双子葉：広い葉、()ツル
背丈以上		()アシ、()単子葉：細い葉、()双子葉：広い葉、()ツル
耕作地		()水田、()畑地、()その他
樹木と高さ	1	落広・常広・落針・常針・竹 ・ 10m ・ ～15m ・ ～20m ・ 20m以上
裸地		
水域	1	地表面の水 (有) ・ なし ・ 不明



落広：落葉広葉樹
 常広：常緑広葉樹
 落針：落葉針葉樹
 常針：常緑針葉樹

単子葉植物：葉のすじが
途中で別れずに並んでいる

双子葉植物：葉のすじが
途中で別れ、網の目のよ
うになっている。

・写真撮影

デジタルカメラで、それぞれの調査区ごとに斜面の下方（平地の場合は北方向）、草原の断面の特徴がわかるような写真を、それぞれなるべく広角（望遠の反対）で撮影してください。写真の提出方法については、「P. 3」を参照してください。





環境省モニタリングサイト1000 森林・草原の鳥類調査ガイドブック
植生調査の方法

2008 年 3月 21日 発行

発行 環境省自然環境局生物多様性センター 財団法人日本野鳥の会


編集 特定非営利活動法人バードリサーチ

イラスト／レイアウト 重原美智子

モニタリングサイト1000

森林・草原の 鳥類調査ガイドブック

(2009年4月改訂版)



環境省自然環境局生物多様性センター
(財) 日本野鳥の会 NPO法人バードリサーチ

もくじ

1

調査をはじめる前に

調査の流れ・・・2

鳥の調査手法の変更について・・・3

調査のための準備・・・4

調査がおわったら・・・6

2

調査のおこないかた

環境全体のしらべかた・・・8

鳥の種と数のしらべかた・・・10

調査方法をよくお読み下さい


前回の調査では「ラインセンサス法」で調査を実施していただきましたが、今回から調査方法が「スポットセンサス法（定点センサス法）」に変わっていますので、ご注意ください。



1



調査をはじめる前に

調査用紙等が届いてからのモニタリングサイト
1000・森林と草原の鳥類調査の流れを説明します。
調査を行なうためにはいくつかの準備が必要です。
調査が終わった後には、調査用紙の返送をお願いします。



調査の流れ

森林・草原の鳥類調査は以下のような流れで行ないます。



鳥の調査手法の変更について

モニタリングサイト1000の森林と草原の調査は、今までのラインセンサスからスポットセンサスに変更することになりました。その理由についてご説明いたします。

▼なぜスポットセンサスにかえたのか？


今まで、日本での鳥類の生息状況の調査は、おもにラインセンサス法で行なわれてきました。この方法は歩きながら広い範囲を調査することができる効率的な調査方法です。イギリスでの鳥類の生息状況の調査の多くもこのラインセンサス法で行なわれています。

しかし、モニタリングサイト1000のような多くの方が参加する調査の場合、欠点もあります。1つは調査コースの設定です。森林と草原の調査では1kmの調査コースを設定して調査することになっているのですが、この設定がどうしても調査員により違ってしまいます。モニタリングサイト1000の第1期の調査では、1kmに満たないコースから3kmを超えるコースまでいろいろなコースができてしまいました。このように調査距離が違ってしまうと調査結果の比較が困難になってしまいます。2つ目は調査時間の問題です。本調査では、1kmのコースを30分で歩くことになっていますが、これも調査員により、長いものでは数時間かけて調査してしまっているものもありました。

そこで、このような問題をなくし、より調査地間の比較のしやすい手法、スポットセンサスを調査手法として採用することになりました。この手法はアメリカでよく使われている調査手法です。

▼スポットセンサスの効率は？

スポットセンサスは、調査地内に定点を設け、その周辺にいる鳥を記録する手法です。ラインセンサスよりも調査範囲が狭くなるので、記録される鳥が減ると心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、予備調査の結果からは逆にスポットセンサスの方が多くの鳥を記録できることがわかりました。人が動かなくても、鳥が移動してくること、歩きながらの調査だと足音などで鳥の声が聞き取りにくいのにに対して、その場に留まっているスポットセンサスでは小さな声が聞き取りやすいことなどがその理由だと思いますが、いずれにせよ、スポットセンサスの採用により鳥の記録漏れが増えてしまうということはありません。



ラインセンサスとスポットセンサスによる森林の鳥類の記録状況の違い。越冬期も繁殖期もスポットセンサスの方が多くの鳥を記録できていることがわかります

調査のための準備


▼調査日時の設定

調査は、さえずりがさかんな繁殖の前期と最盛期に1日ずつ計2日、越冬期には冬鳥が揃ってから2週間以上の間隔を開けて2日行ないます。日本は南北にも東西にも細長いので、地域によって調査に適した日時が違ってきます。特に繁殖期はさえずりの盛んな時間帯が限られますので、下記の日時設定を参考にしながら各地の実情にあわせた調査日時を設定してください。越冬期は、全国で12月中旬から2月中旬までの午前11時までに実施すればよいでしょう。なお、この調査は調査地で繁殖している鳥の個体数密度を調べることを目的にしていますので、留鳥が繁殖している時期であっても、渡り鳥の通過個体が多い時期は避けて調査を行って下さい。

■各地の調査時期の目安

あくまで目安ですので、調査地の事情に合わせて時期や時刻を変更していただいて構いません。（例．エゾハルゼミが鳴く地域は調査時刻を早めるなど）

地域	繁殖期		越冬期	
	時期	時刻	時期	時刻
南西	4～5月	6:00～9:00	12月中旬～2月中旬	8:00～11:00
近畿以西	5月下旬～6月	5:00～8:30	12月中旬～2月中旬	8:00～11:00
本州中部～東北	5月下旬～6月	4:00～8:00	12月中旬～2月中旬	8:00～11:00
北海道	6～7月上旬	4:00～8:00	12月中旬～2月中旬	8:00～11:00



▼調査用紙とガイド、地図の準備

■調査用紙

専用の調査用紙と地図を用意しています。調査コースの情報、調査地の地図、鳥の種と数の調査の記録用紙、調査地の写真、調査に関する備考と連絡事項の5種類の用紙をお送りします。調査に必要な枚数は下の表を目安にしてください。また、調査員1人につき調査ガイドを（この冊子）を1冊ずつ用意しています。

■1コースの調査に必要な調査用紙の枚数（下表は繁殖期の調査の目安）


調査用紙	枚数
調査地の情報	1枚
調査地の地図	1枚
鳥の種と数の調査 記録用紙	20枚
調査地の写真 貼付用紙	5枚
調査に関する備考と連絡事項	1枚

▼調査地での準備

1. 調査するコースの下見をする（道をまちがえないように）



2. 調査定点5地点を決める



1 kmの調査コース上に5つの定点（A～E）を設定してください。森林のサイトでは森林環境に5定点、草原のサイトでは草原の環境に5定点を設定してください。スタート地点から250mおきに5定点を設定しますが、定点はその後継続して調査する場所になりますので、厳密に250mおきでなくても良いので、わかりやすい場所に設定してください。また、植林の中に落葉広葉樹が一部混じっているような場合で、250m間隔で設定すると植林ばかりで調査することになってしまう場合や、水場など鳥の集まる場所がわかっている場合は、調査コースにあるそのような環境をうまく含むことができるように、定点を設定してください。ただし、定点間の距離が100mより近くなることは避けてください。

調査が終わったら

調査が終わったら，調査用紙を日本野鳥の会自然保護室に返送してください。

■返送する調査用紙


調査用紙	返送の必要
調査コースの情報	有
調査地の地図	※1
鳥の種と数の調査 記録用紙	有
調査地の写真 貼付用紙	有
調査に関する備考と連絡事項	※2

※1「調査地の地図」は，コースを決めるときに一度お送りいただければそれ以降は返送する必要はありません。ただし，コースの修正があった際にはお送り下さい。

※2「調査に関する備考と連絡事項」は，特に記載事項がなければ返送の必要はありません。

■返送先

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル
日本野鳥の会自然保護室 モニタリング担当



2

調査のおこないかた

モニタリングサイト1000・森林と草原の鳥類調査では、環境の調査と鳥の種と数の調査をおこないます。それぞれの調査方法や調査用紙への記入例などについて説明します。



環境全体のしらべかた

調査地の地形や植生など、環境全体の特徴を記録します。

■調査に必要な物

地図、調査用紙の「1.調査コースの情報」と「3.調査地の写真貼付用紙」、カメラ、筆記用具


▼調査の要領

1. 調査用紙「1.調査コースの情報」への記入

毎回記録する項目と、繁殖期・越冬期のいずれかに1回記録する項目があり、詳細は調査用紙「1.調査コースの情報」に書かれています（次ページの記入例を参照）。

2. 調査コースの写真撮影

- 繁殖期と越冬期の両方に、調査定点の5地点（A，B，C，D，E）で写真を撮影する。
※5年後以降の調査で定点の位置を確認するための参考になるように、ルートを含めた定点の写真を撮影ください。
- 毎回同じ地点で撮影する。
- 初回調査時とコース修正時は、調査定点（撮影地点）5地点を地図に記入する。（下図を参照）



▼調査用紙の記入例

1. 調査コースの情報

※は繁殖期，越冬期ともに記入して下さい。

※ 調査コース名 多摩動物公園裏手 ※ 調査コース番号 100999
(送付した地図に書いていない場合は名前をつけて下さい。) (送付した地図にある番号を記入。)

※ 調査代表者 野原つぐみ

※ 調査参加者 森野かけす、畑野スズメ

調査コースの住所 東京 (都) 道 府 県 日野 (市) 町 村 郡 南平

コース情報 (繁殖期または越冬期のいずれかに1回記入。変更があった際にも記入。)

環 境 (一方を選択)	(森林), 草原
地 勢 (1つ選択)	山岳, 盆地, (丘陵), 平野
地 形 (複数選択可)	尾根, (斜面), 谷, 河川, 湖沼, 海岸
面 積 (孤立した森林または草原の場合のみ記入)	ヘクタール
保護区の指定	国立公園, 鳥獣保護区, 休猟区, 銃猟禁止区, 指定なし, (不明), その他 ()

コース概要 (コースの環境によって森林コースあるいは草原コースのいずれかに記入。)


◆森林コース (繁殖期または越冬期のいずれかに1回記入。ただし積雪は越冬期に記入。)

植 物	1 コナラ	2 クヌギ	3 シラカシ
樹冠高	0.5m以下, 0.5-2m, 2-5m, (5-10m), 10-15m, 15m以上		
積 雪	全面積雪 (10cm, 10-30cm, 30cm以上), 部分積雪, 積雪なし		

※ ◆草原コース (繁殖期, 越冬期ともに記入。ただし積雪は越冬期に記入。)

植 物	1	2	3
草 丈	0.5m以下, 0.5-2m, 2-5m, 不明		
積 雪	全面積雪 (10cm, 10-30cm, 30cm以上), 部分積雪, 積雪なし		

環境断面の模式図 (繁殖期または越冬期のいずれかに1回記入。)



※植生調査は別紙「植生調査の方法」をご覧ください、植生用の調査用紙にご記入ください。

鳥の種と数のしらべかた

■調査に必要な物

調査用紙「2.鳥の種と数の調査記録用紙」、画板、筆記用具、双眼鏡

▼調査の要領


1日だけの調査では、渡りの時期の違いによって記録できない種が出てくるため、下記のように調査を2日に分けて行ないます。なお、雨天と強風の日は調査しないでください。

繁殖期…さえずりがさかんな繁殖の前期に1日と最盛期に1日の計2日

越冬期…冬鳥が揃ってから1日、2週間以上経ってからもう1日の計2日

- ・1日あたり各定点2回調査する。（下図参照）
- ・遠方などで2日に分けて行くのが困難な場合には1日で行なってもよい。（その場合は1日で各定点4回調査する）
- ・調査は鳥が活発に活動している時間帯に行なう。（4ページの表を参照）

■調査のスケジュール



▼調査の方法

- ・各定点で10分間の調査します。
- ・草原の調査で堤防上から調査する場合は、草原側（川側）のみを調査範囲とします。
- ・2分ごとに、確認した種、記録方法、個体数を記録します。定点から半径50mの範囲とそれ以遠にわけて記録しますが、草原の調査のA地点とE地点では、さらに50～200mとそれ以遠に分けて記録して下さい。これは河川の国勢調査では200m以内の鳥を記録しているので、それとの比較を可能にするためです。
- ・草原では鳥の鳴声が森林などに比べ遠くから良く聞こえますので、目視できるときに、鳴声の大きさと鳥との距離を確認するように心がけてください。
- ・各定点を1回調査し終わったら、2回目をスタートさせる前に15分程度休んでください。

▼調査用紙の記入例

2. 鳥の調査用紙

2分ごとに新たにカウントし
なおしてください

調査日時 平成28年 6月 6日 5時

草原のA地点とE地点のみ50～200m, 200m
以上を分けて記録してください。
(河川の国勢調査との比較のため)

種名	0-2分					50m 以上
	50m以内		50m 以上	200m 以上	S	
	S	成 幼				
シジュウカラ	3			2		3
オオルリ				1		2
エビ		2	5			
ヒヨ		1		4		
キ						
メ						

「0-2分」で記録した鳥と同じ鳥が「2-4分」
にいた場合も再度「3」と記録してください

さえずりを確認
したら「S」の欄
に個体数を記入
します

さえずり以外の記録は、巣立ち
ビナを見た場合は「幼」に、それ
以外の記録は「成」に記入しま
す

間違いの修正はわかり
やすく示してください

- ・2分ごとに、改めて調査するイメージで、最初の2分で記録した鳥と同一個体でも、次の2分では再度数を記入ください。
- ・どの調査地点の何回目の調査用紙なのかをわかるように記入してください。
- ・1日目に2回調査した後の2日目の1回目の調査は「3回目」に○をつけてください
- ・高空を通過していった鳥は「50m以上」の部分に記録してください。
- ・成鳥の個体数を調べたいので、巣立ちビナを確認した場合は必ず「幼」の部分に記入してください
- ・モニタリング調査は、その地域の鳥類の相対的な多さの変化を比較するのが目的です。珍しい鳥を探したり、必要以上に多くの個体数を記録しようとする必要はありません。



モニタリング・サイト1000
森林・草原の鳥類調査ガイドブック
平成21年（2009年）4月 改訂版発行

財団法人 日本野鳥の会 自然保護室
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル
電話：03-5436-2633 FAX：03-5436-2635

特定非営利活動法人 バードリサーチ
〒183-0034 府中市住吉町1-29-9

イラスト 重原美智子

©財団法人 日本野鳥の会

サンショウクイの亜種の記録について

日本野鳥の会
自然保護室

日本のサンショウクイは2亜種に分かれており、従来、亜種サンショウクイ *Pericrocotus divaricatus divaricatus* は夏鳥として主に本州から九州で繁殖し、亜種リュウキュウサンショウクイ *Pericrocotus divaricatus tegimae* は留鳥として主に南西諸島で繁殖し、九州南部等でもまれに繁殖、越冬する、とされてきました（日本鳥類目録改訂第6版、日本鳥学会、2000年）。

ところが近年、亜種リュウキュウサンショウクイの繁殖地域が九州北部まで北上しているという観察記録があり、四国でも記録されはじめています。

そこで、スポットセンサスの際に、もし可能であれば、視認により亜種の識別を行い、亜種名で記録してください。視認における識別点は下記の通りです。

ー前頭部は白い **亜種サンショウクイ**

目の下は白い

上面は灰黒色

胸から脇は汚白色

ー前頭部はくちばしの近くまで後頭部からの黒が広がっている

目の下は線状に黒い部分がある

上面は黒色

胸から脇は灰黒色 **亜種リュウキュウサンショウクイ**

種名欄には、

亜種が識別できた場合には

亜種サンショウクイ （または亜サンショウクイ）

または **リュウキュウサンショウクイ**

亜種が識別できない場合には

サンショウクイ（亜種不明）

と書き分けてくださるようお願いします。

識別点参考文献：『フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂版』（高野伸二、1982／2007年）228～229 ページ

『増補改訂版日本鳥類大図鑑Ⅰ』（清棲幸保、1978年）283 ページ

平成 25 年度
モニタリングサイト 1000 森林・草原調査報告書

平成 26（2014）年 3 月

環境省自然環境局 生物多様性センター
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1
電話：0555-72-6033 FAX：0555-72-6035

業務名 平成 25 年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業
（森林・草原調査）
請負者 一般財団法人 自然環境研究センター
〒130-8606 東京都墨田区江東橋 3 丁目 3 番 7 号

本報告書は、古紙パルプ配合率 100%、白色度 70%の再生紙を使用しています。

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます

本報告書は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料〔Aランク〕のみを用いて作製しています。