

087_穴喰地先沿岸

垂直分布表

表 穴喰沿岸地先における底質の割合(%)と海藻の被度(%)(水深は11時)

調査年月日: 2005年6月4日

距離(m)	0.0	0.7	1.3	2.2	5.2	13.5	24.0	46.0	75.0
水深(m)	+0.04	+0.35	+0.1	1.4	1.5	3.7	4.6	5	6.4
岩の割合(%)	100	100	100					50	60
転石の割合(%)				100	80	20			
巨礫の割合(%)					20	65	30	20	
大礫の割合(%)					+	10	20	10	
小礫の割合(%)					+	5	+	5	
砂の割合(%)							+	5	
泥の割合(%)									
フクロフノリ	+								
イワヒゲ	+								
無節サンゴモ	5	5	40	40	40	40	50	60	
クロソソ		+							
ヒジキ		80							
カイノリ		10	+						
イボツノマタ		10	+						
タマナシモク		5	100	+					
カバノリ			+						
オニクサ			+						
ウスカワカニノテ			+	10	5	5	5	+	
ヘリトリカニノテ			+	30	10	20	25	20	
ヘラヤハズ			+	50	5	+	+	5	
ランゲリア				+					
カゴメノリ				+					
ネバリモ				+					
サナダグサ				+					
ヒメカニノテ				5	+	+	+	+	
アミジグサspp.				+	+	+	+	+	
ソソspp.				20	30	+	+	+	
ガラガラ				+		+	+	+	
フクロノリ				+	+		+	+	
シマオオギ				+	+	5	10	20	
カタメンキリンサイ				+	+	+	+	+	
サクラノリ				+	+		+	+	
イワノカワsp.				+	+	+	+	+	
スギノリ				20	20	5	+	+	
ビリヒバ				+	+	+	+	+	
マクサ				+	10	30	10	5	
アントクメ				+	+	+	20	35	
アヤニシキ					+	+			
ヒメモサズキ					+	+	+		
ネザシミル					+	+	+	+	
オバクサ					+	10	+	+	
イソハリガネ						+			
クロトサカモドキ						+			
カギケノリ						+	+		
カニノテ						+	+		
ホンダワラsp.						+	+	+	
ビロウドガラガラ						5	+	5	
キッコウグサ						+	+	+	
ナミイワタケ						+	+	+	
ソデガラミ						+	+	+	
テングサsp.							+		
ミアナグサ							+		
シワヤハズ							+	+	
ソソノハナ							+	+	
タマイタダキ							+	+	
キントキ							+	+	
ウミウチワ							+	+	
マガリカニノテ							+	+	
ヒラガラガラsp.							+	+	
ニクムカデ							+	+	
ヤナギノリsp.								+	
イソノハナsp.									+
ハナヤナギ?									+
トサカノリ									+
アミモヨウ									+
ユルジギヌ									+
ツカサアミ									+

+ : 5 %未満