

アオバト


(分類) ハト目ハト科 *Sphenurus sieboldii*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 北海道から九州で繁殖。北日本ではおもに夏鳥。台湾、中国東南部、ベトナムなどに分布。

(生態) 丘陵から山地の広葉樹林で樹上に営巣する。詳しい繁殖生態は不明。小群でサクラ、キイチゴなどの漿果やミズナラなどの堅果を食べる。春から秋に群れで海水などの塩分を補給しに来る習性がある。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 12 B = 233 C = 73



1997年－2002年 メッシュ数 A = 1 B = 312 C = 137



ズアカアオバト


(分類) ハト目ハト科 *Sphenurus formosae*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 南西諸島で留鳥。台湾とフィリピンに分布。

(生態) 亜熱帯性常緑広葉樹林で樹上に営巣する。おもに樹上で木の実を食べる。習性はアオバトに似る。分布が限られており、地域により4亜種が認められている。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 0 B = 17 C = 6



1997年－2002年 メッシュ数 A = 1 B = 19 C = 15





ジュウイチ

(分類) カッコウ目カッコウ科 *Cuculus fugax*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 北海道から九州までの山地で夏鳥。アジア東部から東南部に分布。

(生態) 低山から亜高山帯の落葉広葉樹林や針広混交林に、5月頃渡来し、5～7月頃おもにコルリやオオルリ、および小型ヒタキ類に托卵する。おもに樹冠部で毛虫(ガの幼虫)をとって食べるが、生態の詳細は明らかではない。



セグロカッコウ


(分類) カッコウ目カッコウ科 *Cuculus micropterus*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 西日本や日本海の島嶼でまれな旅鳥。繁殖期に少数の滞在例がある。アジアの東部で繁殖し、南～東南部で越冬。

(生態) アムール流域の繁殖地の例ではカラマツやエゾマツ林で営巢し、オウチュウやオナガなどに托卵する。おもに毛虫(ガの幼虫)などの昆虫類を食べる。

1974年－1978年 メッシュ数 A = 0 B = 0 C = 0



1997年－2002年 メッシュ数 A = 0 B = 3 C = 0



カッコウ


(分類) カッコウ目カッコウ科 *Cuculus canorus*

(環境省RDB種) -

(分布) 北海道から九州で夏鳥。ユーラシアの温帯から亜寒帯に広く分布し、インドシナやインド、アフリカの一部など熱帯域で越冬。

(生態) 農耕地を含む草原や林縁などの開けた環境でさえずり、おもにヨシキリ類、ホオジロ類、モズ類などに托卵するが、最近の研究で、採食とねぐら場所は森林であることがわかってきた。おもに毛虫(ガの幼虫)を食べる。

1974年-1978年 メッシュ数 A = 34 B = 541 C = 41



1997年-2002年 メッシュ数 A = 10 B = 412 C = 58

