



# ガビチョウ (外来種)

(分類) スズメ目チメドリ科 *Garrulax canorus*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 関東地方や九州の一部に定着。中国南部、海南島、台湾原産。

(生態) 灌木林や草丈の高い草原にすみ、低木などに営巣する。約4卵を産む。よく地上を走り、あまり高く飛ばない。雑食で、昆虫や漿果などを食べる。小群で行動する。





# カオグロガビチョウ (外来種)

(分類) スズメ目チメドリ科 *Garrulax perspicillatus*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 関東地方に定着。中国南部、ベトナム原産。

(生態) 平地から丘陵の灌木林にすみ、低木に営巣する。約4卵を産む。よく地上を走り、あまり高く飛ばない。雑食で、昆虫や漿果などを食べる。小群で行動する。





# ソウシチョウ (外来種)

(分類) スズメ目チメドリ科 *Leiothrix lutea*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 筑波山、六甲山、九州の山地など、本州中部と九州に定着。中国南部からヒマラヤ、北ベトナム、インド原産。

(生態) 低山から山地の多様な林の下藪にすみ、藪の中に営巣する。約3卵を産む。昆虫、果実、草本の種子などを食べる。非繁殖期には小群で見られる。



# コウカンチョウ (外来種)


(分類) スズメ目ホオジロ科 *Paroaria coronata*

(環境省 RDB 種) -


(分布) 関東地方に定着。南米原産。

(生態) 湿生灌木林や灌木のある開けた場所に生息する。

1974年－1978年    メッシュ数   A = 1   B = 0   C = 0



1997年－2002年    メッシュ数   A = 0   B = 0   C = 0



## ベニスズメ (外来種)


(分類) スズメ目カエデチヨウ科 *Amandava amandava*

(環境省 RDB 種) -

(分布) 関東地方や近畿地方などに定着。関東地方では、谷津干潟や渡良瀬遊水池などで局所的にみられる。南アジア原産。

(生態) アシ原や湿地周辺の灌木林などの水辺に近い草原に群れですむ。

1974年－1978年      メッシュ数   A = 10   B = 16   C = 16



1997年－2002年      メッシュ数   A = 0   B = 0   C = 1

